



गुरुदेव गुरुदेव

T. Achyuta Rao.
15-11-13

THE VIJNANA CHANDRIKA SERIES

EDITED BY

K. V. LAKSHMANA RAO, M.A.

A
MANUAL
OF
AGRICULTURE
(IN TELUGU)

BY
G. JOGIRAJU
DIPLOMATE AND MEDALIST IN AGRICULTURE AND
SUPERINTENDENT, RAJAH'S FARM,
PITHAPURAM

(PRELIMINARIES)

MADRAS
THE VIJNANA CHANDRIKA MANDALI
1913

PRINTED BY

V. Ramaswamy Sastrulu & Sons

AT THEIR

Audi Saraswaty Nilaya Press Madras.

‘కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షమ్’

వ్యవసాయశాస్త్రము

ప్రథమసంపుటము - మొదటిభాగము

ఇది

గోపేటి - జోగిరాజు గారిచే

రచియింపఁ బడినది

ప్రాథమిక విషయములు

చెన్నపట్టణము

విజ్ఞానచంద్రికా మండలివారిచే

ప్రకాశితము

పీఠిక



తెనుగునగాని యింగ్లీషున గాని యీ రాజధానికి సంబంధించి విపులముగ వ్రాయబడిన వ్యవసాయ గ్రంథ మొక్కటియు లేకపోవుట వలన నీ శాస్త్రమును స్వభావయందు రచియింపవలె నను నూహ నాకు సైదాపేట వ్యవసాయ కళాశాలలో విద్యార్థినిై యుండగనే యంకురించెను. అప్పటినుండియు వలసిన సామగ్రిని బోగించేయుచు వచ్చితిని. కాని నాయల్పశక్తితో నీ కఠిన కార్యమును బ్రారంభించుటకు ధైర్యముచాలక కొంత కాల మూరకుంటిని. మరియు భాషాజ్ఞాన మల్పమగుట వ్రాతకు గట్టి యవరోధముగ నుండెను. పలుమారు వ్రాయ నారంభించియు బారిభాషికపదము లమరక పోవుటచే ముందునకును వెనుకకును జూచుచు మరికొంతకాల మూరకుండవలసి వచ్చెను. ఇంతలో విజ్ఞాన చంద్రికా మండలివారు తమ రసాయన శాస్త్రమును బ్రచురించిరి. ఇందలి పారిభాషిక పదములు నాకు జాలవరకు సాహాయ్యమగుటచే నుత్సాహముగలిగి మరల బనికి బూనుకొని శక్త్యను సారముగ వ్రాసితిని.

శాస్త్రీయ వ్యవసాయ మీ దేశమున నింకను బాల్యావస్థ యందున్నది. శోధన లిపు డిపుడే ప్రాథంభ మగుచున్నవి. ప్రసిద్ధ

శాస్త్రవేత్తలకే యింకను అనేక విషయములు కొరకుబడకున్నవి. ఇట్టి స్థితిలో నేను వ్యవసాయ శాస్త్రమును వ్రాయ సాహసించుట నాయల్పజ్ఞతను నేనెరుంగక పోవుటగాదు. ఇంతవరకు దెలిసికొనబడిన విషయములను బొందుపరచి యేదో యొక విధమున గ్రంథ రూపమునకు దెచ్చిన యెడల పాఠకులకు గొంతవరకు శాస్త్రీయ వ్యవసాయమునం దభిరుచి గలుగు ననియు, ముందుముందు దీనిని సవరించి మంచి గ్రంథమును వెలువడ జేయుట సులభముగనుండు ననియు నెంచితిని. కావున నిందలిలోపములకు క్షమించి ముందు కూర్పునందు దీనిని సంస్కరించుటకు నాకు దోడ్పడ బ్రార్థించెదను.

ఇది ప్రథమ సంపుటమునందు మొదటిభాగము. ఇందు వ్యవసాయవృత్తికి సహకారు లగు ప్రకృతిశాస్త్రములందలి ముఖ్య విషయములు దొలుత జర్పింప బడెను. పిమ్మట వ్యవసాయ ప్రారంభమున జేయవలసిన యేర్పాట్లు వివరింప బడెను.

రెండవ భాగమునందు సాగు (Tillage) ఎరువు వేయుట (Manuring) మొదలగు వ్యవసాయపుబనుల (Agricultural operations) నొక్కొకదానినిగూర్చి యొక్కొక యధ్యాయమున విపులముగ వ్రాయబడును.

ఈరెండు భాగములను నొకటిగనే ప్రచురింపవలె నని మొదట నూహింప బడెను. కాని, యిప్పటికిదియే పెద్దదైనందునను, రెండవభాగపు ముద్రణ మింకను బూర్తిగాక పోవుట చేతను, గ్రంథ ప్రచురణ మిదివరకే చాల యాలస్య మయినందు

నను, మండలివా రీభాగము నిప్పుడు ప్రచురించెద మనిరి.
రెండవభాగముగూడ త్వరలోనే వెలువడగలదు.

ద్వితీయ సంపుటమునందు జెన్నపురి రాజధానిలో సాగు
చేయఁదగిన రమారమి 100 జాతుల సస్యములను వేర్వేరుగ
దీసికొని వాని కనుకూలమగు శీతోష్ణాదిస్థితిగతులును, వాని
సాగుచేయు విధానములును వివరింప బడును.

ఈ పుస్తకమును వ్రాయుటకు విజ్ఞానచంద్రికా మండలి
వారి ప్రకృతిశాస్త్రములును, ముఖర్జీగారియొక్కయు, మాలిసా
గారియొక్కయు హైందవ వ్యవసాయశాస్త్రములును, వారింగ్
'ను (Warrington) గారి 'నేలల భౌతిక ధర్మములు, (Physical
properties of soils)'ను, కింగ్ (King) హాల్ (Hall) అను
వారు నేలలనుగూర్చి వ్రాసిన బ్రసిద్ధ గ్రంథములును బెన్సన్
(Benson) గారును సి. కె. సుబ్బారావు గారును వ్రాసిన
వ్యవసాయ ప్రథమపాఠపుస్తకమును నాకు మిగుల దోడ్పడెను.

ఈభాగమునందు జర్చింపబడిన విషయములు చాలవరకు
గేవల శాస్త్ర విషయము లగుటచే సామాన్య పాఠకుల కంత
సులభగ్రాహ్యముగ నుండక పోవచ్చును. అయినను, రెండవ
భాగమునందు వివరింపబడు కృషిసాంప్రదాయముల తత్త్వమును
(the principles of the agricultural practices) సహే
తుకముగ దెలిసికొనుటకును, నూతన వ్యవసాయాభివృద్ధి మా
• ర్గముల నరయ గలుగుటకును, ఇందలి విషయములను దెలిసి

కొనుట యావశ్యకము. కావున నించుక శ్రద్ధచేసి, మండలి వారి ప్రకృతి శాస్త్రగ్రంథముల దోడుచేసికొని, ఇందలి విషయములను గ్రహింపవలెను.

శాస్త్రవిషయములను గ్రహింపలేని వారయినను, ఇందలి అనుభవ సిద్ధమయిన వ్యవసాయసాంప్రదాయములను దెలిసి కొనుటవలన గొంతవరకు దమ వ్యవసాయము నభివృద్ధి జేసికొన గలుగుదురు.

విజ్ఞానచంద్రికా మండలివారు దీనిని దమగ్రంథమాలలో బ్రచురించుటకు సమ్మతించి నాకు గలిగించిన బ్రోత్సాహమునకు వందనము లొసంగు చున్నాడను.

పీతాపురం,

24-7-1913.

}

గోటేటి జోగిరాజు

CONTENTS.

CHAPTER I.

WHAT IS AGRICULTURE

What is agriculture?-the different branches of agriculture-natural sciences allied to agriculture-agricultural science.

(p.p. 3—8)

CHAPTER II.

PHYSICS & CHEMISTRY

Physical and Chemical phenomena-the three states of matter-physical properties of solids, of liquids and of gases-forces-their transformation into one another-atoms and molecules elements and compounds metals and non-metals.

(p.p.9—35)

CHAPTER III.

BOTANY

The main divisions of plant life-algæ and fungi-mosses and lichens-ferns- flowering plants- monocotyledons and dicotyledons - the root - the stem - the leaf - the internal structure of flowering plants-nutrition and growth - the flower - the fruit the seed-classification of plants-its utility.

(p.p. 36—109)

CHAPTER IV.

CLIMATE

What is meant by climate? - temperature-its variation and causes-thermometers - maximum minimum and ordinary-temperature table - winds - their causes - south east monsoon. north east monsoon-rain - rain gauge-distribution of rain-fall in the Madras Presidency - hail - humidity - dew - fog-honey-

(p.p.110—147)

CHAPTER V.

THE SOIL

The surface of the earth and its original nature-soil and its formation - disintegration of rocks - causes - minerals and rocks - the common minerals in rocks - the common varieties of rocks - classification of soils - sedentary and transported soils - red soils - black soils - grey soils - brown soils - and light soils - sandy soils - loamy soils - and clay soils - sandy loams and clay loams - clay - silt - sand - and gravel - chemical constituents of soils - chemical classification of soils - analysis of soils - physical and chemical - chemical composition of soils in the Madras Presidency - active and dormant plant food.

(p.p. 148—178)

CHAPTER VI.

PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS

The soil particles - interspace - internal surface - weight - tenacity - shrinkage - increase in volume - colour - odour - soil water - capacity of the soil for water - retentive power - percolation - evaporation - capillarity - underground water - the heat of the soil - specific heat - subsoil heat - the salts in the soil - power of soils to retain salts from solutions passing through them - soil gases.

(p.p. 179—213)

CHAPTER VII.

FERTILITY AND BARRENNESS

General indications of fertility - points which determine the fertility - 1. chemical condition - chemical analysis - method of determining chemical condition without analysing - sources of loss and gain to the soil - 2. the depth of soil - 3. physical properties - the good and bad features of clay soils - of sandy soils -

improvement of clay soils- mixing sand - liming - paring and burning- addition of organic matter-draining - surface drainage and under drainage - improvement of sandy soils - addition of clay - green manuring-cultivation of casuarina and other trees-cultivation of sand binders in alternate strips - hedging - 4. the nature of the subsoil - 5. the presence of injurious salts-the characteresties of saline soils - their improvement draining addition of organic matter - encouraging the growth of grass - washing the salts out - addition of certain substance- which on decomposition produce acids and nuetralise salts addition of chemicals. Quantities of salts in the saline soils of the Madras Presidency.

(p.p. 214—255)

CHAPTER VIII.

TO BEGIN FARMING

Clearing bushes - levelling - digging drains - terracing- construction of catilsheds- wells &c., the importance of the ryot living on his holding. Fences-live and dead - methods of making fences ; advantages and disadvantages of live fences - Roads - their necessity - a model farm - a model farm yard.

(p.p. 256—268)

CHAPTER IX.

CLASSIFICATION OF CROPS

ROTATION OF CROPS AND MIXED CROPPING

Classification of crops according to the nature of their produce-rotation of crops-its advantages-some model rotations-for red sandy soils-for loams-for alluvial soils-for black cotton soils-for wet and garden lands - mixed cropping-its ad vantages-some usual mixtures.

(p.p. 269—289)

విషయ సూచిక

మొదటి యధ్యాయము

వ్యవసాయ మన నేమి?

వ్యవసాయమన నేమి? - వ్యవసాయశాఖలు - సహకారులగు ప్రకృతి శాస్త్రములు - వ్యవసాయ శాస్త్రము. (8—8.)

రెండవ యధ్యాయము

పదార్థవిజ్ఞాన రసాయన శాస్త్రములు

భౌతిక, రాసాయనిక వికారములు - పదార్థముల త్రివిధస్థితులు - ఘనపదార్థముల భౌతికధర్మములు - ద్రవపదార్థముల భౌతికధర్మములు - వాయు పదార్థముల భౌతికధర్మములు - శక్తులు - వాని వికృత - మూలద్రవ్యములు - రాసాయనిక మిశ్రణములు - అణువులు - పరమాణువులు - ధాతువులు - ఉప ధాతువులు. (9—35.)

మూడవ యధ్యాయము

వృక్ష శాస్త్రము

ఉద్భిజ్జముల తరగతులు - ఏకబీజదళములు - ద్విబీజదళములు - వేరు - కాండము - అకు - ఉద్భిజ్జముల యాంతరనిర్మాణము - హెచ్చుతరగతి యుద్భిజ్జముల యాహారస్వీకరణము, వృద్ధి-పూవు - కాయ - విత్తు - ఉద్భిజ్జముల వర్గీకరణము - దానియుపయోగము. (36—109.)

నాల్గవ యధ్యాయము

శీతోష్ణస్థితి

శీతోష్ణస్థితియన నేమి?—ఉష్ణోగ్రత - అందు భేదములు - వానికి గారణములు - ఉష్ణతామాపకములు - ఉష్ణోగ్రతాపట్టి - వాయుప్రవాహములు—వానికి గారణములు - నైఋతివర్ష వాయువు - ఈశాన్య వర్ష వాయువు—వర్షము - వర్షమాపకము - చెన్నపురి రాజధానియందలి వృష్టిపాతమును దెలుపు పట్టి - వడగండ్లు - ఆర్ద్రతా భేదములు - మంచు - పొగమంచు; లే నెమంచు.

(110—147.)

ఐదవ యధ్యాయము

నేల

భూగోళముయొక్క—ఉపరితలము - దాని ఆదిమస్వభావము—మన్ను - నేల - వీనియుత్పత్తి - శిలావిశ్లేషము - దానికి గారణములు - ఖనిజములు - పాషాణములు—ఖనిజములందలి సామాన్య మూలద్రవ్యములు—సామాన్య ఖనిజ భేదములు—సామాన్యశిలాభేదములు - నేలలవర్గీకరణము - జన్మస్థానికములు, అపసీములు - ఎర్రనేలలు - నల్లనేలలు - బూడిదరంగు నేలలు - కఠిన్మర్ణపు నేలలు - తేలికవర్ణపు నేలలు - యిసుకనేలలు - గరుపనేలలు - బంకనేలలు—ఇసుకగరుములు - బంకగరుములు - బంకమన్ను - వండలి - ఇసుక - కంకర - వీనికి భేదములు - నేలలరసాయన ఘటకౌషయములు - వానిపరిమితిని బట్టి నేలల వర్గీకరణము - నేలలపృథక్కరణము - భౌతిక పృథక్కరణము - రాసాయనిక పృథక్కరణము - చెన్నపురి రాజధానియందలి నేలల రసాయన ంఘట్టము - సిద్ధాహారము - సాధ్యాహారము.

(148—178.)

ఆరవ యధ్యాయము: నేలల భౌతికధర్మములు

నేలమంటియణువులరాశి-అంతగవకాశము - అంతరతలము - బరువు-
స్నిగ్ధత-సంకోచము-వ్యాకోచము - నర్లము- గంధము - నేలయందలిజలము-
జలగ్రహణశక్తి - జలధారణశక్తి - జలస్రవణము - బాష్పీభవనము - కేశా-
కర్షణశక్తి- అంతర్భృషుజలము - నేలయందలి యుష్ణత - తారతమ్యావృత -
క్రిందినేలయొక్క యుష్ణోగ్రత - నేలయందలి లవణములు-నేలల లవణ నిగ-
రాశక్తి - నేలయందలి వాయుపదార్థములు. (179—213.)

ఏడవ యధ్యాయము ఫలదత-వంధ్యత

నేలల మంచిచెడ్డలను బాహ్యలక్షణములను బట్టి తెలిసికొనుట - మం-
చినెడ్డలను నిశ్చయముగ చెల్పువిషయములు - (1)రసాయనస్థితి-రసాయన
వృద్ధి-రసాయన-అదిలేకయే నేలల సారమును బరీక్షించుట - నేలయందలి
సారము తగ్గుదలములు - నేలకు సారము జేరు విధములు (2)-నేలలలోతు -
(3) నేలభౌతిక ధర్మములు-బంకనేల మంచిచెడ్డలు - ఇసుకనేలల మంచి
చెడ్డలు-బంకనేలలను బాగుపరచుట - ఇసుక కలుపుట - సున్నమువేయుట-
మంటినిగాల్చుట - సెండియ పదార్థముజేర్చుట - జలనిర్గమనము బాగుపర-
చుట - ఉపరిజలనిర్గమనము - అధోజలనిర్గమనము - ఇసుక నేలలను బాగుపర-
చుటకు సాధనములు - బంకమన్న జేర్చుట - పచ్చి యెరువువేయుట - బాగుగ
చీకినపశువుల యెరువు వేయుట - సరుగురు మొదలగు వృక్షములను చెం-
చుట - బురదనీటిని నిలగట్టుట - నేలను సమముచేసి గట్లువేయుట-కంచెలను
వేయుట మొదలగునవి - (4) క్రింద నేలస్వభావము - (5) హానికరములగు
పదార్థములు-నేలయందుండుట-చాటి నేలలు-వానిలక్షణములు-చాటి నేలలను
బాగుపరచుట కుపాయములు:—జలనిర్గమనమును బాగుపరచుట-నేలనుండి
బాష్పీభవమును తగ్గించుట - పరిగడ్డి మొదలగు ఫలపదార్థములుజేర్చుట -

కుళ్లువును అష్టములు పుట్టుపదార్థములచేర్చుట - తొళ్లుసాలలోని తుక్కు
వేయుట - నీరుపెట్టి లవణములను గడిగివేయుట - చోడిమొదలగు సస్యము
లను సాగుచేయుట - నేలను బీడుగావదలుట - ఇసుక విస్తారము చేర్చుట -
ఖటికగంధకితము - నత్రితము జేర్చుట - కొన్ని చాటి నేలలందలి లవణముల
పరిమితి. (214—255.)

ఎనిమిదవ యధ్యాయము వ్యవసాయప్రారంభము

పొదలను పుట్టలను దీసివేసి నేలను శుభ్రముచేయుట - అంతరము
లు చేయుట - పొదలుత్రవ్వట - గట్లువేయుట - వ్యవసాయదారుడును
పశువులును పనివాండ్లును నివసించుటకుతగిన కట్టడములు - నైతు తన
పాలముమీదనే నివసించుటవలనిలాభములు - ఆవరణలు - సజీవావరణము -
నీచుచింత - కిత్తినార - వానిలాభనష్టములు - నిర్జీవావరణము - బొటలు -
వానిలాభనష్టములు - మాదిరిపాలము - అందలి యేర్పాట్లు. (256—268.)

తొమ్మిదవ యధ్యాయము సస్యముల వర్గీకరణము పరివర్తనములు, మిశ్రసేవ్యము

ఫలసాయపు స్వభావములనుబట్టి వర్గీకరణము - తృణధాన్యములు -
కాయధాన్యములు - చమరుగింజలు - నారపంటలు - రంగుపంటలు - ఓష
ధులు-మత్తుద్రవ్యములు - మసాలాదినుసులు - ఇతరపంటలు - పశుగ్రాసము
లు - కూరగాయలు - ఫలకృక్షములు - పుష్పజాతులు.

సస్య పరివర్తనమన నేమి? నంచువలని లాభము లెవ్వి?—కొన్ని
మాదిరి పరివర్తనములు - ఎర్రనేలలకు - గరుపనేలలకు - ఎండలినేలలకు -
రేపడినేలలకు - దంపనేలలకు తోటభూములు.

మిశ్రసేవ్యము — కొన్ని సామాన్య మిశ్రణములు - వానిలాభములు.

మొదటి భాగము.

VISWANATHAN TEKUMALLA,
FLAT 501, 'PRASANTH TOWERS'
MUSHIRABAD MAIN ROAD,
HYDERABAD-500048. (A.P.)

వ్యవసాయశాస్త్రము.

ప్రథమభాగము.

మొదటియధ్యాయము.

వ్యవసాయశాస్త్ర మన నేమి ?

“కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం”

ఆద్యదశయందు మనుష్యులు మృగములవలెనే యడవులవెంట దిరుగుచు, గండమూలఫలాదులను, దమకు లోకువయగు గొన్ని జంతువులను దిని జీవించుచుండిరి. కాలక్రమమున వానిసంఖ్య హెచ్చి కొంతకాలమునకు స్వభావసిద్ధముగా దొరకు పదార్థములు చాలకుండుట తటస్థమయ్యెను. అప్పుడప్పుడాహారపదార్థములు దొరకమిచే, వానికొర కొకతెగవారితో నొకతెగవారు ఘోరముగా భోరాడుకొనవలసి వచ్చుచుండెను. ముసలివారును బలహీనులును ఆహారములేక మడియుచుండిరి. ఇట్టి కరవు లప్పుడప్పుడు తటస్థించుచు రాగా, గొంతకాలమునకు మనుష్యు లితరజంతువులకంటె బుద్ధిబల మెక్కువగ గలవారగుటంజేసి, తమప్రస్తుతోపయోగమునకు గావలసిన పదార్థములను వెదకికొనుటయేగాక, ముందెప్పుడైన నవి దొరకక పోవునెడల నట్టిసమయములం దుపయోగించునిమి త్తమయి యాహార పదార్థముల సంపాదించి జాగ్రత్త చేయుట యుక్తమని యెంచి సాధుజంతువు లగు పశువులను గొర్రెలను బట్టి తమనివాస

ములయొద్ద నుంచుకొని మచ్చికచేసి మేపుకొనుచు వానిపాల వలనను మాంసమువలనను గూడ జీవింప నారంభించిరి. ఇదియే మానవజాతి మృగస్వభావము వదలి నాగరికత నొందుటకు బ్రారంభము.

జనసంఖ్య యింకను హెచ్చినకొలదిని పశువులయొక్కయు గొర్రెలయొక్కయు సంఖ్యకూడ హెచ్చుచు వచ్చెను. కాని కొంతకాలమున కవి మేయుటకు దగినస్థలము చాలక మందలు వృద్ధియగుట కవకాశము లేకపోయెను. అంతట మానవులు మరియొకయుపాయమును బన్నిరి. అడవియందు గొంతప్రదేశమున దమ కుపయోగింపని వృక్షాదుల నరికివేసి యందు దమ కాహారపదార్థముల నిచ్చువానినే వృద్ధిచేసి సంరక్షించుకొనుచు వాని ఫలమువలనను జీవింప దొడగిరి. ఇట్లు చెట్లు చేమలు పెంచుచోటనే యవి యనుకూలముగ బెరిగి ఫలించుచున్నంతకాలము నివసించియుండి, వాని యేవుతగ్గి ఫలము క్షీణింపగనే యచ్చోటు వదలి మరియొక ప్రదేశమునకు బోయి యచట నిట్లే మరికొంతకాలము నివసించుచుండిరి. ఇట్లొక ప్రదేశమునుండి మరియొకప్రదేశమునకు బోవుచు రాగా గొంతకాలమునకు జనసంఖ్య మరింత వృద్ధియై క్రొత్తగా నాక్రమింప దగిన స్థలము తక్కువయ్యెను. అందుచే జనులు దామంతవర కెవ రేస్థల మాక్రమించుకొనిరో యందే నివసించియుండి తమకు వలయుపదార్థముల నన్నిటిని దానినుండియె యుత్పత్తిచేసికొనవలసివచ్చెను. ఈయవసరమునుబట్టియే జనులు గ్రహక్రమముగా త్రవ్వుట, దున్నుట, యెరువువేయుట, నీరు పోయుట, కలుపుతీయుట మొదలగు నుపాయములను గనిపెట్టి

వాని సహాయముచేత దమకు గావలసిన పదార్థముల నన్నిటిని యేటేట నెకప్రదేశమందే యుత్పత్తి చేసికొనుచు వానివలన జీవించుచున్నారు.

కాలక్రమమున నిట్లు మానవజాతీయందు మృగస్వభావము తగ్గి నాగరికత వృద్ధి యయ్యెను. ఆహారద్రవ్యములేగాక కట్టకొనుటకు బట్టలు మొదలగు నితరపదార్థములుగూడ నవసరమయ్యెను. మొదట మనుష్యులు కట్టకొనుటకు జంతువుల చర్మములనే యుపయోగించుకొనుచుండిరి. తరువాత క్రమక్రమముగా ప్రత్తి నార మొదలగువానిని పండించి వానితో వస్త్రముల నేసికొన దొడగిరి. ప్రస్తుతకాలమున మనుష్యుల కన్నవస్త్రములేగాక, మందులు మత్తుద్రవ్యములు మొదలగు నితరపదార్థము లనేకములుగూడ నవసరమయ్యె. ఇవి యన్నియు నేదో యొకరీతిగ నేలనుండియేకదా యుత్పన్న మగుచున్నవి?

ఇట్లు మనుష్యులు నేలనుండి తమకు నన్నవస్త్రాదులుగా నుపయోగించు పదార్థముల నుత్పత్తిచేయుట యను విద్యయే “వ్యవసాయ” మనబడుచున్నది. “వ్యవసాయ” శబ్దమునకు “కృషి” లేక “పరిశ్రమము” అని మాత్రమే యర్థము. అయినను “కోటివిద్యలు కొండ్రకు లోపలనే” యనునట్లు ఈవిద్యకు మనదేశమున మొదటినుండియు గల ప్రాముఖ్యతను బట్టి “వ్యవసాయ” శబ్దము దీనికే వర్తించుచున్నది.

వ్యవసాయవిద్య నవలంబించినవాడు “వ్యవసాయదారుడు” లేక “వ్యవసాయి” “కృషీవలుడు” లేక “కర్షకుడు” అని పిలువబడును.

ధాన్యాదులను బైరుచేయుట వ్యవసాయమునందు ముఖ్య భాగము. దీనికి “సామాన్యకృషి” అని పేరు. శాకములు, ఫలములు, పుష్పములు మొదలగువానికొరకుగాని నేత్రానందమునకైగాని తోటలను బెంచుట వ్యవసాయమునం దొకశాఖ. దీనికి “ఉద్యానకృషి” (Horticulture) అని పేరు. పశుగ్రాసమును వృద్ధిచేసి పశువులను గొర్రెలను మేపుకొనుచు పాలు, ఉన్ని మొదలగు ద్రవ్యముల నుత్పన్నము చేయుట మరియొకశాఖ. దీనికి “పశుపాలనము” (Pastoral Farming) అని పేరు. ఇవిగాక బాటలప్రక్కలను, బంజరునేలలలోను నీడకొరకుగాని యితర ఉపయోగముకొరకుగాని చెట్లను పెంచుటయు (తరుకృషి= Arboriculture), పట్టుపురుగుల కాహారము నిచ్చు పూతిక (Mulberry) మొదలగు చెట్లను పెంచి, పట్టుపురుగులను వృద్ధిచేసి, వానివలనపట్టు నుత్పన్నముచేయుటయు (పట్టకృషి= Sericulture), మకరందము మొడుగానుండు పుష్పజాతులను వృద్ధిచేసి తేనెటీగలను మచ్చికచేసి పెంచి వానివలన తేనె నుత్పన్నము చేయుటయు (మధుమక్షికాపాలనము= Apiculture), అనుకూలమగు నాహారద్రవ్యములను సంపాదించి గ్రుడ్లు మోసము మొదలగు వానికొరకుగాని వినోదము కొరకుగాని కోళ్లను బెంచుటయు (కుక్కుటపాలనము= Poultry keeping), మొదలగునవిష్పటిష్పడు ప్రాముఖ్యతను జెందుచున్న వ్యవసాయశాఖలే.

సాధ్యమయినంత తక్కువవ్యయముతో నేలకు బలహీనత గలుగకుండ శీఘ్రకాలములో నెక్కువ విలువగల విశేషఫలమును కొద్ది విస్తీర్ణముగల నేలనుండియె తీయుట యుత్తమము.

వ్యవసాయలక్షణము. వ్యవసాయదారు డిల్లు చేయగలుగుటకు దనవిద్య కుపకరణములగు మొక్కలు, నేల, వాయువు, మొదలగు పదార్థములతత్వమును బాగుగ చెలిసికొనుట యావశ్యకము. కుమ్మరివాడు తనకుండల కెట్టిమన్ను తగినదో, సారె యెట్లుండవలయునో, దానిపై నామంఠిని కుండలుగా జేసి యెడ బెట్టి కాల్చుటెట్లో మొదలగునంశములను బాగుగ గ్రహించని యెడల, తనవిద్యయందు బ్రవీణుడు కానేరడు. సాలెవాడు తననూలుయొక్క మంచిచెడ్డలును, మగ్గముయొక్క నిర్మాణమును నెరుగనివాడైన నెట్లు బట్టలనేతయందు నిపుణుడగును? అట్లే వ్యవసాయదారుడును తాను సాగుచేయు మొక్క లెట్లు పుట్టి పెరిగి ఫలించునో, వాయువుయొక్కయు, నేలయొక్కయు స్థితి యెట్లుండిన మొక్క లభివృద్ధిగా నుండునో, వానియందలి మార్పులు సస్యములందు వృద్ధి క్షయముల నెట్లు గలిగించునో, ఈ మొదలగు విషయములను బాగుగ గ్రహించనియెడల దా నావిద్యయందు జతురుడయి, నేలనుండి తనపాటునకు తగినంత ఫలమును దీయజాలడు. కాన కృషీవలుడు వృక్షముల తత్వమును తెల్పు వృక్షశాస్త్రము (Botany), వాయువునందలి మార్పులను గుఱించి చర్చించు అంతరిక్షశాస్త్రము (Metecrology) నేలయొక్క నిర్మాణమును గురించియు, అందలి మార్పులను గురించియు బోధించు భూగర్భశాస్త్రము (Geology) మొదలగు ప్రకృతిశాస్త్రములను గొంతవర కభ్యసింపవలయును. పదార్థముల ధర్మములను గురించియు వానియందలి మార్పులను గురించియు చర్చించు పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రము (Physics) రసాయనశాస్త్రము (Chemistry) ప్రకృతిశాస్త్ర

ముల కన్నిటికిని మూలాధారము లగుటచే వాని నభ్యసించుటకుముందే వ్యవసాయదారు డీరెంటిని గూడ గొంతవర కభ్యసింపవలసియుండును.

పైని పేర్కొనబడిన ప్రకృతిశాస్త్రములసాహాయ్యము చేతను అనేకశతాబ్దములనుండి వ్యవసాయదారులకు గల్గిన యనుభవజ్ఞానసాహాయ్యముచేతను, వ్యవసాయ సాంప్రదాయములనుగురించియు వాని తత్వమునుగురించియు బోధించు శాస్త్రము “వ్యవసాయశాస్త్రము”.

(Physics and Chemistry.)

పదార్థవిజ్ఞాన రసాయనశాస్త్రములు.

సృష్టియందలి జడాజడములగు సకలవస్తువులకును ప్రకృతి శాస్త్రములయందు “పదార్థము” (Matter) లనిపేరు. పదార్థము లందు మనము ప్రతిదినమును అనేకమార్పులను జూచుచుండుము. ఈమార్పులలో గొన్నిటియందు “వస్తువుయొక్క రూపుమాత్రముమారి దానిస్వభావజన్యధర్మములుపోవు”. ఖేరిన నేతి నెకగిన్నెలోవేసి నిప్పుపై కాచినయెడల నదికరగి ద్రవరూపమును దాల్చును. రూపముమాఱినను దాని నిజస్వభావ మేమియు మారదు. దాని నేయి యని గుర్తింపదగినధర్మములు నశింపవు. ఇట్టిమార్పులు భౌతికవికారము (Physical Changes) లనబడును. మరికొన్ని మార్పులందు పదార్థముయొక్క “రూపు మారుటయేగాక నైజగుణములు పూర్తిగా మారిపోయి కొత్త ధర్మము లారోపింపబడును.” కొంచె మింగిలీకపువ్వాడి నొక గిన్నెలోబోసి వెచ్చజేసినయెడల నందుండి యొకవాయుపదార్థము పైకిబోయి పాదరసము కొంతశేషించును. “ఇంగిలీకపుధర్మములును పాదరసపుధర్మములును నొక్కటికావని వేరుగ జెప్పవలెనా?” ఇట్టి మార్పులు రసాయనవికారము (Chemical Changes) లనబడును.

పదార్థములందు గలుగు భౌతిక వికారములను గురించి చచ్చించు శాస్త్రము పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రము (Physics). రసాయనవికారములను గురించి బోధించునది రసాయనశాస్త్రము (Chemistry). ఈ రెండును సకలప్రకృతిశాస్త్రములకును మూలాధారములు. వీనిని గురించి యిచట సవిస్తరముగ వ్రాయుట కవకాశములేదు. కావున నందలి ముఖ్యాంశములను గురించి సంగ్రహముగా వ్రాయబడును. చదువరులు ఈ గ్రంథమాలలోని షష్ఠ సప్తమ కుసుమము లగు “పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రము” “రసాయనశాస్త్రము” అను రెండు గ్రంథములను జదివినయెడల నీశాస్త్రములను గురించి సవిస్తరముగ చెలిసికొనగలరు.

పదార్థ విజ్ఞానశాస్త్రము.

“అన్ని పదార్థములను పరిశీలించి చూడగా నవి మూడువిధములుగా గానవచ్చును. ఇనుము, రాయి, కాగితము, మన్ను, ఇనుక మొదలయినవి యొకవిధమయిన పదార్థములు. వీనికి ఘనపదార్థములు (Solids) అనిపేరు. ఘనపదార్థములనగా గట్టి వస్తువులని యర్థము. నీరు, పాలు, తేనె, నేయి, పాదరసము మొదలయినవి రెండవవిధమున కుదాహరణములు. వీనిని ద్రవపదార్థము (Liquids) అనియెదరు. ద్రవపదార్థములనగా ప్రవహించువస్తువులని యర్థము. గాలి, పొగ, ఆవిరి మొదలగునవి మూడవవిధమయిన పదార్థములు. వీనిని వాయురూపపదార్థము (Gases) అందురు. సృష్టియందలియే పదార్థమయినను ఈ మూడుస్థితులలో నేదేని యొక్కదానియొ దుండును. ఈ త్రివిధపదార్థములయొక్క ముఖ్యధర్మములను గురించి యీక్రింద సంగ్రహముగా వ్రాయబడును.

ఘనపదార్థములు సామాన్యముగా ద్రవవాయుపదార్థముల కంటె బరువుగానుండును. ఘనపదార్థములందే బంగారము, సీసము మొదలగు కొన్ని, ఇనుము ఇత్తడి మొదలగు మరి కొన్నింటికంటె బరువుగానుండును. మన మొకఘనపుటంగుళము నీటిని, సీసమును, ఇత్తడిని తూచి చూచినయెడల సీసము నీటి కంటె 11. 4 రెట్లు బరువుగా నున్నట్లును ఇత్తడి నీటికంటె 7. 8 రెట్లు బరువుగా నున్నట్లును దెలియును. నీటియొక్క బరువును నియతమానముగా దీసికొనినయెడల (అనగా 1 అనుకొనినయెడల) సీసముయొక్క బరువు 11. 4 ను, ఇత్తడియొక్క బరువు 7. 8 ను అని చెప్పవచ్చును. కావున సీసముయొక్క తారతమ్యగరిమ (Specific Gravity) 11. 4 అనియు, ఇత్తడియొక్క తారతమ్యగరిమ 7. 8 అనియు చెప్పబడును. ఇట్లే ప్రతివస్తువుయొక్క తారతమ్య గరిమను నిర్ణయింపవచ్చును. తారతమ్యగరిమ యొక్కవగానున్న పదార్థములు తక్కువగా నున్నవానికంటె 'బరువు'గా నున్నవందుము. కర్రమొదలగు కొన్ని ఘనపదార్థములు నీటికంటె తేలికగానుండును. అట్టివి నీటిలోతేలును. కావున వానితారతమ్యగరిమ 1 కంటె తక్కువగా నుండు నని యూహింపవలెను.

ఘనపదార్థములందలి అణువులకు * (Molecules) పరస్పరమునుగల ఆకర్షణశక్తి * (Attraction) హెచ్చుగా నుండుటచేత నా "యణువులకు నిటునటు తిరుగుటకు స్వాతంత్ర్యములేదు". కాన ఘనపదార్థములు "నియతాకారమును"

* ఏపదార్థముయొక్కగాని, ప్రత్యేకముగా, సంభవింప సాధ్యమగు సూక్ష్మతమ భాగమునకు అణువని పేరు.

(definite shape) “నియతాయతనము” (definite volume) గూడ గలిగియుండును.

ఇటుక, కలకండ మొదలగు పదార్థములను నలగగొట్టిన యెడల (అనగా ఒత్తుడు (Pressure) గలిగించినయెడల) నవి సులభముగా చూర్ణమగును. ఈ స్వభావమునకు విభాజ్యత (Divisibility) యని పేరు. బంగారము వెండి మొదలగునవి ఎంతకొట్టినను సాగునేగాని చూర్ణముగావు. ఇట్లు సాగుస్వభావమునకు “విస్తార్యత” (Malleability) అనిపేరు.

చక్కెరను నీటిలో వేసినయెడల నందది లీనమైపోవును. నీటిచే మనకంటే కఠుపడనంత చిన్నచిన్నయణువులుగా విభాగింపబడుటయే కరగుట. ఈ స్వభావమునకు “ద్రావణీయత” (Solubility) అనిపేరు. ఈస్వభావముగల పదార్థములకు ద్రావణీయ (Soluble) పదార్థములనియు, నిది లేనివానికి “అద్రావణీయ” (Insoluble) పదార్థములనియు పేరు.

కచ్చికను నీటిలో ముంచినయెడల నది కొంత నీటిని పీల్చుకొనును. ఇనుపముక్క కట్టి శక్తిలేదు. కచ్చికకు నీటిని పీల్చుకొనుశక్తి అందలి యణువులమధ్య నంతరము లుండుటచేత గలుగుచున్నది. ఇట్లణ్వంతరములు గలిగియుండు స్వభావమునకు “సచ్చిద్రత” (Porosity) అనిపేరు.

మన మొక గుడ్డప్రేలికనుగాని, యద్దుడుకాగితమునుగాని మరియే సచ్చిద్రపదార్థమునుగాని యొకచివరనీటిలో బెట్టినయెడల నీరు తనమట్టముకంటె కొంతపై కెగ్గబాకును. దీపపువ్వు క్రిందిచమురును పైకి లాగుకొనుట మనము ప్రతిధిసమును.

చూచుచునే యున్నాము. ఇట్లు ద్రవపదార్థమును పైకిలాగు కొను శక్తి “కేశాకర్షణశక్తి” (Capillarity) యనబడును.

కొన్ని ఘనపదార్థములు నిప్పుపై కాచినయెడల సులభముగా ద్రవరూపమును దాల్చును. వేచిననేయి యెండలో నుంచి నంతమాత్రముననే కరగును. ఇనుము, బంగారము మొదలగు పదార్థములు కరగుటకు విశేషతీక్షణమగు వేడిమి గావలయును. ఇట్లుష్ణతచే ద్రవరూపమును దాల్చుశక్తికి “ద్రావ్యత” (Fusibility) అనిపేరు.


మన మొకయినుపముక్కను నిప్పులో నుంచినయెడల నది వేడియెక్క నారంభించి క్రమక్రమముగా నందలియుష్ణము మనము తాకలేనంత హెచ్చును. కొంతసేపటి కది యెర్రనయి అందలియుష్ణము అతితీక్షణమగును. వేడిమియొక్కతీక్షణతకు “ఉష్ణోగ్రత” (Temperature) అనిపేరు. పదార్థములందలి యుష్ణోగ్రతాభేదములను మనత్యగింద్రియమువలన కొంతవఱకు గ్రహించగలము. కాని సూక్ష్మభేదములను నిశ్చయముగా గ్రహింపజాలము. ఎట్టిసూక్ష్మభేదముల నయినను యధార్థముగా గనిపెట్టుటకు “ఉష్ణతామాపకము” (Thermometer) అనుయంత్ర మొకటి గలదు. రోగులజ్వరతీక్షణతను గనిపెట్టుట కుపయోగింపబడు యంత్ర ముష్ణతామాపకమే.

ఉష్ణతామాపకము రెండువైపులను మూయబడియుండు మృదువయిన రంధ్రముగల యొకసన్నని గాజుగొట్టము. (1-వ పటము చూడుడు) ఈగొట్ట మొకవైపున నుబ్బుగానుండి ఆభాగమును పైగొట్టములో గొంతభాగమును పాదరసముతో నింపబడి యుండును. గొట్టముపైని కొన్ని సమానాంతరములుగల గీతలు

గీయబడియుండును. “శతవిభాగి” (Centigrade) యను నుష్ణతామాపకముయొక్క యుబ్బుభాగమును (Bulb) మరుగుచున్న

ఉష్ణతామాపకము.

(శతవిభాగి).



1 - వ పటము.

నీటిలో బెట్టినయెడల పాదరస మాగొట్టములో 100 అంకవేసియుండు గీత వరకు లేచును. దీనినే యొకగిన్నెలో కొన్ని మంచుగడ్డముక్కలువేసి యంచుంచినయెడల గొట్టములోని పాదరసము 0 అంకవేసియుండు గీతవరకు దిగును. 0 అను గీతకును 100 అను గీతకును మధ్యభాగము 100 భాగములుగా విభాగింపబడియుండును. ఈవిభాగములకు “అంశములు” (Degrees) అనిపేరు. “శతవిభాగి” యందు నీరుగడ్డకట్టుస్థలము (Freezing Point) మొదలు ఎసరువచ్చు స్థలము (Boiling Point) వరకు గల యంతరము నూరంశములుగా విభాగింపబడియుండుటచే దానికాపేరు గలిగెను.

ఈ యుష్ణతామాపకముయొక్క యుబ్బుభాగమును ఏపదార్థమందుగాని యుంచినపుడు అందలిపాదరస మెన్నవగీటువరకు లేచునో, యాపదార్థముయొక్క యుష్ణోగ్రత యన్ని అంశములని తెలిసికొనవలెను.

మరియొకవిధమగు నుష్ణతామాపకమునందు గడ్డకట్టుస్థలము మొదలు ఎసరువచ్చుస్థలమువరకు గలయంతరము 180 అంశములుగా విభాగింపబడి, గడ్డకట్టు స్థలము 32 గను, నెసరు

వచ్చుస్థలము 212 గను సంకెలు వేయబడియుండును. ఇట్టిదానికి “ఫహరెన్ హీట్” (Fahrenheit) ఉష్ణతామాపక మని పేరు.

మన మొకకర్రముక్కను యినుపముక్కను యెండలో నుంచినయెడల కర్రముక్కకంటె యినుపముక్క త్వరలో వేడియెక్కును. అనగా యినుపముక్కయొక్క యుష్ణోగ్రత శీఘ్రముగా హెచ్చును. ఇట్లు వేడియెక్కు శక్తి సామాన్యముగా ద్రవ వాయుపదార్థములకంటె ఘనపదార్థములం దెక్కువగానుండును. పాదరసమునందుమాత్రము, అది ద్రవపదార్థమైనను తక్కిన వానికంటె నీశక్తి హెచ్చుగా గలదు.

1 గ్రాము (Gram) నీటియొక్క యుష్ణోగ్రత శతవిభాగియుష్ణతామాపకమునందలి 1 అంశము హెచ్చుటకు వలయు నుష్ణతను మానముగా దీసికొనునెడల (అనగా 1 అనుకొనినయెడల) 1 గ్రాముపాదరసముయొక్క యుష్ణోగ్రతకూడ 1 అంశమే హెచ్చుటకు పట్టు ఉష్ణత $\frac{1}{80}$ మాత్రమేయుండును. కావున పాదరసము యొక్కతారతమ్యాష్టత (Specific Heat) $\frac{1}{80}$ అని చెప్పబడును. తక్కిన పదార్థముల తారతమ్యాష్టతయు నిట్లే నిర్ణయింపబడును.

ఒకరాగిఖడ్గీని దీసికొని యొకకొన నిప్పులోనుంచినయెడల దానిరెండవకొనకుగూడ వేడిమి శీఘ్రముగ ప్రసాకును. ఇట్లు పదార్థములం దొకభాగమునుండి మరియొక భాగమునకు ఉష్ణమును వ్యాపకమగు స్వభావమునకు “ఉష్ణవాహకత్వము” (Conductivity) అనిపేరు. ద్రవవాయుపదార్థములకంటె నీస్వభావము ఘనపదార్థములందు సామాన్యముగా హెచ్చుగానుండును. ఈస్వభావము హెచ్చుగాగల పదార్థములు “ఉష్ణవాహకము” అనియు నది యంతగాలేనివి “అనుష్ణవాహకములు” అనియు పిలువబడును.

ఉష్ణపదార్థములు తమనుండి వేడిమి నన్నిప్రక్కలకును ప్రసరింపజేయును. ఈస్వభావమునకు “ఉష్ణప్రచారత” (Radiation) యని పేరు. ఉష్ణపదార్థములందలి యష్ట మిట్లు ప్రసరించుట చేతనే యవి కొంతసేపటికి చల్లబడును. ఇనుము రాగి మొదలగు లోహపదార్థములకు కర్ర మొదలగువానికంటె నీస్వభావము హెచ్చుగానుండును. సామాన్యముగా ద్రవ వాయుపదార్థములకంటె ఘనపదార్థముల కీస్వభావము హెచ్చుగా నుండును.

ద్రవపదార్థములు బరువునందును అణ్వకర్షణశక్తియందును సామాన్యముగా ఘనపదార్థములకును వాయుపదార్థములకును మధ్యమములు. ద్రవపదార్థములు ఘనపదార్థములకంటె అణ్వకర్షణశక్తి తక్కువగల వగుటచే నియతాకారము గలవిగావు. వానియణువుల కొకదానిప్రక్క నొకటి తిరుగు స్వాతంత్ర్యము గలదుగాని యొకదాని నొకటి విడిచిపోవునంత స్వాతంత్ర్యము లేదు. కావున వీనికి నియతాకారము లేక పోయినను నియతాయతనముమాత్రము గలదు.

కొన్ని ఘనపదార్థములు ద్రవపదార్థములలో గరగుననియు ఆస్వభావమునకు ద్రావణీయత యని పేరనియు పైని వ్రాయబడినను, ఘనపదార్థములను తమయందు కరగించుకొను ద్రవపదార్థములశక్తికి “ద్రావణశక్తి” యనిపేరు.

ద్రవపదార్థములు సామాన్యముగా ఉష్ణప్రచారతయందును ఉష్ణనాహకతయందును ఘనపదార్థము లుత్తమముకైనవిగావు. పాదరసముమాత్రము ద్రవపదార్థమైనను ఘనపదార్థమువలె వివిషయములందు చురుకైనది.

ఉష్ణమువలన ఘనపదార్థములు కరగి ద్రవపదార్థము లగు నట్లే, ద్రవపదార్థములు వాయురూపమును బొందును. ద్రవపదార్థముల యుష్ణోగ్రతను తగ్గించినయెడల నవి ఘనీభవించును. కొన్ని పదార్థములను మన మీ మూడుస్థితులయందునుచూడ గలము. ఉ. నీరు. నీటిని కాచినయెడల నది యావిరియగును. తగినంత చల్లబరచినయెడల మంచుగడ్డ యగును.

ద్రవపదార్థములకు వేడిమి కలుగ జేసినయెడల వాని ఆయతనము (Volume) వృద్ధియగును. ఇట్లుగటకు “వ్యాకోచము” (Expansion) అని పేరు. ఒకతవ్వెడు పేరిననేతిని కరగించినయెడల నది తవ్వెడుకంటె నెక్కువగును. కనుకనే నేయి అమ్మువాండ్రు శాధ్యమైనంతవరకు వేడిగా నున్నపుడే నేతిని మనకు గొలువ యత్నింతురు. 1 తవ్వెడు కరగిననేతిని పేరుకొనబెట్టినయెడల నది తవ్వెడుకంటె తక్కువగును. ఇట్లాయతనము తగ్గుటకు “సంకోచము” (Contraction) అనిపేరు.

శీతోష్ణములవలన నీటియందు గలుగు సంకోచ వ్యాకోచములం దొకవిశేషముగలదు. నీటికి శీతతహెచ్చించుచువచ్చినయెడల దానియుష్ణోగ్రత 4 శతవిభాగి అంశములకు తగ్గువరకును సంకోచము గలుగుచుండును. అంతకంటె తగ్గినయెడల తిరుగ వ్యాకోచముగలిగి ఆయతనము మొదటికంటెను నెక్కువగును. కావుననే మంచుగడ్డ నీటిపైతేలును. ఘనపదార్థములకుగూడ శీతోష్ణములవలన సంకోచ వ్యాకోచములు గలుగునుగాని యవి మనకన్నుల కగడనంత స్పష్టముగా నుండును.

వాయుపదార్థములు ఘన ద్రవ పదార్థములకంటె మిగుల చేలికగా నుండును. ఎంత తేలికగానున్నను ప్రతివాయుపదార్థ

మునకును గొంతబరు వుండకపోదు. వాయుపదార్థములందు అణ్వకర్షణశక్తి మిగుల తక్కువ. లేదనియే చెప్పవచ్చును. ఇందుచేతనే వాయుపదార్థములకు నియతాకారమును నియతాయతనమునుగూడ లేవు. ఘనపదార్థములకువలెనే వాయుపదార్థములకును ద్రవపదార్థములలో కరగుస్వభావముగలదు. దీని పరిమిత మాయా వాయుపదార్థముల స్వభావమునుబట్టియు, ఉష్ణోగ్రతనుబట్టియు, వానికిగలుగు నెత్తుడును (Pressure) బట్టియునుండును. ఉదాహరణకు కొంచెమిండుమిండుగా నీటిలో కరుగదనియే చెప్పవచ్చును. 0 శతవిభాగియంశము ఉష్ణోగ్రతగల 1 ఘనపుటడుగు నీటిలో 1148 ఘనపుటడుగుల “అమ్మోనియా” (Ammonia) వాయువు † కరగును. 20 అంశముల యుష్ణోగ్రతగల 1 ఘనపుటడుగునీటిలో 529 ఘనపుటడుగులు మాత్రమే కరగును. మరుగుచున్న నీటిలోనేమియు కరగియుండదు. ఇట్లే ఒత్తుడెంత హెచ్చుగానున్న ద్రావణీయతయు నంత విస్తరించును.

ఘనద్రవ పదార్థములందువలెనే వాయుపదార్థములందును శీతోష్ణములవలన సంకోచవ్యాకోచములు గలుగును. కాని వాయుపదార్థములందలి సంకోచవ్యాకోచములు ఘనద్రవపదార్థములందువలె స్వల్పములుగావు. 100 ఘనపుటడుగుల వాయువు యొక్క యుష్ణోగ్రతను 60 శ. అంశములు హెచ్చుచేసినయెడల దాని ఆయతనము 122 ఘనపుటడుగు లగును. వాయుపదార్థముల ఆయతనము ఉష్ణమువలననేగాక ఒత్తుడు తగ్గించుటవలన గూడ హెచ్చును. ఒత్తుడు హెచ్చినయెడల ఆయతనము తగ్గును.

* ఇది యొకవాయుపదార్థము. 26-వ పుటచూడుడు.

† 28-వ పుటచూడుడు.

శీతతనుగాని, ఒత్తుడునుగాని, రెంటినిగాని తగినంతపెచ్చించుటవలన వాయుపదార్థములను ద్రవపదార్థములుగా జేయవచ్చును. ఆవిరి చల్లబరచినయెడల నీరగుట మనము ప్రతిదినమునుచూచుచున్నదే. తగినంత శీతతను ఒత్తుడును గలుగజేయుటవలన నేవాయుపదార్థమునయినను ద్రవపదార్థముగను, ఏద్రవపదార్థమునయినను ఘనపదార్థముగను మార్చవచ్చునని శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము.

పైని ఘనద్రవవాయుపదార్థముల ముఖ్య ధర్మములు కొన్ని వ్రాయబడెను. భౌతికవికారములందు అవిమారు నప్పటికిని పదార్థముల నైజస్వభావముమారదు. కానవీనిని “భౌతిక ధర్మములు” (Physical properties) అనవచ్చును.

సర్వపదార్థములకును “జడత” (Inertia) యొకసామాన్యధర్మము. “దీనినిబట్టి బహిఃప్రేరణలేనిచే యేపదార్థముయొక్కస్థితిగాని మారదు.” ఎట్లున్నదట్లే యుండును. పదార్థములందు మార్పులుగలుగుటకు కారణములుండవలయును. ఈకారణములకు “శక్తులు” (Forces) అనిపేరు. ఉష్ణతయను శక్తిచేత నేయి కరగి ద్రవరూపము బొందుచున్నది. నీరు ఆవిరి యగుచున్నది. “ఒత్తుడు” అనుశక్తిచేత కలకండ మార్ణమగుచున్నది. భూమి “గురుత్వాకర్షణము” (Gravity) అనుశక్తిచే ప్రతివస్తువును తన మధ్యకులాగుకొనుచుండుటచేత నీవస్తువులకు “బరువు” (Weight) గలిగి, మనమేదేనివస్తువును పైకెగురవేసినపుడది తిరుగ భూమి మీదనేపడుచున్నది. ఒకపదార్థము మరియొక పదార్థమునంటి చలించునపుడు ఆచలనము “ఘర్షణ” లేక “రాపిడి” (Friction) అనుశక్తిచే నాపివేయబడుచున్నది. ఇట్లు విద్యుత్ (Electricity), ప్రకాశము (Light), లోహచుంబకత్వము (Magnetism), మొద

లగు నితరశక్తులవలనగూడ పదార్థములందనేక మార్పులు గలుగుచున్నవి.

ఘర్షణవలన నుష్ణము పుట్టుచున్నది. మనము రెండు వస్తువుల నొకదానిపై నొకటి రాచినయెడల వేడిమి పుట్టును. నిప్పు పుల్లలు కనిపెట్టబడక పూర్వము చెక్కుముక్కితో రాతిపై గొట్టుటచేతనేకదా నిప్పును చేసికొనుచుండిరి! మన మొకలక్కకడ్డిని ఉన్నిగుడ్డతో గట్టిగా తోమినయెడల దానికి చిన్న చిన్న కాగితపు ముక్కలుమొదలగు వాని నాకర్షించు శక్తివచ్చును. ఈ శక్తియే “విద్యుచ్ఛక్తి” (Electricity). ఇదియు ఘర్షణవలననే పుట్టినది. విద్యుచ్ఛక్తివలన ధ్వనియు ఉష్ణమును ప్రకాశమును పుట్టుచున్నవి. ఉరుములును మెరుములును పిడుగులును విద్యుచ్ఛక్తివలననే గలుగుచున్నవి. ఇప్పుడు చెన్నపట్టణములో ననేకులయిండ్లలో జూడనగు బ్రకాశమానమగు దీపములు విద్యుద్దీపములే.

ఘర్షణవలన నుష్ణమును విద్యుచ్ఛక్తియు, విద్యుచ్ఛక్తిచే ధ్వనియు ప్రకాశమును ఉష్ణమును, ఇట్లొక శక్తి నుండి మరియొక శక్తి పుట్టుచుండుటచే ప్రకృతిశాస్త్రజ్ఞులు పైనిచెప్పబడిన వివిధ శక్తులన్నియు నొకే “శక్తి” (Energy) యొక్క పరిణామము లని నిశ్చయించిరి.

రసాయనశాస్త్రము.

రసాయన శాస్త్రజ్ఞులచే “సృష్టియందుగల వస్తుజాలము, మూలద్రవ్యములు (Elements) అనియు, (రాసాయనిక) మిశ్రద్రవ్యములు (Compounds) అనియు, రెండు తెగలుగవిభజింపబడియున్నవి. మూలద్రవ్యములు స్వయంసిద్ధములు.” ఏ యుపాయముచేతనేని యొకపదార్థమును దానికంటె భిన్నమగు రెండు

పదార్థములుగా విడదీయలేనియెడల నట్టిపదార్థము మూలద్రవ్య మేనబడును. ఇనుము, బంగారము, ప్రాణవాయువు, యివి మూలద్రవ్యముల కుదాహరణములు. రెండుగాని రెంటికెక్కువ గాని మూలద్రవ్యముల సంయోగముచే నేర్పడినవి(రాసాయనిక) మిశ్రద్రవ్యములు. నీరు సామాన్యముగా “ప్రాణవాయువు” అని పిలువబడు అప్లజని (Oxygen) యను వాయుపదార్థముయొక్కయు “జలవాయు” వని పిలువబడు “ఉదజని” (Hydrogen) అను మరియొక వాయుపదార్థముయొక్కయు (రసాయన) మిశ్రణము.

సృష్టియం దిప్పటివరకు రమారమి యెనుబడి మూలద్రవ్యములు కనిపెట్టబడెను. అవి “ధాతువులు” (Metals) “ఉపధాతువులు” (Non-metals) అని ద్వివిధము. ధాతువులు ఉపధాతువులకంటె నెక్కువతేజస్సు గలిగి బరువైనవి. ఉష్ణమున కును విద్యుత్తునకును ధాతువులు ఉపధాతువులకంటె మిక్కిలి చురుకైన వాహకములు. ముఖ్యములైన కొన్ని ధాతువులను ఉపధాతువులను వేర్వేరుగ నిందుదాహరించెదము.

ధాతువులు (Metals)

లోహము(లో*) = Iron(Fe) *	వంగము(వ) = Tin (Sn)
స్ఫటము (స్ఫ) = Aluminium(Al)	సీసము(స) = Lead(Pb)
ఖటికము(ఖ) = Calcium (ca)	పారదము(పా)=Mercury(Hg)
మగ్నము(మ) = Magnesium(Mg)	రజతము(ర) = Silver(Ag)
సోడియము(సో) = Sodium(Na)	స్వర్ణము(స్వ) = Gold(Au)
పొటాసియము(పొ)=Potassium(K)	ప్లాటినము(ప్లా)=Platinum(Pt)

* ఇవి ఆయామూలద్రవ్యములచేల్లకు బదులుగా సుపయోగింపబడు సూక్తధాతురంబులు.

తామ్రము(తా)=Copper(Cu) మాంగనము(మాం)=Manganese(Mn)
 యశదము(య)=Zinc (Zn) అంజనము(జ)=Antimony(Sb)

ఉపధాతువులు. (Nonmetals)

అమ్లజని(అ) = Oxygen (O) హానినము(హ) = Chlorine (Cl)
 ఉదజని(ఉ) = Hydrogen (H) గంధకము(గ) = Sulphur (S)
 నత్రజని(న) = Nitrogen (N) స్ఫురము(స్ఫు)=Phosphorus (P)
 కర్బనము(క) = Carbon (C) శైలము(శై) = Silicon (Si)

ఇట్టి మూలద్రవ్యములు రమారమి యెనుబడి యని పైని వ్రాయబడెను. ఈయెనుబడి మూలద్రవ్యములకంటె భిన్నమగు వస్తుజాలమంతయు, నీమూలద్రవ్యముల సంయోగము వలన గలిగిన మిశ్రద్రవ్యములు. ఇవి యసంఖ్యములు.

అమ్లజని, ఉదజని అను మూలద్రవ్యములు రెండును గూడి జలమును మిశ్రద్రవ్యము నిచ్చుచున్నవి. ఇట్లు రెండు గాని, రెంటికెక్కువగాని మూలద్రవ్యములు పరస్పరము కలిసి కొని క్రొత్తపదార్థమునిచ్చునపుడు ఆకలిసికొనుటకు రసాయన సంయోగము (Chemical combination) అనిపేరు. అట్టి సంయోగమునందు మూలద్రవ్యములకుగల పరస్పరాకర్షణము నకు రసాయనానురాగమనియు, రసాయనాకర్షణము (Chemical attraction) అనియు పేళ్లు. జలమును విద్యుచ్ఛక్తిచే అమ్లజని గను, ఉదజనిగను విడదీయవచ్చును. ఇట్లు మిశ్రద్రవ్యములను అవి యేయేమూలద్రవ్యములసంయోగముచేనేర్పడెనో ఆమూలద్రవ్యములుగా విడదీయుట రసాయనవృత్తికరణము (Chemical

analysis) అనబడును. ఆవిడిపోవుటకు రసాయనవియోగము (Chemical decomposition) అనిపేరు.

ప్రపంచము నందలి వస్తువులన్నియు మిగుల సూక్ష్మములగు నట్టియు, దృష్టికగోచరము లగునట్టియు అనేకములగు “అణువుల” (Molecules) చే గూర్పబడిన వని ప్రకృతి శాస్త్రజ్ఞులయభిప్రాయము. ప్రతియణువును అంతకంటె సూక్ష్మములగునట్టియు తిరిగి విభజింప శక్యముగానట్టియు కొన్ని “పరమాణువులు” (Atoms) గా విభజింపవచ్చును.

మూలద్రవ్యములందలి యణువు లొకేవిధమయిన పరమాణువులచే గూర్పబడి యుండును. రెండుమూడు మూలద్రవ్యములు రసాయనసంయోగమునెంది మిశ్రద్రవ్యము నిచ్చునపుడు ఆమూలద్రవ్యములందలి పరమాణువులు కొన్ని కొన్ని చేరి మిశ్రమ అణువులుగా నేర్పడును. ఉదాహరణకు, అమ్లజనియు గలిసి నీరగునపుడు 1 అమ్లజని పరమాణువును 2 ఉదాహరణకు పరమాణువులును జేరి 1 నీటియణువుగాను.

రసాయనవికారములు పైని వ్రాయబడిన సంయోగవియోగముల వలననేకలుగుచున్నవి. ఉష్ణము మొదలగు కొన్ని శక్తులు రసాయనవికారములకు సహకారులు. రసాయనవికారముల వలన కొన్ని సమయములందు ఉష్ణము మొదలగు శక్తులు పుట్టుటయు గలదు.

ఇది వరలో గొన్ని మూలద్రవ్యముల పేర్లు మాత్రము వ్రాయబడెను. ఇచ్చట వ్యవసాయ దారుడు పరిచయము జేసికొన వలసిన కొన్ని ముఖ్యమయిన మూలద్రవ్యములను గురించి

నియు, వాని రసాయన విశ్రేణములను గురించియు కొంత వ్రాయబడును.

ఉపధాతువులు.

1 అమ్లజని (Oxygen):— ఇదివాయువులో అసంయోగ స్థితి (Uncombined state) యందు ఐదింట నొకపాలున్నది. దీనిని సామాన్యముగా ప్రాణవాయు వందురు. సంయోగస్థితి (Combined state) లో జలమునందు తూనికకు (by weight) తొమ్మిదింట నెనిమిదిపాళ్లున్నది. అమ్లజనికి కొంచె మించు మించుగా దక్కిన మూలద్రవ్యము లన్నిటితోను, రసాయన సంయోగము నొందు సామర్థ్యము గలదు.

అమ్లజనితో నితర మూలద్రవ్యములు గలియుటచే నేర్పడు రసాయన విశ్రేణములకు “అమ్లజనిదములు,” (Oxides) అని పేరు. నీరు ఉదజనియొక్క అమ్లజనిదము(ఉ₂అ). బాగ్గుపులుసుగాలి కర్బనముయొక్క అమ్లజనిదము(కఅ₂). బాగ్గుపులుసుగాలిలో ప్రతి యణువునందును ఒక్కకర్బనపరమాణువునకును రెండు రెండు అమ్లజని పరమాణువులునుఉండుటచే దానికి కర్బనద్వ్యమ్లజనిదము (కఅ₂ Carbon Dioxide, CO₂) అను శాస్త్రీయనామము గలిగెను. ఒకేమూలద్రవ్యమునకు పెక్కు అమ్లజనిదము లుండునపుడు అమ్లజనిదములపేళ్లలో అమ్లజని పరమాణువుల సంఖ్యగూడ సూచింపబడును. “స్ఫురత్పంచామ్లజనిదము” (స్ఫు₅అ₅ Phosphorus pentoxide-P₂O₅) “గంధకత్ర్యమ్లజనిదము” (గఅ₃ Sulphur trioxide-SO₃) మొదలగునవిందుకుదాహరణములు.

ఉపధాతువుల యమ్లజనిదములలో ననేకము నీటిలో కరగు నపుడు “అమ్లములు” (Acids) అనుపదార్థము లేర్పడును. కర్బన ద్వ్యమ్లజనిదము నీటిలో కరగుటవలన “కర్బనికామ్లము” (ఉక్తల్క Carbonic acid, H_2CO_3) ఏర్పడును. “నత్రజపంచామ్లజనిదము” (నల్క Nitrogen pentoxide N_2O_5) నీటిలో కరగునెడల నత్రికామ్లము (ఉనల్క Nitric acid HNO_3) ఏర్పడును. గంధకత్ర్యమ్ల జనిదము (గల్క) నీటిలో కరుగుటవలన “గంధకికామ్లము” (ఉగ్గ $Sulphuric acid, H_2SO_4$) ఏర్పడును. ఇదియెగంధకద్రుతి.

ధాతువులయమ్లజనిదము లిట్లు నీటిలో గరగి యమ్లముల నీయవు. ఇట్టి యమ్లజనిదములకు “భస్మములు” (Bases) అని పేరు. భస్మములు అమ్లములతో గలిసినయెడల “లవణములు” (Salts) అను పేరుగల మిశ్రద్రవ్యము లేర్పడును. “లవణము” అను పేరు మనము ప్రతిదినమును ఉపయోగించు ఉప్పునకే గాక దానివంటివేయగు నిట్టి మిశ్రణములకన్నిటికిని చెల్లును.

సాధారణముగా భస్మములు అమ్లములతో కలిసినపుడు లవణములుగాక కొంతజలముగూడ ఏర్పడును. “ఖటికామ్లజనిదము” (ఖల్క Calcium oxide CaO) అను భస్మమును, నత్రికామ్లము (ఉనల్క) ను గలిసి “ఖటికనత్రితము” (ఖనల్క Calcium Nitrate, $CaNO_3$) అను లవణమును జలమును యచ్చుచున్నవి. లవణములకు పేరు అవి యేర్పడుటకు హేతుభూతమగు భస్మముల యొక్కయు, అమ్లములయొక్కయు పేళ్లనుబట్టి గలుగును. ఉ. ఖటికనత్రితము. (ఖనల్క).

పై నుదాహరింపబడిన అమ్లము లన్నిటియందును అమ్లజని కలదు. కాని అమ్లజని లేకయే వుట్టు మరికొన్ని అమ్లములుగూడ

కలవు. ఉదజనియొక్కయు హానినముయొక్కయు సంయోగము వలన “ఉదజహరికామ్లము” (ఉహ Hydrochloric acid, HCl) పుట్టుచున్నది. ఇట్టి యమ్లములును భస్మములతోగూడి లవణముల నిచ్చును. కాని ఈయమ్లములందు గాని వానినుండి పుట్టులవణము లందుగాని అమ్లజనియుండదు. కావున అమ్లమునగా ధాతువుచేత గాని, తత్తుల్యముగు మిశ్రద్రవ్యముచేతగాని న్యస్తము చేయబడ తగిన ఉదజనిపరమాణువు ఒకటిగాని ఒకటికంటె నెక్కువగాని కలిగిన మిశ్రమపదార్థమని చెప్పవచ్చును. గంధకీకామ్లము (ఉ₂గ₄)లో రెండుఉదజని పరమాణువులుగలవు. గంధకీకామ్ల ము భస్మములతోగాని కొన్ని ధాతువులతోగాని కలిసినపుడు అందలి రెండు ఉదజని పరమాణువులుగాని అందొకటియెగాని ధాతువులచే న్యస్తముచేయబడును. గంధకీకామ్లము నందలి ఉద జనిపరమాణువులను సోడియపరమాణువులచే న్యస్తముచేసినయె డల “సోడియగంధకీతము” (సో₂గ₄ Sodium sulphate, Na₂SO₄) ను, ఖటికముచే న్యస్తముచేసినయెడల “ఖటికగంధకీతము” (ఖగ₄ Calcium sulphate, CaSO₄)ను ఏర్పడును. అమ్లములనగా నిట్లు న్యస్తముచేయదగిన ఉదజనిపరమాణువులుగల రసాయన మిశ్రణములు. అమ్లములు నీలవర్ణపు లిట్మస్ * (Blue litmus) కాగితమును ఎర్రబరచును.

2. ఉదజని (Hydrogen):—ఇది అమ్లజనితో గలిసిన నీరుగును. గనుక దీనికి ఉదజని యను పేరును జలహాయవను సామంతరమును సార్థకములు. ఉదజని అసంయోగస్థితియం

దుండుట అరుదు. ఇది సామాన్యముగా సేంద్రియపదార్థము* లన్నిటియందును నిరింద్రియపదార్థములలో† గొన్నిటియందును సంయోగస్థితిలో గాననగును. అమ్ములందు ఉదజనిపరమాణువులు ధాతువులచే న్యస్తముచేయబడుటచేతనే లవణము లేర్పడునని పైనివాదమును. కొన్ని ధాతువుల యమ్లజనిదములతో జలముకలిసినయెడల “ఉదజనితములు” (Hydrates) ఏర్పడును. ఖటిక అమ్లజనిదము (ఖలి Calcium oxide, CaO =పొడిసున్నము) ను, జలమునుగలిసి, ఖటిక ఉదజనితము (ఖలిఉ Calcium Hydrate CaOH =ముగ్గు) అగును. ఇట్లే సోడియ ఉదజనితము (సోలఉ) ను, పొటాసియ ఉదజనితము (పొలఉ) ను, మగ్న ఉదజనితమును ఏర్పడును. ఈనాల్గును ఎర్రలిట్మస్ (Red litmus) కాగితమును నీలవర్ణముగా జేయును. వీనికి తూరములు (Alkalies) అనిపేరు.

3. నత్రజని (Nitrogen):—ఇది వాయుప్రసంధు అసంయోగస్థితిలో నైదింట నాలుగుపాళ్లుండును. సురేకారము (Saltpetre) నవాసారము (Salammoniac) మొదలగు కొన్ని నిరింద్రియపదార్థముల (Inorganic substances) లోను కొన్ని సేంద్రియపదార్థములలోను (organic substances) లోను ఇదిసంయోగస్థితియందుండును. భూమినావరించియుండు వాయుప్రముఖ్యముగా 1 పాలు అమ్లజనియొక్కయు 4 పాళ్లు నత్రజనియొక్కయు సామాన్యమిశ్రణము (Mechanical-mixture). రెండుగాని రెంటికెక్కువగాని పదార్థములు రసాయనసంయోగమునెందకయే కలిసియుండు

* జంతు, వృక్షసంబంధమయిన పదార్థములు. † జీవములేని ఖనిజములు
మొదలగువాని సంబంధమయిన పదార్థములు.

నెడల సట్టిమిశ్రణము “సామాన్యమిశ్రణము” అనబడును. సామాన్యమిశ్రణముల ధర్మములందు అందలి ఘటకావయవముల (constituents) యొక్క ధర్మములు గలిసియుండును. రసాయనమిశ్రణములందా ఘటకావయవముల ధర్మములకును, మిశ్రణము యొక్క ధర్మములకును పోలిక యేగానరాదు. “వాయువు” అను సామాన్యమిశ్రణమునందు అమ్లజనియు సత్రజనియుగాక కొంత కర్బనద్వ్యస్తజనిదము (కల్) ను, మరికొన్ని వాయుపదార్థములును, కొంత తేమయుగూడ ఉండును. ఇదిగాక అందు దుమ్ము, రేణువులును, కొన్ని సూక్ష్మజీవులు * (Bacteria)ను వానిసిద్ధబీజములు † (Spores)ను గూడ తేలుచుండును.

సత్రజని 5 అమ్లజనిదములనిచ్చును. అందు ముఖ్యమైనది సత్రజపంచామ్లజనిదము (న₂ఓ₅, Nitrogen pentoxide N₂O₅). ఇది జలముతో గలియుటవలన సత్రికామ్లము (ఉనల) ఏర్పడును. ఇందలి యుధజని పరమాణువులకు బదులుగా ధాతువులపరమాణువులు బ్రవేశించుటచే సత్రితములను లవణము లేర్పడును. సురేకారము పొటాసియనత్రితము (పొనల, Potassium nitrate, KNO₃) అను లవణము. వృక్షాదులు పెరుగుటకు సత్రజని యత్యవశ్యకము. వాయువునందలి సత్రజనిని వృక్షాదులు సామాన్యముగా దీసికొనజాలవు. వానికి వలయునత్రజని నేలయందలి సత్రితములనుండియె లభించుచున్నది.

సత్రజనిఉదజనితో గలిసి “అమ్మోనియా” (న₃, Ammonia, NH₃) యను మిశ్ర వాయుపదార్థమునిచ్చును. ఈ మిశ్రణమునందు ప్రతి

* మిగులసూక్ష్మములగు సుద్భిజములు. † సామాన్యవృక్షములలో విత్తులవలె, పండ్లనవృద్ధికొరకేర్పడిన సూక్ష్మజీవులు.

నత్రజని సరమాణువుతోను 3 ఉదజని సరమాణువులు గలిసి యుండును. నవాసారమును పొడిసున్నమును చేతిలో వేసి నల్లి, తడుపుటచే పుట్టుఘాటగు వాయుపదార్థమిదియె. ఇది ధాతువుల వలెనే అస్లుములతో సంయోగము నొంది అమ్మోనియా లవణముల నిచ్చును. ఎర్రలిట్ మస్ కాగితమును నీలవర్ణముగా మార్చుటచే దీని ఉదజనితము (నడ్డ అడ్డ Ammonium hydrate, NH_4OH) గూడ యౌరములలో జేర్చబడుచున్నది.

4. కర్బనము (Carbon):—ఇది అంగారము, (Charcoal= బొగ్గు), గ్రాఫైతము* (Graphite), వజ్రము (Diamond), అను రూపాంతరములుగా లభించు ఘనపదార్థము. కర్బనము అమ్లజని తోగలిసి కర్బనద్వ్యమ్లజనిదము (కల్) నిచ్చుననియు ఇది వాయువు నందు కొంతయుండుననియు పైని వ్రాయబడెను. కర్బనద్వ్యమ్ల జనిదము మనము ఊపిరివిడుచు వాయువునందు విశేషముగా నుండును. దీపము వెలుగునపుడును, సేంద్రియపదార్థములు క్రుళ్లు నపుడును, ఈ వాయువు పుట్టును. వృక్షములు తమకు కావలసిన కర్బనమును వాయువునందలి కర్బనద్వ్యమ్లజనిదమునుండియే తీసికొనును.

కర్బనద్వ్యమ్లజనిదము (కల్) నీటిలో కరగుటవలన “కర్బని కామ్ల” మేర్పడును. కర్బని కామ్లము (ఉక్ కల్, carbonic acid) వలన బుట్టులవణములు “కర్బనితములు” (Carbonates). నీమసున్నము ఖటిక కర్బనితము (ఖకల్, Calcium carbonate CaCO_3).

ప్రతి సేంద్రియ పదార్థమునందును కర్బనముండును. కర్బన మయొక్క రసాయన మిశ్రణముల సంఖ్య తక్కిన వానికంటె

* నీసలేఖని (రూల్స్ పెకె సిల్) లోనుండు నల్లని కడ్డి దీనితో జేయబడినదే.

నెక్కువగుటచేత, రసాయన శాస్త్రమునందొక ప్రత్యేకభాగము కర్బన ద్వ్యమజనితము మొదలగు గొన్ని మిశ్రణములు గాక తక్కిన కర్బన మిశ్రణములన్నిటిని గురించియు బోధించుటకు నియమింపబడెను. దీనికి "సేంద్రియరసాయనశాస్త్రము" (Organic Chemistry) అనిపేరు. ఈ శాస్త్రము ముఖ్యముగా సేంద్రియపదార్థములను గురించియే బోధించుటచే దీనికి పేరుగలిగెను.

సేంద్రియరసాయన శాస్త్రమున వివరింపబడు మిశ్రణము లలోనీ క్రిందితరగతులు ముఖ్యములు.

1. మాంసకృత్తులు. (Proteids):— ఇవి కర్బనము, ఉదజని, నత్రజని, కొంచెముగంధకము వీనిరసాయనమిశ్రణములు. ఇవి ముఖ్యముగా జంతువుల మాంసమునందును, రక్తమునందును, ఉద్భిజముల విత్తనములలోను ఉండుపదార్థములు. కోడి గుడ్డు నందలి సోన చాల వరకిదియె.

2. కర్బనోజ్జనితములు (Carbohydrates):— ఇవి కర్బనము, ఉదజని, అమలజని యీమూడు మూలద్రవ్యములయొక్కయు మిశ్రణములు. వీనిలో నుదజని పరమాణువులును అమలజని పరమాణువులును నీటిలోనున్న పాళ్లప్రకారమేయుండును. పిండి (Starch), చక్కెర (Sugar), ఇవి కర్బనోజ్జనితముల కుదాహరణములు.

3. క్రొవ్వులు (Fats):— ఇవిగూడ కర్బనోజ్జనితములవలె కర్బనము, ఉదజని, అమలజని అను మూడింటి సంయోగముచేతనే యేర్పడు పదార్థములే గాని, యిందు ఉదజనిపరమాణువులు అమలజనిపరమాణువులకంటె రెట్టింపున కెక్కువగానుండును.

నేయి, నూనె, జంతు శరీరములందలి క్రొవ్వు, యివి క్రొవ్వు పదార్థముల కుదాహరణములు.

ఇవిగాక పైనివివరింపబడిన అమ్లముల స్వభావమునేగలిగి, యట్లే లవణములనిచ్చు “సేంద్రియ అమ్లములు”(Organic acids) అనుతరగతియు, యితరసేంద్రియపదార్థముల తరగతులు మరి కొన్నియు గలవు. వానినన్నిటిని గురించియు నిచట విరళముగా వ్రాయనవకాశము లేదు.

సేంద్రియపదార్థము క్రుళ్లునపుడు వాయువంతగా జొరకుండి నయెడల సంకీర్ణము (Complex) లగు “హ్యూమికామ్లము” (Humic acid) అల్లి కామ్లము (Ulmic acid) మొదలగు కొన్ని అమ్లములును, యితరపదార్థములును పుట్టును. ఇవన్నియుగూడి సామాన్యముగా “హ్యూమసు” (Humus) అని పిలువబడును. పేడకుప్పలును, గడ్డివాములును తడిసిపోయినపుడు వానినుండి ప్రవహించు నీరు నల్లగానుండుట అందు హ్యూమసుకలిసియుండుటచేతనే.

ప్రభుత్వరణమునందు సేంద్రియపదార్థములు సామాన్యముగా తేమ(Moisture)మాంసకృత్తులు, కర్బనోజ్జనితములు, క్రొవ్వులు, బూడిద(Ash)అను నైదుభాగములుగా విడదీయబడును.

5. హరినము(Chlorine):— మొదటిమూడు మూలద్రవ్యములవలె నిదిగూడ వాయుపదార్థమే. మనము వంటకములలో నుపయోగించుకొను “ఉప్పు” నందు ఇదియు సోడియమును గలిసియున్నది. ఉప్పునగాసోడియహరిదము (సోహ=Sodium chloride, NaCl). ఇది ఉదజహరికామము (ఉహ) నందలి యుదజనిపరమాణువులు సోడియపుపరమాణువులచే న్యస్తము చేయ

బడుటచే నేర్పడును. ఇట్లే మరెకొన్ని ధాతువుల హరిదములును పుట్టుచున్నవి.

6. గంధకము (Sulphur):—ఇది ఘనపదార్థము. గనులలో అసంయోగస్థితియందును సంయోగస్థితియందునుగూడ దొరకును. గంధకమును కాల్చినపుడు అది యల్లుజనితో సంయోగంబునెంది “గంధక ద్వ్యష్లుజనిదము (గల్ఫు Sulphur Dioxide) అను ఘాటగు వాయుపదార్థమేర్పడును. ఇది జలముతోగలిసి “గంధకామ్లము(ఉల్ఫు గల్ఫు Sulphurous acid H_2SO_3) నిచ్చును. ఈయమ్లమువలన “గంధకాయితము” (Sulphites) అను లవణములుపుట్టును. గంధకము అమ్లజనితోగలిసి “గంధక త్ర్యష్లుజనిదము” (గల్ఫు Sulphur trioxide, SO_3) అనుమరియొక్కఅమ్లజనిదము నిచ్చుచున్నది. ఇది జలముతోగలియుటచే గంధకి కామ్లము (ఉల్ఫు గల్ఫు Sulphuric Acid H_2SO_4) ఏర్పడును. ఈ యమ్లమునుండి పుట్టులవణములు “గంధకితములు” (Sulphates). గంధకము ప్రత్యేకముగా నితర మూలద్రవ్యములతో గలియునపుడు పుట్టు మిశ్రణములు “గంధకిదములు” (Sulphides) అనబడును. ఇంగిలీకము పారదముయొక్క గంధకిదము.

7. స్ఫురము (Phosphorus):—ఇదియు ఘనపదార్థమే. ఇది సంయోగస్థితియందు మాత్రమే దొరకును. జంతుశరీరములందు (ముఖ్యముగా ఎముకలయందు) ను, వృక్షములందు (ముఖ్యముగా బీజములందు)ను విశేషముగానుండును. స్ఫురము శత్రజనివలెనే 5 అమ్లజనిదముల నిచ్చును. అందుస్ఫురత్పంచామ్లజనిదము (స్ఫుల్ఫు)ముఖ్యము. ఇది నీటిలోకరగుట వలన స్ఫురికామ్లము (ఉల్ఫు స్ఫుల్ఫు) ఏర్పడును. దీని నుండి పుట్టు లవణ

ములు స్ఫురితములు. ఎముకలలోనుండు ముఖ్యపదార్థము ఖటిక స్ఫురితము. ప్రతి స్ఫురికామ్లపు అణువునందును, 3 ఉదజని పరమాణువు లుండును. ఇందొక్కొకదానికి బదులుగాని రెంటి రెంటికి బదులుగాని, అన్నిటికి బదులుగాని ఖటికము మొదలగు ధాతువుల బరమాణువులను బ్రవేశ పెట్టవచ్చును. కాన స్ఫురికామ్లమునుండి మూడువిధములగు లవణములు పుట్టును. ఒక్కొక్క ఉదజని పరమాణువునకు బదులుగా మాత్రమే ఖటికపు పరమాణువులువచ్చునెడల ఏకఖటికస్ఫురితమును ($\text{ఖ}_4(\text{స్ఫ}_4)_2$ Monocalcic Phosphate $\text{Ca H}_4(\text{PO}_4)_2$), రెంటిరెంటికి బదులుగా వచ్చునెడల ద్విఖటికస్ఫురితమును ($\text{ఖ}_2\text{ఉ}_2(\text{స్ఫ}_4)_2$ (Dicalcic phosphate, $\text{Ca}_2 \text{H}_2 \text{PO}_4$) అన్నిటికి బదులుగా వచ్చునెడల త్రిఖటిక స్ఫురితమును ($\text{ఖ}_3(\text{స్ఫ}_4)_2$ Tricalcic phosphate $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ వర్పడును. ఎముక లందుండునది త్రిఖటికస్ఫురితము.

8. శైలము (Silicon):—ఇది యిసుకరూపముగా సంయోగస్థితియందు విశేషముగా లభించును. ఇసుక శైలద్వ్యమ్లజనిదము ($\text{శై}_2 = \text{Silicon dioxide, SiO}_2$). కొండలయందును, మంటిలోను శైలమిశ్రణములు (Silicon compounds) అనేకములు గలవు. శైలద్వ్యమ్లజనిదమును జలమును గలిసి శైలికామ్లము ($\text{ఉ}_4\text{శై}_4$ Silicic acid H_4SiO_4) నీయకపోయినను, ఆయన్లమును మితశైలికామ్లము ($\text{ఉ}_2\text{శై}_3$ Meta silicic acid H_2SiO_3) అను మరియొక అమ్లమును వేరువిధముగ లభించుచున్నవి. వీని

నుండియు విడిగా లభింపక పోవుటచే నూహ్యములు (Imaginary) మాత్రమే యగు మరికొన్ని విధముల శైలికాష్ణములనుండియు వివిధములగు శైలితములు పుట్టుచున్నవి. శైలికాష్ణమునందలి ఉదజని పరమాణువులలో కొన్ని యొకధాతువుయొక్క పరమాణువులవలనను, మరికొన్ని మరియొకధాతువుయొక్క పరమాణువులవలనను ఇట్లనేకధాతువులచే నాదేశముచేయబడుటచే సంకీర్ణము లగుమిశ్రమశైలితములు (Double silicates) పుట్టును. వీనినిగురించి యుదవయధ్యాయమున మరొకొంత వ్రాయబడును.

ధాతువులు (Metals).

1. లోహము (Iron):—దీనికి సామాన్యనామము ఇనుము. త్రుప్ప అనునది లోహికాష్ణజనిదము (లో₂ అ₃ Ferric Oxide Fe_2O_3) దీనివలననే కొన్ని నేలలకు ఎర్రనిరంగు కలుగుచున్నది.

2. స్ఫటము (Aluminium):—మన మిటీవల నుపయోగింపనారంభించిన “అలూమినియమ్” గిన్నె లీధాతువుతో జేయబడినవే. ఇది అష్ణజనిద (Oxide) రూపమునను శైలిత (Silicate) రూపమునను నేలయందు విశేషముగా గలదు.

3. ఖటికము (Calcium):—ఇది సున్నమునందలి ధాతు భాగము. పొడిసున్నము ఖటికాష్ణజనిదము (ఖ అ). సీమసున్నము ఖటికకర్బనితము (ఖ క అ₃).

4. మగ్నము (Magnesium):—దీనిపావళినాడు వెలిగింప

బడు విశేషకాంతినిచ్చు తీగ యీధాతువుతో జేయబడినదే. ఈతీగ వెలుగునపుడు ఏర్పడుబూడిద మగ్నెషియంజనిదము (మ అ=Magnesium oxide, MgO).

5. సోడియము (Sodium):—ఉప్పు సోడియ హరిదమని యిదివరలో వ్రాయబడెను. “సోడా” యనునది సోడియామ్ జనిదము(సో₂అ)ఇది నీటిలోకరగుటవలన దాహకసోడా(Caustic Soda $Na OH =$ సోడియ ఉదజనితము సో అ ఉ) ఏర్పడును. సోడియనైట్రితము (సో న అ₃ = Sodium nitrate $Na NO_3$)నత్ర జనపుయెరుపు (Nitrogenous manure) గా నుపయోగింప బడు చున్నది.

6. పొటాసియము (Potassium):—ఇది కర్ర, ఆకులు మొదలగు సేంద్రియపదార్థములు కాల్చినపుడు శేషించుబూడిద యందు విశేషముగానుండును. కాన దీనికి బూడిదకారమని కూడ పేరు. దీని అమ్లజనిదము (పొ₂అ) నకు పొటాష్ (Potash) అనిపేరు. ఇది నీటిలో గరగుటవలన దాహకపొటాష్ (Caustic Potash $KOH =$ పొటాసియ ఉదజనితము, పొ అ ఉ) ఏర్పడును.

కడపటి నాలుగుధాతువులును తొరధాతువు (Alkali metals) లనబడును. వీని ఉదజనితములు తొరములనబడునని యిదివర లోనే వ్రాయబడెను.



మూడవయధ్యాయము.

వృక్షశాస్త్రము.

(Botany.)

వ్యవసాయశాస్త్రమునకు సహకారులగు బ్రకృతి శాస్త్రములలో వృక్షశాస్త్రము ముఖ్యమయినది. సూక్ష్మదర్శని* (Microscope) సాహాయ్యము చేతనేగాని దృష్టికి గోచరము కానంత చిన్నవి యగు సూక్ష్మదండకలు (Bacteria=విశూచి దొమ్మమొదలగు జాడ్యములకు కారణభూతములగు నతినూత్నములగు నుద్భిజ్జములు) మొదలు శాఖోపశాఖలుగా విజృంభించు మహావృక్షములవఱకు గల సృష్టియందలి యుద్భిజ్జము లన్నిటికి యొక్క శారీరనిర్మాణమును గురించియు ధర్మములను గురించియు దెలుపుశాస్త్రము వృక్షశాస్త్రమనబడును. వ్యవసాయదారుడు తెలిసికొనదగిన నీశాస్త్రమందలి ముఖ్యాశములను గొన్నిటిని సంగ్రహముగా నిచట వివరించెదము.

అనేకవిచిత్రరూపభేదములచే నెప్పుచు, నొకదానినొకటి పోలియుండ నట్టియు, నసంఖ్యాకము లగునట్టియు, నుద్భిజ్జ

* చిన్నచిన్న వస్తువులను మిగుల పెద్దవిగా నగుపడజేయుయంత్రము. జీవశాస్త్రమునందలి 363-వ పుట (2-వ కూర్పు) చూడుడు.

జాతులన్నియు వృక్షశాస్త్రమందు నాలుగు తరగతులుగా విభాగింపబడుచున్నవి.

నీటిపాచి (పసిడికపోగులు) లోనుగా గల శైవలములును (Algæ), కుక్కనొడుగు (Agaricus), బూజు, (Penicillium), సూక్ష్మదండికలు (Bacteria) మొదలుగాగల శిలీంధ్రములు (Fungi)ను మొదటితరగతిలోనివి. ఈతరగతి యుద్భిజ్జము లతి సూక్ష్మములు. ఇం దనేకములు సూక్ష్మదర్శని సాహాయ్యము లేనియెడల గానరావు. వీనిశరీరములందు సామాన్యముగా పేరు (Root), కాండము (Stem), ఆకు(Leaf), అని సామాన్య వృక్ష జాతులలోవలె నంగవిభాగము (Differenciation) లేదు. మనము సాగుచేయు కొన్నికొన్ని సస్యములకు పట్టు “కాటుకతెగులు” (Smut) “మజ్జిక తెగులు” మొదలగు తెగుళ్లు ఈతరగతిలోని వగు శిలీంధ్రములవలననే గలుగుచున్నవి.

నీరు నిలువగానుండు చెఱువులు మొదలగు జలాశయము లలో పెరుగునాచు(Moss)లోనుగాగల యుద్భిజ్జములు రెండవ తరగతిలోనివి. వీనిలో సాధారణముగా ఆకు కాండము అను నంగములుమాత్రమే యుండును.

ఫెరనులు (Ferns) మొదలగునవి మూడవ తరగతిలోనివి. వీనిలో సామాన్య వృక్షములలోవలె “పేరు, కాండము, ఆకు” అను, నంగ విభాగము గలదు. కాని, కాండము సామాన్యముగా పసుపు మొదలగు జాతులలోవలె నేలయందే యుండు దుంప

(Rhizome)యియుండును. ఈతరగతి యుద్భిజ్జములు పుష్ప రహితము లగుట వీనికిని సామాన్య వృక్షములకును గల ముఖ్య భేదము. మిగుల రమ్యములగు ననేక జాత్యుపజాతులతో నెప్పసీతరగతి యుద్భిజ్జము లుద్యాన వనములలో గడు గార వింపబడుచున్నది.

పుష్పించు నుద్భిజ్జము లన్నియు నాల్గవ తరగతిలోనివి. వీనికి హెచ్చుతరగతి యుద్భిజ్జముల (The higher plants)ని పేరు. వేరు, కాండము, ఆకు అను మూడేగాక కొంతకాలము గడచిన పిమ్మట “పూవు” (Flower)అను మఱియొక యంగమును గూడ గలిగియుండుటచే నీతరగతి యుద్భిజ్జములందు తక్కిన వానితో కంటే నంగ విభాగము (Differentiation) హెచ్చుని చెప్పవచ్చును. కావున నీతరగతి యుద్భిజ్జములకు హెచ్చు తరగతి యుద్భిజ్జములని పేరు వచ్చెను.

సామాన్యముగా పూవు (flower) నూడి కాయ (Fruit) విత్తు (Seed) అనునంగములుగూడ బయలుదేరును.

హెచ్చు తరగతి యుద్భిజ్జములు “నగ్న బీజములు” (Gymnosperms), “కోశస్థబీజములు” (Angiosperms)అని ద్వివిధము. కోశస్థబీజోద్భిజ్జములలో విత్తులు కాయలలో మూయబడి యుండును. నగ్న బీజోద్భిజ్జములలో నట్లు గాక పై కగుపడుచుండును. ఇదియే నీరెంటికినిగల ముఖ్యభేదము. నగ్నబీజోద్భిజ్జము లీప్రాంతములం దరుదు. శీతలప్రదేశములం దవిమోక్షు.


గానుండును. మనము సాగుచేయు సస్యజాతులును ఇతర చెట్లు చేమలును సామాన్యముగా కోశస్థబీజములు.

కోశస్థబీజములు మరల “ఏక బీజదళములు” (Monocotyledons) “ద్విబీజదళములు” (Dicotyledons) అని ద్వివిధము: కొబ్బెర, అరటి, జొన్న, వరి మొదలగుజాతులు ఏక బీజదళములు. మామిడి, జేమ, చిక్కుడు, వంగ మొదలగుజాతులు ద్విబీజదళములు. మన మొకచింతగింజనుగాని చిక్కుడుగింజనుగాని పగులగొట్టి చూచినయెడల నందు రెండు పప్పుబద్దలుండును. (2-వ పటము చూడుడు) ఈబద్దలకు “బీజదళములు”


A

2-వ పటము.

B



ద్విబీజదళము.



ఏక బీజదళము.

ఒక చిక్కుడుగింజలోని పప్పుబద్దలను విడదీసి వానిలోపలి వైపుచూచి నప్పటియాకారము. అ. పా. గింజపైని పొట్టుగా నేర్పడియుండు రెండు పొరలు. బీ. ద. బీజదళములు. ప్ర. మూ. ప్రథమమూలము. ప్ర. శా. ప్రథమశాఖాంకురము. ఇవిరెండును బీజాంకురమునందలి భాగములు.

వైభాగమున రెండు చిన్న అకులుగల భాగము ప్రథమశాఖాంకురము పొడుగుగా నెదిగి క్రిందికి పోవుచున్నది ప్రథమమూలము.

(Cotyledons) అని పేరు. వీనిమధ్య నూత్నమగు మొక్కనలె నుండుభాగ మొకటి యుండును. దీనికి బీజాంకురమని పేరు. ఇదియు బీజదళములును గలసి “పిండము” (Embryo) అన బడును. ఇట్టిగింజలు మొలచినపుడు బీజదళములు దళసరిగనుండు మొట్టమొదటి యాకులుగ నేర్పడును. వరి, మొక్కజొన్న, ఈత మొదలగువాని గింజలనుబరీక్షించినయెడల నందలి పిండము లందు బీజదళ మొక్కటియే గాననగును. ఇట్లొక్కబీజదళమే యుండు విత్తులుగల జాతులు ఏకబీజదళములు (Monocotyledons); రెండుబీజదళములుండువిత్తులుగలజాతులు ద్విబీజదళములు (Dicotyledons). ఈ రెంటికినిగల మరికొన్ని తారతమ్యములను ముందుముందు తెలిసికొనగలుగుదుము.

సామాన్యముగా కృషీవలులు సాగుచేయు సస్యజాతులన్నియు నీరెండువర్గలలోనివే యగుటచే నిందువాని శారీరనిర్మాణము (Morphology)ను గుఱించియు ధర్మముల (Physiology)ను గుఱించియు సంగ్రహముగా వ్రాయబడును.


మొదట బాహ్యనిర్మాణము (External Morphology) ను గురించి యోచింతము.

హెచ్చుతరగతి యుద్భిజ్జములందు, వేరు, కాండము, ఆకు, పూవు అను నాలుగంగములుండునని పైనివ్రాయబడెను. ఇచట వానిని గుఱించి వేరువేరుగా వివరింపబడును.

వేరు. (ROOT).

3-వ పటము.

వేరు సామాన్యముగా



నేలయందుండు నంగము.

ద్విబీజదళముల కొక పొడ

వగు తల్లివేరును, అది భూమి

లోనికి జొచ్చుకొలదిని దాని

నుండి పుట్టు ననేకములగు

పిల్లవేళ్లును ఉండును. ఈపిల్ల

వేళ్లకూడ తల్లివేరు వలెనే


మఱికొన్ని పిల్లవేళ్లుగా జీలు

చుండును. (3-వ పటము

చూడుడు)

ఒకానొక ద్విబీజదళముయొక్క-వేరు.

ఏక బీజదళములలో తల్లివేరు మిగుల పొట్టిదిగ నుండును. మొటిమవలెనుండు నీ మొండివేరునుండి యనేకములగు పిల్లవేళ్లు పుట్టును. (4-వ పటము చూడుడు) ఇవి సామాన్యముగా ద్విబీజదళముల వేళ్లకంటె మృదువుగ నుండును. వానివలె నేలలోని కఠింతలోతుగా బోక పైపైనే యుండు స్వభావము గలిగి



ఏకబీజదళముయొక్క వేరు (వరిదుబ్బ).

యుండును. ఒక మిరప మొక్కను, జొన్న మొక్కను వేళ్లలోనికి దీసి పరీక్షించినయెడల నేక బీజదళముల వేళ్లకును ద్విబీజదళముల వేళ్లకును గల భేదము బోధపడును.

వేళ్లయొక్క చివర భాగములందు మృదునగు రోమములుండును. వీనికి మూల రోమములు (Root hairs) అనిపేరు. ఇవియే యుద్భిజముల వేళ్లు నేలనుండి యాహారమును దీసి కొనుటకు సాధనములు.

వేరు సామాన్యముగా భూమియం దుండెడి యంగమయినను కొన్నిటిలో భూమికి పైభాగమునుండి పుట్టును. శాఖలనుండి పుట్టి క్రిందికి వ్రేలాడుచు చివరకు నేలలోనికి దిగి యా శాఖల కూతగానుండు మట్టియూడ లిందు కుదాహరణము.

జొన్న, మొక్కజొన్న, కొబ్బెర మొదలగు కొన్ని జాతులలో కాండమునందలి క్రింది కణుపులనుండి వేళ్లు బయలుదేరి నేల లోనికి జొచ్చును. ఇట్టి యసామాన్యపువేళ్లకు “అబ్బురపు వేళ్లు” (Adventitious roots) అని పేరు.

భూమిలోపాదుకొని చెట్టును నిలువబెట్టుటయు, భూమినుండి మూలరోమములవలన, ఆహారద్రవ్యపూరితములగు ద్రవములను ఆకర్షించుటయు వేళ్ళయొక్క ముఖ్యవ్యాపారము (Functions) లై యున్నవి. ఇవిగాక కొన్ని జాతులలో వేళ్లు కొన్ని మార్పులనొంది యితరవ్యాపారములనుగూడ జరుపుచున్నవి. ముల్లంగి (Radish) మొదలగు కొన్ని జాతులలో వేళ్లులావుగ దుంఫలవలె నేర్పడి యాహారపదార్థములను కూడబెట్టుచున్నవి. కొన్ని తీగెలలో నవి నులితీగెల (Tendrils) వలె నేర్పడి తీగెప్రాకుట కనుకూలముగ నుండునట్టితరవస్తువులను పట్టుకొనును. కొన్నిటిలో నవి సీటిమీద తేలుట కుపకరణములుగా మారును. మఱికొన్నిటిలో నవి యితరవృక్షముల శరీరము జొచ్చి వానినుండియే తమ యాహారమును దీసికొనుట కుపయోగించునట్లేర్పడును. ఇట్టితరయుద్భిజ్జముల శరీరములనుండి సారమును దీసికొను నుద్భిజ్జములు “పరపుష్పములు లేక పరాన్నభుక్కులు” (Parasitic plants) అనబడును.

కాండము (STEM).

సామాన్యముగా నేలపైనుండి యాకులను భరించియుండు

భాగము కాండము. కొబ్బెర, ఈత మొదలగు నేకబీజదళ వృక్షములకాండము గుండ్రముగను పొడవుగను ఉండును. సామాన్యముగా నిట్టికాండములకు శాఖలుండవు. ద్విబీజదళములలో కాండము అనేక శాఖలును ఉపశాఖలును గలిగియుండును.

శాఖలును ఉపశాఖలును ఆకులయొక్క పంగల (Axils)



ర - వ పటము.

వావింటకొప్పు.

పం—పంగ. కా—కాఖ. స్కం—కణుపు, లేక స్కంధశిరము.
స్కం. అం—స్కంధశిరాంతరములు.


లోనేగాని, సామాన్యముగా నితర-చోట్లబయలుదేరవు. మన-
మొక రావికొమ్మను దీసికొని పరీక్షించినయెడల ప్రతియాకుపంగ
లోను, ఒక్కొక్క మొటిమ గాననగును. దీనికి శాఖాంకురమని
పేరు. ఇదియే యెదిగి శాఖయగును.

ఏయద్భిజ్జము నందుగాని శాఖాంకురము లన్నియు నెదిగి
కొమ్మలుగావు. కొన్ని గొడ్డువోయి (Become aborted) యణగి
యుండును. వృక్షముయొక్క యాకులను వ్యాపింప జేయుట
కెన్నియవసరమో యన్నియే కొమ్మలుగా నెదుగును. కాండము
నుండి యాకులును శాఖాంకురములును వెడలు భాగములు
“క్షణపులు” లేక “స్కంధశిరములు” (Nodes) అనియు వాని
మధ్యనుండు భాగములు “స్కంధ శిరాంతరములు” (Internodes),
అనియు పిలువబడును.

అనేకము లగు నాకులను భరించి అవి తమ వ్యాపార
ములను జక్కగ జేయునిమిత్తమై శాఖోపశాఖలుగ జీలుటచే
వానిని విరివిగ వ్యాపింప జేయుట కాండముయొక్క మొదటి
వ్యాపారము. ఆహారద్రవ్య పూరితమగుద్రవములను వేళ్లనుండి
యాకులకు బ్రసరింపజేయుటయు ‘పుష్టికరము లగు రసములను
ఆకులనుండి వృక్షశరీరమున కంతటికిని’ వ్యాపింప జేయుటయు
కాండముయొక్క రెండవ వ్యాపారము. ఈ విషయమైముందు
కొంత వ్రాయబడును. స్వజాతీయ వృద్ధికి సహాయపడుట మూ
డవ వ్యాపారము. మల్లె మొదలగు జాతులలో కొమ్మలను వంచి

అంటుగా దొక్కినయెడల నాకొమ్మలువేరుపట్టి క్రొత్త మొక్కలగుచున్నవి. మట్టి, ములగ, చెఱకు, క్రోటనులు మొదలగు వానిలో కాండమును ముక్కలుగా నరకి పాతిన మాత్రముననే అవి వేరు పట్టుచున్నవి. కొన్ని జాతులలోకాండ మాహార

6 - వ పటము.



బంగాళాదుంప మొక్క.

కంటి—ఇదియే బంగాళాదుంప. ఇదియొక శాఖయొక్క కంటిగాపుట్టుట చూడుము. ఈ శాఖ ఆకుపంగనుండి యుత్పత్తి యగుచున్నది. ఎడమవైపు శాఖనుండి యొకచిన్న ఆకు పుట్టుట చూడుము.

పదార్థములను నిలువజేయుట కనుకూలముగనుండునట్లు దుంపలుగను, గడ్డలుగను నేర్పడుచున్నవి. ఉర్లగడ్డలు (బంగాళాదుంపలు), కంద, పెండలము, పసుపుకొమ్మలు, ఉల్లిపాయలు మొదలగున విందు కుదాహరణములు. వీనిని సామాన్యముగా వేళ్లయొక్క పరిణామరూపములను కొనియెదరుగాని యవి నిజముగా కాండము యొక్క పరిణామ రూపములే యయియున్నవి. బంగాళాదుంప కాం


డమునుండి పుట్టినేలలో జొచ్చి యాహారపదార్థములు కూడుకొనుటచే దుంపగానైన శాఖాభేదమేగాని వేటొకటి కాదు.

(6 వ - పటముచూడుము.)

3. అ.]

ఆకు. 7. Acharya
15/7/23

7 - వ పటము.



కంద, ఉల్లి మొదలగుదంపలనుండి యాకులు పుట్టుటవలనను, వానియందు శాఖాంకురములుండుటచేతను, అవి కాండముయొక్క పరిణామములే యని నమ్మదగియున్నది. కొన్ని జాతులలో నాత్మ రక్షణము


పొట్టితీగ-చులితీగలు (సు. తి.) అందు నకై యుపకాండము క్రింది దొకకొయ్యన చుట్టుకొని యున్నది. లు ముండ్లుగా నేర్పడుచున్నవి. దానిమమ్ము డ్లిందు కుదాహరణము. బొమ్మజెముడు, నల్లేరు మొదలగు మఱికొన్ని జాతులలో కాండమాకులవలె వెడల్పుగను ఆకుపచ్చగనునుండి యాకులు జేయు పనులనే చేయును. ద్రాక్ష మొదలగు కొన్ని జాతులలో నుపకాండములే నులితీగలు (Tendrils)గా నేర్పడి ప్రాకుటకు సాధనము లగుచున్నవి. (7-వ పటము చూడుడు.)

ఆకు. (LEAF)

ఆకునందు మూడుభాగములుగలవు. కొమ్మనంటియుండు కొంచెము లావుగనుండు మొదటి భాగమునకు “పత్రపీఠము” (Leaf - base) అని పేరు. ఏకబీజదళవృక్షములలో పత్ర

పీతము సామాన్యముగా వెడల్పుగ నుండును. [కొబ్బెర, పోక మొదలగువాని మట్టయొక్క మొదలుచూడుడు].

8 - వ పటము.



రావియాకు.

ప్రతీతమునకును మూడవ భాగముగు ప్రతదళమునకును మధ్యనున్న భాగమునకు ప్రతమధ్యము" (Leaf—stalk) అని పేరు. దీనినే సామాన్యముగా “కాడ” యందుము. కాడ కొన్నిటిలో లోపించి కాని మిగుల పొట్టిదిగగాని యుండును. [ఉ. అనాస, మామిడి]. పంపరజనన, పీకాయి మొదలగు గొన్ని జాతులలోవలె కాడకు ఉపదళములుగాని ముండ్లుగాని యుండవచ్చును. అకుయొక్క మూడవ భాగమునకు “ప్రతదళము” (Leaf—blade) అని పేరు. ఇదియాకునందలి ముఖ్యభాగము. ఉపరితలము సాధ్యమయినంత యొక్క

పీ-పీతము. మ-మధ్యము. ద-దళము. వగా నుండునట్టి భాగము సామాన్యముగా పల్చనిరేకువలె నుండును. కాని నరుడుగు (Casuarina) చెట్టు మొదలగు గొన్నిటిలో నీ భాగము కాడ

వలె గుండ్రముగను మరికొన్నిటిలో నితరరూపములుగను గూడ నుండును. కాండములే యాకులవ్యాపారమును జరపునట్లేర్పడు బొమ్మజెముడు, నల్లేరు మొదలగుజాతులలో నాకులు లోపించి గాని మిగుల చిన్నవిగను అరుదుగనుగాని యుండును.

పండినపుడును, క్రోటనులు మొదలగు కొన్నిజాతులం దునుగాక, ఆకులు సామాన్యముగా నాకుపచ్చగ నుండును. వర్ణమునందు కొంచె మించుమించుగా నెకేవిధముగానున్నను ఆకారము, పరిమాణము మొదలగు విషయములలో నాకులు విశేష భేదములు గలిగియున్నవి. కొన్నిజాతులలో మిగుల పెద్ద విగా నుండును. కొన్నిటిలో మిగులచిన్నవిగనుండును. కొన్ని యాకులు కొబ్బెర మొదలగువానిలోవలెమిగులపొడవుగను, కొన్ని తామర మొదలగువానిలో వలె గుండ్రముగను, కొన్ని సరు గుడు మొదలగువానిలోవలె నూదులవలెను, మరికొన్ని కలబంద మొదలగువానిలోవలె దళముగను, ఇట్లనేకవిధము లుగా నుండును. కొన్నిటియాకులు అరటియాకులవలె నేక ముగానుండును. ఇట్టివి “లఘుపత్రములు” (Simple leaves). మరికొన్నిటిలో చింత, కొబ్బెర మొదలగు జాతులలోవలె ఉపపత్రములుగా జీలియుండును. ఇట్టివి మిశ్రమపత్రములు (Compound leaves).

మన మేయాకునైనను షరీక్షించినయెడల నం దనేకములగు ఈనెలను గందుము. ఏక బీజదళములలో నీయినె లొకదానితో


నొకటియల్లుకొనక కొంచె మించుమించుగా సమానాంతరములుగానుండును. ద్విబీజదళములలో నిట్లుగాక నవి వలయల్లికవలె నల్లుకొనియుండును. ఈరెండువిధములవ్యాపకములకును వరుసగా సమాంతరవ్యాపకము (Parallel venation) జాలాకారవ్యాపకము (Reticulate Venation) అనిపేళ్లు. ఒక యరటియాకును రావియాకును పరీక్షించినయెడల నీభేదము స్పష్టమగును.

ఆకు ముఖ్యముగా నుద్భిజ్జములకు గావలసిన యాహారద్రవ్యములలో గొంతభాగమును సంపాదించుటకును సంపాదించిన యాహారమును జీర్ణము చేసికొని యెదుగుట కావశ్యకములగు బదార్థముల నుత్పత్తి చేయుటకును ఏర్పడిన యంగము. అయినను కొన్ని కొన్ని జాతులలో పత్రములు విశేషపరిణామమునొంది యితరవ్యాపారములనుగూడ జేయుచున్నవి.

చింత, అనుము మొదలగుజాతులలో బీజదళములు అనబడు మొదటియాకులు బీజాంకురము మొక్కగా నెదిగి తన యాహారమును తాను సంపాదించుకొనగలుగు వరకును తమయందలి యాహారద్రవ్యముల నిచ్చి పోషించును.

పసపు, అరోరూటు మొదలగు జాతుల (నేలలోనుండు) కాండములందును, పనస మర్రి మొదలగు జాతుల (సామాన్యపు) కాండములందును శాఖాంకురములకు కప్పుగా నొక విధమగు రేకులవంటి యాకులుండును. 9-వ పటముచూడుడు.


9-వ పటము.



అరోరూటుదుంప.

అ. ద. అల్పదళము.

పే. వేరు.



పనసరెమ్మ.

కా. అం. కాఖంకురము.

అ. ద. అల్పదళము.

వీనికి అల్పదళములు (scale leaves) అని పేరు. నీరుల్లి మొదలగు కొన్ని జాతులలో నీరేకులు దళముగానుండి యాహార పదార్థములను నిలువచేయును.

పలువిధములగునట్టియు, వివిధమనోహర వర్ణములతో నొప్పునట్టియు, పూవులందలి రేకులుగూడ సంతానవృద్ధి విధానమునకు సహాయభూతముగ నుండుటకుగాను మిగుల విచిత్రముగ మార్పునొందిన యాకులే. వీనికి పుష్పప్రతములు

(Floral leaves) అనిపేరు. ఇవి సామాన్యపత్రముల పరిణామ రూపములే యనుటకు నిదర్శనములు ముందు చూపబడును.

బటానీ మొదలగు కొన్ని తీగె జాతుల యాకుల చివర భాగములు నులితీగెలుగామారి తల్లితీగె ప్రాకుటకు నాధనములుగ నేర్పడుచున్నవి. ఇట్టియాకులకు లతాదళములు (Leaf-tendrils) అనిపేరు.

కొన్ని జాతుల యాకుల అంచులును కొనలును ముండ్లుగా మారి ఆత్మ సంరక్షణమున కుపయోగపడుచున్నవి. ఉ. కిత్తనార, మొగలి. దూలగొండి యాకులందలి విషద్రవముగల రోమములును మొక్కల సంరక్షణముకొర కేర్పడినవే.

కొన్ని జాతులలో ఆకులు నేలతగిలినచోట్ల వేరుపట్టి క్రొత్త మొక్కలగును. అట్టిజాతులలో నాకులు ప్రవర్ధనమునకు గూడ సాధనములగును.

కూజాచెట్టు, సూర్యబిందువు మొదలగు కొన్ని జాతుల మొక్కలలో నాకులు మిగుల చిత్రమగురూపమును గలిగి మాంసభక్షణమున కొడికట్టి యుండును. ఇట్టి యాకులపై నేదేని పురుగు నాలిన వెంటనే యవి ముడుచుకొని దానిని చెరబట్టును. ఆకులందలి రోమములు (Hairs)ను కోశములు (Glands)ను విడుచు రసములలో నిట్లు మృతినొందిన పురుగు జీర్ణమయి వృక్షముచే స్వీకరింపబడును. ఇట్లు జంతువులను జీర్ణముజేసికొని పెరుగు మొక్కలు 'మాంసభక్షకములు' (arntrorous plants) అనబడును.


ఇదివర కేకబీజదళములయొక్కయు ద్వీబీజదళముల యొక్కయు బాహ్య నిర్మాణమును గురించి తెలిసికొంటిమి. ఇక వాని యాంతరనిర్మాణము (Internal structure) ను గురించి కొంత తెలిసి కొనవలెను. ఆంతర నిర్మాణ మనుపద మున కర్థము గూడ ముందు తేటపడగలదు.

మనమే యుద్భిజమునుండిగాని మిగుల పల్చని ముక్క (Thin section) కోసి సూక్ష్మ దర్శనిచే బరీక్షించిన యెడల చాని శరీరము 'కణములు' (Cells) అనబడు నలుసులవంటి అతి సూక్ష్మద్రవ్యములచే నిర్మింపబడినట్లు దెలియును. మిగుల తక్కువతరగతి యుద్భిజములగు సూక్ష్మదండికలు మొదలగు వాని శరీరములు రమారమి $\frac{1}{4000}$ అంగుళము మాత్రమే పొడవు గల యొక్కొక్కకణముమాత్రమే యయియుండును. హెచ్చు తరగతులకు బోవు కొలదిని కణములసంఖ్య వృద్ధి బొందుటయే గాక వానియం దనేకభేదములు గూడ కాననగును. కణములు బ్రత్యేకముగ గంటికి గానరానంత చిన్నవిగ నుండుటచే నొక మర్రిచెట్టునం దెన్నికణములుండునో యూహింపుడు !

మనమేదేని మొక్కయొక్క లేభాగమునందలి కణములను సూక్ష్మ దర్శనిచే బరీక్షించినయెడల ప్రతి కణమునందును రెండు ముఖ్యభాగములను గనుగొందుము. అందు వర్ణరహిత మును స్వచ్ఛమునై యుడికిన సగ్గబియ్యపు గింజవలె నుండు లోపలిభాగ మొకటి. దీనికి 'మూలపదార్థము' (Protoplasm) అనిపేరు. దీని నావరించియుండు పొర రెండవభాగము. దీనికి కణకవచము (Cell wall) అనిపేరు.

మూలపదార్థము మాంసకృత్తుల (Proteids) చే నేర్ప

10-వ పటము.



డిన పదార్థముని రసాయనశాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి. కణకవచము సెల్యూలూసు (Cellulose) అను నొక విధమగు కర్బనోజ్జనితము (Carbohydrate) చే నేర్పడినది.

మూ. ప. మూలపదార్థము.

క. క. కణకవచము.

జీ. జీవస్థానము.

హ. హరితకములు.

మూలపదార్థము జీవత్వమునకు ముఖ్యధారమయిన భాగము. దీని చైతన్యమువలననే యుద్భిజ్జము లందలి జీవవృత్తులు (Vital activities)-

అన్నియు జరుగుచున్నవి. ఎక్కువ దృక్పక్షిగల సూక్ష్మదర్శనిచే కణమునందలి మూలపదార్థమును బాగుగ పరీక్షించిన యెడల దానిమధ్యభాగము తక్కినదానికంటె దట్టముగా నున్నట్లు కనిపించును. ఈభాగమునకు జీవస్థానము (Nucleus) అని పేరు. మూలపదార్థముయొక్క చైతన్యమున కిదియే యాధారము.

ఇవిగాక మూలపదార్థమందంతటను అక్కడక్కడహరితకములు (Plastids) అను మరియొకవిధమగు భాగములుండును. ఆకులు మొదలగు నాకుపచ్చనియంగముల యుపరిభాగములందలి కణములలోని హరితకములలో పత్రహరితము (Chlorophyl) అనుపదార్థముండుటచేత నాయంగముల కా


వర్ణము గలుగుచున్నది. విత్తనములు మొదలగు గొన్ని యంగములలోని కణములందలి మూలపదార్థములో పైని చెప్పినవిగాక మాంసకృత్తు కణములు (Proteid grains) అనబడు భాగములుగూడ గాననగును. కొన్నికొన్నిటిలో చమరుపదార్థములచుక్కలును ఇతరపదార్థములునుగూడ ఉండుటగలదు.

లేభాగము లందలికణము లెప్పుడును మూలపదార్థము తోనిండియుండును. అవి సామాన్యముగ గుండ్రముగా గాని 5, 6 కోణములు గలిగిగాని, యిటుకల యాకారముగలిగి గాని యుండును.

మిగుల తక్కువ తరగతిలోని యేకకణశరీరులగు నుద్భిజ్జములలో నెక్కిక్కకణమే వానియందలి జీవవృత్తులన్నియు జరుపుచుండును. పైతరగతులలోనికి బోయిన కొలదిని కొన్ని కొన్ని కణములొకటిగాజేరి తగినమార్పులనొంది యెక్కిక్కవ్యాపారమును జేయుచుండును. మాననసంఘములో కొందరు కొంద రొక్కిక్కపనిలో ప్రవీణతగలవారై తమతమ పనులను తాము నెరవేర్చుటవలన నితరులకు సహాయముచేయుచు తాము తిరుగ వారిచే ప్రతిఫలముగా సహాయమును బొందుచు నన్ని వృత్తులవారును ఎట్లు సుఖించుచున్నారో అట్లే యుద్భిజ్జముల శరీరములందును కొన్నికొన్ని కణము లొకటిగాజేరి ప్రత్యేకవృత్తులకు దగినట్లు మార్పులనొంది వేరువేరువ్యాపారములను జేయుచున్నవి. ఇదియే శ్రమవిభాగము (Division of labour) అనబడును.

లేభాగములందు కణములు గుండ్రముగ గాని, కోణములుగలిగి గాని యుండి మూలపదార్థముతో నిండియుండునని

పైనివాచకములను ఉద్భిజ్జముల శరీరములం దాయా వ్యాపారములను చేయుటకుగాను ఇట్టికణములు క్రమక్రమముగా పలు తెరగుల పరిణామము నొంది, యొక్కొక్కరీతిని పరిణామము నొందిన కణము లొక్కొక్క గుంపుగా జేరును. ఇట్టిగుంపులకు కణసంహతులు (Tissues) అని పేరు.




II-వ పటము.

1 గుండ్రనికణము. 2 అండాకృతిగలది. 3 గొట్టమువలెనుండునవి. 4 బహుభుజకణములు. 5 బల్లపరుపుకణములు. 6 నక్షత్రాకారమైనకణములు. 7 పొడుగైనకణములు.


కణములందు గలుగు మార్పులలో కణకవచము పెరుగుట మొదటిది. కొన్ని కణములు వానికవచము పెరుగునపుడు ఆకా

రమునందు మార్పునెందక పరిమాణమునందు మాత్రమువృద్ధి
యగును. ఇట్టివి మృదుకణములు(Parenchymatous)అనబడును.
కొన్ని యండాకృతిగను (oval cells) కొన్ని బల్లపరువుగను
Tabular cells) మరికొన్ని పొడవుగను(Prosenchymatous cells)
ఇట్లనేకవిధములుగమారును. 11-వ పటముచూడుడు.

12-వ పటము.



A. కడియములవంటి చారలుగల కణములు. B. మరచుట్లవలె
నన్ను చారలుగల కణములు. C. వలయల్లికవలెనన్ను చారలుగల కణము.
D. గుంటలుగల కణము.



1-4, దారువాహికలు:—2 అను
అంకె కెడురుగానుండు వాహికలో
కడియపుచారలు గలవు. 4 అంకె
కెడుటనున్న వాహికలో మెలిచార
గలదు. కడయపుచారలయొక్క అం
చు లొకదానితో మరియొకటి జేరి
మరచుట్లవలెనుండు నేకచార యేర్ప
డుచున్నది. 1, 3 వాహికలలోని
చార లెవ్వియును చూపబడలేదు.

కణకవచము దళసరెక్కుట రెండవవిధమగుమార్పు. దళసరెక్కుటయందలి భేదములచేతను దళసరెక్కునపుడు మూల పదార్థముహరించి పోవుట చేతను గుండ్రముగగాని యండా కృతిగగాని బహుభుజములుగలిగిగాని యుండుకఠినమగు కణములును (దృఢకణములు Schlerenchyma) కొన్ని పొడవుగ నార పోగులవలె నుండుకణములును (దీర్ఘ దృఢకణములు Schlerenchymatous fibres) ఏర్పడును. కొన్నిటిలో కణకవచమునందు వివిధాకారములు గల చారలును గుంటలును గూడ ఏర్పడును. (12-వ పటము చూడుడు.)


కణకవచము రాసాయనికవికారముల నెందుట మఱియొక విధమగుమార్పు. కణకవచము సెల్యులూను అను కర్బనోజ్జనితముచే నేర్పడునని పైనివాచ్యమైనది. సామాన్యముగా ఆకుల పైభాగము (బహిశ్చర్మము = Epidermis) నందలి కణములు నీరును గాలియు చొరకుండు నొక విధమగు మార్పు నొందును. ఇట్లే చెట్ల యొక్క బెండుమొదలగు భాగములందు కణకవచము మరియొక విధమగు మార్పు నొందును.

మూల పదార్థము మార్పులనొందుట నాలవ విధమగు మార్పు. కణములెడిగిన కొలదిని అందలి మూలపదార్థము

3. అ.] ద్విబీజదళ కాండముయొక్క యాంతరనిర్మాణము. ౨౪

చాలవరకుహరించి కణక వచమును జీవస్థానమును అంటియుండు.

13-వ పటము.



కొంచెముమిరిన వృక్షకణము.

మూ. మూలపదార్థము.

జీ. జీవస్థానము

క. మూలపదార్థపు కిరణములు.

అ. అవకాశము.

నెక పొరమాత్ర ముండును.

(13 - వ పటము చూడుడు.)

ఇట్లు హరించి పోవునపుడు.

గలుగునవకాశము కణరసము

(Cell sap) అనబడు ద్రవపదా

రముతో నిండియుండును.


కణక వచము హరించిపో

వుట మఱియొక విధమగు

మార్పు. కణక వచమంతయు హరించిన యెడల నట్టిచోట్ల

నవకాశము నేర్పడును. చెట్లలోని తొర్ర లిట్లేర్పడినవే.

14-వ పటము.



తొ - తొర్ర.

ఒకదాని చివర నెకటి యంటి

యుండు పొడవగు కణముల యడ్డు

గోడలు మాత్రము హరించినయెడల

గొట్టము లేర్పడును. వీనికివాహికలు

(Vessels) అని పేరు. అడ్డుగోడలు


పూర్తిగా హరింపక వానియందు

చిల్లులు పడినయెడల ' జల్లెడకాలు

వలు' (Sieve tube) అనబడు నాహి

కలు ఏర్పడును.

15-వ పటము.



ద్వీబీజదళ కాండముయొక్క అడ్డుచీరిక. (Cross Section).

బ—బహిశ్చర్మము. బె—బెండు. ప—పట్ట. అం—అంతశ్చర్మము. వా—వాహికాపుంజము. ఇం, త్వ—త్వక్కు. వి—విభాజ్యకణములు. దా—దారువు. కి—వాహికాపుంజముల మధ్యనుండు దవ్వకిరణములు. ద—దవ్వ. రో—బహిశ్చర్మపురోమములు.


ద్వీబీజదళముల కాండముయొక్క అంతరనిర్మాణమును 15-వ పటము నుండి గ్రహించవచ్చును. అది లేతకాండముయొక్క అడ్డు చీరికను సూక్ష్మ దర్శనిలో జూచినపు డగుపడు నాకారమునందు నాలవభాగము.

అందు మధ్యభాగము దవ్వ యనబడును. ఇందలికణములు మృదుకణములు (Parenchymatous cells) దీనిచుట్టును అండాకారముగల వాహికాపుంజములు (Vascular bundles) వరుసగానమర్పబడి యున్నవి. ఈవాహికాపుంజముల మధ్య నున్న సందులకు (దవ్వకిరణములు=Medullary rays) అని పేరు. ఇందలి కణములును మృదుకణములే.

ప్రతివాహికాపుంజమునందును మూడుభాగము లుండును. లోపలిభాగము దారుపు(Wood)అనబడును. ఇందు వివిధములగు చారలును గుంటలునుగల వాహికలు (దారువాహికలు = Wood vessels) ను పొడవగు దృఢకణములు (Schlrenchymatous fibres)ను ఉండును. వెలుపలిభాగమునకు త్వక్కు (Bast) అనిపేరు. ఇందు తృగ్వాహికలు(Sieve tubes) అనబడు కాలువలును జల్లెడకాలువలును కొన్నిమృదుకణములును ఉండును. వీనివెలుపలితట్టిన దీర్ఘదృఢకణములు (దృఢత్వక్కు= Hard bast) గూడ నుండుటకలదు. ఈ రెండుభాగముల మధ్యను మృదుకణములచే నేర్పడినభాగ మొకటిగలదు. ఈకణములు ఎల్లపుడును విభాగమువలన వృద్ధిబొందునవగుటచే 'విభాజ్యకణములు' (Meristematic cells) అనబడును. విభాజ్యకణముల వరుసవాహికాపుంజములలోనేగాక, వానిమధ్యనుండుదవ్వకిరణములగుండగూడ చుట్టును ఎడతెగక వ్యాపించుచు నొకకడియమువలెనుండును. దీనినుండి యెల్లపుడును లోపలివైపున దారుపును వెలుపలివైపున త్వక్కును యేర్పడుటచేత కాండము క్రమక్రమముగా లా వగుచుండును.

వాహికాపుంజములచుట్టును అంతశ్చర్మము (Endodermis) అనబడు మృదుకణములవరుసగలదు. దీనివెలుపలనుండు 4, 5 వరుసల బహుభుజకణములు గలభాగము పట్టయనబడును. దీనివెలుపల నుండు 2, 3 వరుసలకణములకు 'బెండు' అనిపేరు. అన్నిటికంటెను వెలుపలివరుస బహిశ్చర్మము. (Epidermis) దీనియం దక్కడక్కడ రోమము లుండును. ఇవి మూలరోమములవలెగాక బహుకణయుతములు. (Multicellular)

16-వ పటము.




ఏక బీజదళ కాండముయొక్క అడ్డుచీరక (Cross section).

బ—బహిశ్చర్మము. ప—పట్ట. ఆం—అంతశ్చర్మము. ఓ—ఓడ్డాణము. వా—వాహికాపుంజములు.

ఏక బీజదళ కాండములయొక్క నిర్మాణము 16-వ పటమునలన దెలియును. ఇందును, మధ్యభాగము దవ్వ. దీనిచుట్టును వాహికాపుంజములు వరుసగానుండక అక్కడ నెకటియు నక్కడ నెకటియు నుండును. వీనిలో దారువునకును త్వక్కునకును మధ్య విభజ్యకణములు లేవు. కాన ఏక బీజదళ కాండములు క్రమక్రమముగా లావు కానేరవు. మొదట నెంతలావుండునో చివరవర శించుమించుగా నంతే లావుండును. (ఉ. తాటిచెట్టు, కొబ్బరి చెట్టు). వాహికాపుంజములును దవ్వయు జేరియున్న మధ్యభాగమునకు జుట్టును 'ఓడ్డాణము' (Pericycle) అనబడు పొడవగు దృఢకణములపొర గలదు. తాటిచెట్టునందలి 'చేప' యనుభాగమిదియే. దీనివెలుపల ద్విబీజదళములలో వలెనే, పట్ట, బెండు బహిశ్చర్మము అనుభాగము లుండును.

వేరుయొక్క అంతరనిర్మాణమునందు ఏకబీజదళముల కును ద్విబీజదళములకును అంతగా భేదములేదు .

17-వ పటము.



వేరుయొక్క అడ్డుచీరిక (Cross section).

ద—దవ్య. త్వ—త్వగ్వాహికాపుంజము. దారువా—దారువాహికాపుంజము. ఒ—ఒడ్డణము. అం—అంతశ్చర్మము. ప—పట్ట. బ—బహిశ్చర్మము. రో—రోమము.

17-వ పటముక వేరుయొక్క అడ్డుచీక. అందుమధ్యభాగము దవ్వ. దీనిచుట్టును వాహికాపుంజములు గలవు. వీనిలో దారువును త్వక్కును గలసియుండక దారు వాహికాపుంజములు వేరుగను, త్వగ్వాహికాపుంజములు వేరుగను ఉన్నవి. వీనిచుట్టును 'ఒడ్డణము' గలదు. ఇందలికణములు ఏకబీజదళకాండమునందువలె గాక మృదుకణములు. దీనిచుట్టును అంతశ్చర్మమును, పట్టయు, అన్నిటికి పైని బహిశ్చర్మమును గలవు.


ప్రతివేరుయొక్క కొనయందును (మూలరక్షణము) (Root cap) * అనబడు టోపివంటిభాగముండును. ఇందలికణములు మృదుకణములు. దీనిపై ఏకకణ (Unicellular) రోమములుండును. ఇవియే మూలరోమములు, (Root hairs)

ద్విబీజదళములలోకంటె నేకబీజదళములవేళ్లలో నెక్కువ వాహికాపుంజములుండుటయే నారెంటివేళ్లనిర్మాణమునకును గలముఖ్యభేదము. రెంటిలోనుగూడ విభాజ్యకణములు లేవు. కాని ద్విబీజదళములలోమాత్రము కొంతకాలమయిన పిమ్మట నితరభాగముల నుండి విభాజ్యకణములవరుస పుట్టుటవలన త్వక్కును దారువును వృద్ధియయి వేళ్లుగూడ క్రమక్రమముగా లా వగును. ఏకబీజదళములలో నిట్లు లావుగానేరవు.

3. అ.] ఆకుయొక్క సూక్ష్మనిర్మాణము.

ఆకులందలి కాడయొక్క సూక్ష్మనిర్మాణము కొంచె మించు మించుగ శాఖయొక్క నిర్మాణమును పోలియుండును. దీని గుండ నెకటిగాని యంతకుపొచ్చుగాని వాహికాపుంజములు కాండమునుండి పత్రదళములోనికి వ్యాపించియుండును. 18-వ

18-వ పటము.



ఆకుయొక్క అడ్డపుచీరిక.

బ1—ఆకుయొక్క పైతట్టుననుండు బహిష్కర్మము.
పా—హరితకములు. ఇవి ఆకుయొక్క గుంజాలోని ప్రతికణమునందును పెక్కులుండును. ఇవి నల్లనిచుక్కలుగా చూపబడినవి.
గంజ—ఇందు పొడుగుగనుండు మృదుకణము లొండొంటినడుమ స్పందులేవగుండునట్లమరియున్నవి.

గుల్ల—ఇందలి కణములమధ్య శూన్యస్థలము లనేకములుగలవు.

బ. 2—ఇది ఆకుయొక్క క్రిందితట్టుననుండు బహిష్కర్తము.

నూ—నోరు. పె, పె, పెదవులు. పెదవికణములలోతప్ప బహిష్కర్తమునందలి యితరకణములందు హరితకములుండవు.

పటమునుండి సామాన్యపుఆకునందలి పత్రదళముయొక్క నిర్మాణమును గ్రహింపవచ్చును. పైకణములవరుస బహిష్కర్తము. ఇందలికణములు కాండమునందలి బహిష్కర్త కణములనుబోలి యే యుండును. దీనిక్రిందివరుసకు 'గోడ' యనిపేరు. ఇందలి కణములు నిలువుగా నమర్చబడిన యిటుకలవలె గాన బడును. ఆకులకు పసిరికవర్ణము వీనియందలి పత్రహరితము (Chlorophyl) అను రంగుపదార్థమువలననే గలుగుచున్నది. గోడకు క్రిందిభాగమునకు 'గుల్ల' యనిపేరు. ఇందు గుల్లగా నమర్చబడిన మృదుకణములుండును. వీనిమధ్యసందులు కణరసముతో నిండియుండును. అడుగువరుసకుగూడ 'బహిష్కర్తము' అనియేపేరు. దీనిలో నక్కడక్కడ సందులుండును. వీనికి 'నోళ్లు' (Stomata) అనిపేరు. ఈనోళ్లై యాకులు కర్బనద్వ్యవ్వాజనిదమును వాయువునుండి దీసికొనుటకు మార్గములు. నోళ్ల కిరుప్రక్కలనుండు కణములు 'పెదవులు' అనబడును. ఈ కణముల యాకారము మారుచుండుటచేత నవసరమునుబట్టి నోళ్లపరిమాణమును మారుచుండును. గుల్లలోని యవకాశములనుండి ఈనోళ్లకు దారులు గలవు.

గుల్లలో నక్కడక్కడ వాహికాపుంజములుండును. ఆకుల
యందలియినె లివియె. ఇవి కాండమునందలి వాహికాపుంజ
ముల చివరభాగములే యగుటచే వీనినిర్మాణమును వానినిర్మా
ణమునేపాలి యుండును.

హెచ్చుతరగతి యుద్భిజ్జముల యాహారస్వీకరణము; వృద్ధి.

(Nutrition and Growth.)

సేలనుండి యాహారద్రవ్యపూరితము లగుద్రవముల నాక
ర్షించుట వేళ్లయొక్క ముఖ్యవ్యాపారములలో నొకటి యని
యిదివరలో వ్రాయబడెను. ఆకుల ముఖ్యవ్యాపారమును ఆహా
రమును సంపాదించుటయే యని వ్రాయబడెను. కాన నుద్భిజ్జ
ములు తమయాహారమును సంపాదించుకొనుటకు సాధనము
లీరెండు అంగములును అయియున్నవి. ఉద్భిజ్జములువీనివల
ననే ప్లాహారమును సంపాదించుకొని పెరుగుచున్నవో తెలిసి
కొందము.

మన మేయుద్భిజ్జమునయినను సమూలముగదీసి రసా
యనప్రళక్కరణము జేసినయెడల నందు సామాన్యముగా
నీక్రింది మూలద్రవ్యములు గాననగును.

ఉపధాతువులు.

ధాతువులు.

1 కర్బనము (క=C)

1 ఖటికము (ఖ=Ca)

2 అప్లజని (అ=O)

2 లోహము (లో=Fe)

3 ఉడజని (ఉ=H)

3 పొటాసియము (పొ=K)

4 నత్రజని (న=N) 4 సోడియము (సో=Na)

5 గంధకము (గ=S) 5 మగ్నము (మ=Mg)

6 స్ఫురము (స్ఫు=P)

7 హానినము (హ=Cl)

ఇవిగాక కొన్నిటిలో శైలము (శై=Si), అదము (ద=I), మాంగనము (మాం=Mn) గూడ అప్పుడప్పుడు స్వల్పముగా గాన నగును.

పైని పేర్కొనబడిన మూలద్రవ్యములలో కర్బనము ముఖ్యముగా నాకులచేతను కొన్ని సమయములందు కాండము మొదలగు నితర యాకుపచ్చని భాగములచేతను వాయువు నుండి పీల్చబడు కర్బనద్రవ్యముజనిదమునుండి దీసికొనబడును. తక్కిన నన్నియు నేలయందుండి వేళ్లచే పీల్చబడు తేమ నుండియు అందు కరగియుండు లవణములు మొదలగుద్రవ్యములనుండియు దీసికొనబడును. అమ్లజని వాయువునందు విశేషముగా నున్నను అది యుద్భిజ్జముల కాహారముగా నుపయోగపడదు. నేలనుండి తీసికొనబడు జలమునందును, అందు కరగియుండు లవణములు లోనుగాగలవానియందును ఉండు అమ్లజనిమాత్రమే యుద్భిజ్జముల కాహారముగా నుపయోగించును. ఇట్లే వాయువునందలి నత్రజనిని మొక్కలు సామాన్యముగ దీసికొనలేవు. తమకువలయు నత్రజనిని అవి నేలయందలి సత్రితములను లవణములనుండిమాత్రమే దీసికొనగలవు.

నేలయందలి యాహారద్రవ్యములు అందలి తేమలో కరగి యున్నప్పుడుమాత్రమే వారినుద్భిజ్జములవేళ్లు దీసికొనగలుగును. కావున తేమలో కరగని నేలయందలి పదార్థములు ఆహారద్రవ్యములుగా నుపయోగపడవు.

నేలయందలి జలమునకు స్వచ్ఛజలమునకంటె ద్రావణశక్తి హెచ్చుగానుండును. ఏలయన నేలయందలి జలమునందు కొంత కర్బనద్రవ్యముజనిదము కరగియుండుటచే నట్టిజలము కొంచెము అమ్లస్వభావము (Acidity) ను గలిగియుండును. ఇదిగాక సస్యములు పెరుగుచున్న నేలలోని తేమ, యుద్భిజ్జముల వేళ్లపైనుండు రోమములచే విడువబడు నొకవిధమగు నన్తరసముతోగూడ గలిసియుండును. అమ్లములకు జలముకంటె సామాన్యముగా ద్రావణశక్తి హెచ్చుగానుండును. కావున కొంచె మమ్లములతో గలిసియుండు నేలయందలి జలమునకు స్వచ్ఛజలముకంటె ద్రావణశక్తి హెచ్చుగానుండును.

నేలయందలి యాహారద్రవ్యములు ఉద్భిజ్జములచే దీసికొనబడుటకు అవి యందలి తేమలో గరగుటయేగాక అట్లేర్పడు ద్రావణములు తగినంత పలుచగ నుండుటగూడ యావశ్యకము. 1000 పాళ్ల జలమునకు 1 పాలు లవణముల కెక్కువయుంటు మంచిదిగాదు. 5 పాళ్లకెక్కువగా నున్న యెడల సస్యములకు బొత్తిగా పనికిరాదు. కాన నేలయందు ఆహారద్రవ్యములను

తగినంత పలుచని ద్రావణములుగ జేయజాలునంత తేమచేసి యెడల నందు మొక్కలు పెరుగజాలవు.

నీరి ట్లుద్భిజ్జము లాహారద్రవ్యములు దీసికొనుటకు మధ్య వర్తి యగుటయేగాక వానిశరీరములందలి నివిధపదార్థముల నొకచోటినుండి మరియొకచోటికి సంచరింపజేయుటకు గూడ సాధనము. ఉద్భిజ్జములు తమకు వలయు అమ్లజనిని ఉదజనిని నీటినుండియే దీసికొనును. కావున నీరుద్భిజ్జములకు వలయు నాహారద్రవ్యము లన్నిటిలోను మిగుల ముఖ్యమయినది.

నేలనుండి యాహారద్రవ్యపూరిత మగు ద్రవములు వేళ్ల కొనలపైనుండు మూలరోమములచే దీసికొనబడును. ఇట్లు తీసికొనబడిన ద్రవములు వేళ్ల లోని దారువాహికలలో బ్రవేశించి పైకివ్యాపించి కాండములందలి దారువాహికలలో జొచ్చును. అచటనుండి యింకను పైకి వ్యాపించి యాకులగడలి వాహికలలో బ్రవేశించును. అందుండి ఆకులయందలి 'గుల్ల' యను భాగమునందలి కణములలోనికి వ్యాపించును.

ఇట్లు నేలనుండి యాహారద్రవ్యపూరితములగు ద్రవములు వేళ్ల కాండము అను నంగములగుండ యాకులలోనికి వచ్చుచుండగా, నాయాకులయొక్క యుపరితలమునుండి (ముఖ్యముగా నానియడుగు బహిష్కర్తమునందలి 'నోట్ల'గుండ) నీటియావిరి యెడతెగక గాలిలోనికి బోవుచుండును. ఇట్లు పోవుటకు 'ఉపశ్వాసము' (Transpiration) అనిపేరు. ఇట్లు పశ్వాసమువలన

నీరెప్పుడును పైకిపోవుచుండుటచేతనే దీనిస్థల మాక్రమించుటకు గాను నేలనుండి యాహారపూరితద్రవములు పైకెడతెగక లేచుచుండును. ఉపశ్వాసమువలన నిట్లు పైకిలాగబడనియెడల నేలనుండిద్రవములు భూమియొక్క గురుత్వాకర్షణశక్తిని ధిక్కరించి పైకి లేవజాలవు. ఇదిగాక జలాకర్షకయంత్రము (Water Pump) వలె పైకితోడుశక్తి వేరునందలి కణములకుగూడ కలదని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి. ఈశక్తిని 'మూలపీడనము' (Root pressure) అందురు.

ఉపశ్వాసము నేలనుండి ద్రవముల నుద్భిజ్జశరీరములలోనికి తేవనెత్తుటకేగాక, యుద్భిజ్జముల యుష్ణోగ్రతను అందు జరుగువ్యాపారముల కనుకూలముగ నుంచుటకుగూడ సాహాయ్యపడును. ఉద్భిజ్జముల నావరించియుండువాయు వత్సృష్ణముగ నున్నయెడల ఉపశ్వాసము హెచ్చిమరింత నీరావిరియగుటచే వానియుష్ణోగ్రత హెచ్చుకుండును. వేసవికాలమున నుష్ణము హెచ్చినపుడు, చెట్టుటపట్టుటయే మనశరీరముల యుష్ణోగ్రత హెచ్చుకుండుటకు, గారణమని చదువరు తెరిగియేయుందురు.

నేలనుండి దీసికొనబడు ద్రవములరూపకముగ అందలి యాహారద్రవము లాకులలోనికి వచ్చుచుండగా, నాకులు నాయువునుండి తమ యడుగుభాగముననుండు నోళ్లగుండ కర్చనద్యుష్ణజనితమును దీసికొనుచుండును. నోళ్లగుండ నాకులలో బ్రవేశించు కర్చనద్యుష్ణజనితము 'గుల్ల'యను భాగమునందలి

యవకాశములలోని కణరసములో గరగును. ఆకు లిట్లు కర్బన ద్వ్యమ్లజనిదమును బగటివేళలందుమాత్రమే దీసికొనగలుగును.

ఇట్లు తీసికొనబడిన కర్బనద్వ్యమ్లజనిదమును, నేలనుండి దీసికొనబడిన జలమునందలి యుదజనియు నమ్లజనియు గూడి రసాయనసమ్మేళనమునొంది కర్బనోజ్జనితము లేర్పడును. మొదట నేర్పడు కర్బనోజ్జనితములు సాధారణముగా చక్కెరనంటి ద్రావణీయ కర్బనోజ్జనితములు. ఈమార్పులు కలుగునపుడు మిగిలిపోవు కొంత అమ్లజని వాయువులోనికి పదలివేయబడును. ఇట్లు ఆకులు, నేలనుండి దీసికొనబడిన జలము చుడియు, వాయువు నుండి తీసికొనబడిన కర్బనద్వ్యమ్లజనిదమునుండియు అమ్లజని ఉదజని, కర్బనము అనుమూలద్రవ్యములను విడదీసి కర్బనోజ్జనితములుగా జేయుటకు కర్బనసమీకరణము (Carbon Assimilation) అనిపేరు. ఉద్భిజ్జములం దీవ్యాపారము క్రమముగా జరగుటకీక్రింది స్థితిగతు లవసరము:—

1. నీరును కర్బనద్వ్యమ్లజనిదమును తగినంత యుండవలయును.

2. వాని నావరించియుండు వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రత మనుకూలముగ నుండవలెను. వాయు వత్సృష్టముగగాని, యతి తలముగగాని యుండు నెడల నీవ్యాపారము కట్టువడును.

3. వెలుతురు రత్యావశ్యకము. వెలుతురు లేనియెడల ననగా గాత్రవేళల కర్బనసమీకరణము నిలిచిపోవును. ఈవ్యాపారము

మాగిపోవుటయే రాత్రివేళల నాకులు కర్బనద్యవ్యప్తజనిదమును దీసికొనకపోవుటకు గారణము. అమెరికామున్న గుదేశములలో శాస్త్రజ్ఞులు రాత్రివేళలందుగూడ మిగులబ్రకాశమానముగా నుండు విద్యుద్దీపములబెట్టి కర్బనసమీకరణము చేయింబవల్లెడ తెగక జరుగునట్లు చేయుటచే నాలుగుమాసములలో ఫలించు నస్యమును అం దించుమించుగా సగముకాలములోనే పెరిగి ఫలించునట్లు చేయగలుగుచున్నారని తెలియవచ్చుచున్నది.

4. ఆకులందు వాని కాకుపచ్చనివర్ణమును గలిగించు పత్రహరితము అనబడు రంగుపదార్థము తగినంత యుండుట యావశ్యకము. ఆకులందు 'గోడ' యను భాగములోని కణములందలి హరితకములందలి మొడుగానుండును. ఈపదార్థము యొక్క వృద్ధికి తగినంత వెలుతురును వేడిమియు, నేలనుండి తీసికొనబడు నాహారద్రవ్యములలో దగినంత లోహముండుటయు నావశ్యకము.

కర్బన సమీకరణమువలన పుట్టు ద్రావణీయ కర్బనోజ్జనితములలో గొంతభాగము నేలనుండి తీసికొనబడిన నత్రితములలోని నత్రజనితో గలసి 'ఏమిదములు' (Amides) అనబడు ద్రావణీయసేంద్రియపదార్థము లేర్పడును. ఈ యేమిదములలో గొంతభాగము కర్బన సమీకరణము జరుగు నాకులయందే యుపయోగపడును. తక్కినది యాకులనుండి యితరభాగము లన్నిటికిని (ముఖ్యముగా శాఖలయొక్కయు, వేళ్లయొక్కయు

ఎదుగుచున్న స్థలములకు) పోవును. కాండములందును, వేళ్ల
యందునుగల 'త్వక్కుసంహతులే' (Phloem tissue) ఇందుకు
ముఖ్యమార్గములు. అక్కడ నీయేమిదములు నేలనుండి
తీసికొనబడు గంధకీతములు మొదలగు వానిలోని గంధక
ముతో గలియుటచే మాంసకృత్తు (Proteids) లేర్పడును.
పిమ్మట నీమాంసకృత్తులే మూలపదార్థము (Protoplasm) గా
మారును. ఇట్లు కర్బనద్రవ్యమైనదియు, జలము, నత్రితములు,
గంధకీతములు మొదలగు నిందియములగు లఘుపదార్థముల
(Simple inorganic substances) నుండి మూలపదార్థ మేర్పడు
టకు నిర్మాణజీవనవ్యాపారము (Anabolism) అని పేరు. ఇట్లు
మూలపదార్థ మేర్పడుటకు వ్యయమగు కర్బనోజ్జనితములుగాక
తక్కినవి అద్రావణీయములగు 'పిండి' (Starch) అను కర్బనోజ్జ
నితముగామారి ఉద్భిజ్జములయొక్క ఆయాభాగములందు నిలువ
జేయబడును.

పైని వ్రాయబడినట్లేర్పడిన మూలపదార్థమునందు గొంత
భాగము అమృజనితో సంయోగము నొందుటవలన నది మరి
కొంతవరకు విడిపోయి క్రింద వినరింపబడు కొన్నిపదార్థము
లేర్పడును. ఈ వ్యాపారమునకు 'వినాశజీవనవ్యాపారము'
(Katabolism) అని పేరు.

వినాశజీవనవ్యాపారమువలన లేర్పడుపదార్థములలో
సెల్యులూసు (Cellulose) ముఖ్యమయినది. క్రొత్తకణకవచము

3. అ.] పోషకపదార్థములు, ఉత్సర్గములు, విసర్జములు. 75.

లేర్పడుటకును, కణకవచము పలువిధముల వృద్ధిపొందుటచే ననేకరకముల కణము లేర్పడుటకును, సెల్యులూసు అవశ్యకము. సెల్యులూసు ఒకవిధమగు కర్బనోజ్జనితమని యిదివరకే వ్రాయబడినది.

వినాశ జీవనవ్యాపారమువలన పుట్టు తక్కినపదార్థములు మూడుతరగతులు. ఇందు పిండి (Starch) చమురు (oil) మాంస కృత్తుకణములు (Protied grains) మొదలగు ముందు మరల మార్పులనొందుటచే మూలపదార్థ మేర్పడుట కుపయోగించు పదార్థములు మొదటితరగతిలోనివి. వీనికి పోషక పదార్థములు (Plastic substances) అనిపేరు. పిండి యిదివరలో వ్రాయబడినట్లు నిర్మాణజీవన వ్యాపారమువలనగూడ పుట్టుచున్నది. ప్రతహితము (Chlorophyl) పుష్పములందలి రంగులు, సేంద్రియమండనములు (Organic ferments) మొదలగుపదార్థములు రెండవ తరగతిలోనివి. వీనికి 'ఉత్సర్గములు' (Excretions) అనిపేరు. ఇవి మరల మూలపదార్థముగా మారకపోయినను, ఉద్భిజ్జములకు మరి కొన్ని విధములుగా నావశ్యకపదార్థము లయియుండును. ప్రతహితము కర్బనసమీకరణమున కావశ్యకమని యిదివరకే తెలిసికొంటిమి. సేంద్రియమండనములు, పిండి మొదలగు నిలువచేయబడిన అద్రావణీయ పదార్థములను ద్రావణీయములుగ జేయును. ఇట్లే తక్కినవియు వృక్షశరీరమున నాయా పనుల కావశ్యకము. అవసరములేక యుద్భిజ్జశరీరమునుండి శ్రితోశ్రివేయబడు జిగురు, గుగ్గిలము మొదలగు పదార్థములు

మూడవతరగతిలోనివి. వీనికి 'విసర్జములు' (Excretions) అని పేరు.

వినాశజీవన వ్యాపారమునకు వలయు అష్టజనికర్మనద్వ్యష్ట జనిదమువలెగాక, వాయుపునుండి యుద్భిజ్జముల సర్వభాగముల నుండియు దీసికొనబడును. కాని యీవ్యాపారము ఎదుగుచుండు కొమ్మలయొక్కయు వేళ్లయొక్కయు చివరభాగములందుమిగుల చురుకుగా నుండును. నిశ్వాసము (Inhalation) అనదగు నీ వ్యాపారమునకు వెలుతు రననరములేదు. కావున నది రేయింబ వల్ల జరుగగలదు. అయినను పగటివేళ కర్మనద్వ్యష్టజనిదస్వీకరణమును, కర్మనసమీకరణమును మిగుల చురుకుగా జరుగుచుండుటచే నిది కొంచె మించుమించుగా కట్టినడి రాత్రులందు మాత్రమే చురుకుగానుండును.

అష్టజని మూలపదార్థముతో సంయోగము నొంది సెల్యులూసు మొదలగుపదార్థము లేర్పడునపుడు జరుగుమార్పులతో గొంతకర్మనద్వ్యష్టజనిదము జనించి పైకి విడిచివేయబడును. ఈ వ్యాపారమునకు 'ఉచ్ఛ్వాసము' (Exhalation) అని పేరు. చెట్లు రాత్రులందు కర్మనద్వ్యష్టజనిదము నుచ్ఛ్వాసించుటచేతనే అప్పుడు వానిక్రింద పరుండగూడదని యారోగ్యశాస్త్రము చెప్పుచున్నది.

మూలపదార్థము కర్మనము, ఉదజని, అష్టజని, సత్రజని, గంధకము వీని మిశ్రణమనియు, సెల్యులూసు అందు మొదటి

మూడు మూలద్రవ్యముల మిశ్రణమనియు చదువరు లింత వరకు వ్రాసిన దానినుండి గ్రహింపగలరు. రసాయనపృథక్ రణమువలన నుద్భిజ్జములందివిగాక 67, 68 వపుటలలో పేర్కొనబడినపొటాసియము, స్ఫురము మొదలగు మరికొన్ని మూలద్రవ్యములుగూడ జేరియుండునట్లు దెలియును. ఉద్భిజ్జములకు వానివలన నేమిప్రయోజనమో తెలిసికొనవలెను.

ఇనుము మూలపదార్థము యొక్కగాని, కణకవచము. యొక్కగాని సంఘటనము (Composition) నందు జేరకపోయినను, కర్బనసమీకరణమునకు మిగులయావశ్యకమగు పత్రహరితమను రంగుపదార్థముయొక్కవృద్ధి కావశ్యకమని యిదివరలో వ్రాయబడెను. ఇట్లే మూలపదార్థమేర్పడుటకు స్ఫురమును, కర్బనోజ్జనితము లేర్పడుటకు పొటాసియమును, కర్బనోజ్జనితముల నుద్భిజ్జశరీరమునం దొకచోటనుండి మరియొకచోటికి సంచరింపజేయుటకు మగ్నమును, ఖటికమును ఆవశ్యకములని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి. కావున మూలపదార్థముయొక్క సంఘటనమునందుండు మొదటి యయిదుమూలద్రవ్యములే గాక వెనుక పేర్కొనబడిన యయిదుమూలద్రవ్యములు గూడ యుద్భిజ్జములందలి జీవవృత్తులకావశ్యకము. వీనిలో నేదిలోటయినను ఉద్భిజ్జములు పెరుగవు. కావున నాహారద్రవ్యములందలి యీపది మూలద్రవ్యములకును ప్రథానమూలద్రవ్యములు (Essential Elements) అనిపేరు. హరినము, శైలము, సోడియము మొదలగు

మూలద్రవ్యములు జీవవృత్తుల కావశ్యకము లేనివయినను, అవి మై మూలద్రవ్యములుగల రసాయనమిశ్రణములలో నుండి యుద్భిజ్జముల శరీరములలోని కెక్కును. ఒకానొకప్పుడు వీనివలన గూడ కొంత ప్రయోజనము గనబడుచుండును. జొన్న మొదలగు గడ్డిజాతులలో శైలము కాండముయొక్క బహిశ్చర్మకణముల లో జేరి వానికి దృఢతనుగలుగ జేయుచున్నది.

సృష్టియందలి మార్పు లన్నిటికివలెనే ఉద్భిజ్జములందు జరుగువ్యాపారములకుగూడ కొంత “శక్తి” (Energy) అవశ్యకము. ఉద్భిజ్జముల కీశక్తి ముఖ్యముగా సూర్యునివెలుతురునుండి యు, కొంతవరకు సూర్యునియష్టమువలనను గలుగుచున్నది. ఇట్లుగలిగినశక్తిలో చాలభాగము దానిసాయమువలన నేర్పడిన యుద్భిజ్జములందలి వివిధములగు పదార్థములందు గుప్తమై యుండును. కొంత ఉపశ్వాసమునందు కర్చుపడును. మనము భుజించు ఉద్భిజ్జసంబంధపదార్థములందుండు గుప్తశక్తి నుపయోగపరచుకొనుటచేతనే మనము వివిధములగు బనుల జేయ గలుగుచున్నాము.

ఆకులు వాయువునుండి పీల్చుకర్చినద్యవ్యుష్ణజనిదమునుండి యు, వేళ్లు నేలనుండి పీల్చుజలమునుండియు కర్బనోజ్జనితములును, వానితో నత్రజనియొక్క సంయోగమువలన ఏమిదములును, వానితో గంధకసంయోగమున మూలపదార్థమును, మూలపదార్థము మరల నమృజనితో సంయోగమునొంది కొన్ని

మాఝుల నొందుటచే సెల్వులూను లోనుగాగల పదార్థములును పుట్టుటమొదలగు వ్యాపారముల దృష్టిగోచరమగుఫల యుద్భిజ్జములెదుగుట. పైనిచెప్పిన వ్యాపారములవలన కణములెదుగుటయు, క్రొత్తకణములు పుట్టుటయు సంభవించి, క్రొత్త ఆకులు శాఖలు వేళ్లు మొదలగు సంగములు పుట్టుటచేత నుద్భిజ్జము లన్ని దిశలకును విజృంభించును.

కృషీవలు యుద్భిజ్జముల శారీరనిర్మాణమును గురించియు జీవనవ్యాపారములను గురించియు నింతవరకు వ్రాయబడిన యంశములను గ్రహించుటవలన వారి కేమిప్రయోజనమో కొంచెము విచారితము.

ద్విబీజదళవృక్షముల వేళ్లు నేలలోనికి లోతుగాబోవుననియు, ఏకబీజదళములవేళ్లుపైపైనే యుండుననియు మృదువయిన వనియు వెనుక వ్రాయబడెను. దీనినిబట్టి వ్యవసాయి, వరి మొదలగు నేకబీజదళసస్యములకు వానివేళ్లు మృదువుగా నుండుటచే నేలను మృదువుగా నుండునట్లు జేయవలెననియు, అవి పైపైనే యుండుటచే పైనేలయందు తగినంత తేమయుండునట్లు నీరు తరుచుపెట్టవలయుననియు, కందిమొదలగు ద్విబీజదళసస్యములలో వేళ్లు అంత మృదువైనవి కాకపోవుటచేతను, లోతుగా పోవుటచేతను, నేల సంతమృదువుగా జేయనక్కరలేదనియు, పైపైన తేమ అంతగా లేకపోయినను క్రింద తేమ కొంత యున్నయెడల నిట్టిసస్యములు బాగుగ పెరుగుననియు

ఇట్లాయాజాతులస్వభావమునుబట్టి అవి బాగుగ పెరుగుటకు తగినస్థితిగతులెట్టివో యూహింపవచ్చును. ముల్లంగి మొదలగు జాతులలో వేళ్లు దుంపలుగా మారుటచేత నట్టివానికి నేల కొంత లోతువరకు గుల్లగానుండునట్లు జేయవలెనని గ్రహింపగలుగును. ఆయాజాతుల కాండముల స్వభావమును బాగుగ గ్రహించుటచే నెట్టిజాతులనట్లు ద్రొక్కుటచేవృద్ధి జేయవచ్చునో, యెట్టిజాతులకెట్లు ద్రొక్కవలెనో మొదలగునంశములు గ్రహింపనగును. సామాన్యముగా మెత్తగను, తియ్యగను ఉండుచెరకు జొన్న మొదలగు సస్యముల కాండములనే పురుగులు విస్తారముగా కొట్టును. గట్టిగానుండు కాండములుగలవానికి పురుగులంతగాపట్టవు. పట్టినను వేరుజాతివిగానుండును. ఇట్లాయాసస్యముల అంగములస్వభావమును బాగుగ దెలిసికొనినయెడల నెట్టిసస్యములకెట్టిచీడలును తెగుళ్లును పట్టునో యూహింపవచ్చును. ఉద్భిజ్జములెట్లాహారద్రవ్యములను దీసికొని యెదుగునో, యేయేపదార్థములు నేలయందుండుట సస్యములెదుగుట కావశ్యకమో మొదలగు నంశముల దెలిసికొనుటవలన, దుక్కి, యెరువువేయుట మొదలగు పనులవలనసస్యములకువలయు నాహారద్రవ్యములను తగినంతేసియు కృత్రిమలో నేలయందుండునట్లు చేసికొనగలుగును. ఉద్భిజ్జములుసరిగా నెదుగుటకు ఆవశ్యకములగువెలుతురును వేడిమియు సస్యముల అన్ని భాగములకును సరిగా ప్రసరించునట్లు యెట్టిమొక్కల నెంతెంతదూరముగా నాటవలెనో మొదలగు నంశములు గూడ దెలిసికొనగలుగును. ఇంతే! వ్యవసాయదారుడు తాను

సాగుచేయు సస్యజాతుల ప్రత్యేకస్వభావముల నెరిగినయెడల నవి బాగుగ పెరిగి ఫలించుటకు తగినపనుల నన్నిటినిజేసి వాని వలన సాధ్యమైనంత యెక్కువఫలితమును దీసికొనగలుగును. అట్టిజ్ఞానము లేనియెడల 'గ్రుడ్డెద్దు చేనబడ్డట్లు' తన తాత తండ్రులనాటినుండి యలవాటయిన మార్గములవెంటబడి బోవుచు నెంతవండిన నంతటితోనే తృప్తిబొంది యూరకుండవలసి యుండును.

పూపు (THE FLOWER.)

'పూపు' వ్యాపారమునుబట్టి ప్రత్యేకాంగముగ వ్యవహరింపబడుచున్నను నిర్మాణమునుబట్టి యాకుల పరిణామమువలన నేర్పడిన యంగముగా నెంచదగియున్నది. ఏలయన, పుష్పమునందలి రేకులయొక్క సూక్ష్మనిర్మాణము (Microscopic structure) కొంచె మించుమించుగా నాకుల సూక్ష్మనిర్మాణమును బోలియున్నది. ఆకుపచ్చ గులాబీ సంపంగి మొదలగు కొన్నిజాతులలో పూవులందలి కొన్నిభాగము లాకులవలె నాకుపచ్చగ నుండి కొంతవరకు వాని వ్యాపారమునుగూడ చేయుచున్నవి. కావుననే పుష్పములందలి రేకులకు పుష్పప్రతములని పేరు గలిగెను.

పూపు సంతానవృద్ధికయి ప్రత్యేకముగా నేర్పడిన యంగము. కొన్నికొన్నిజాతులలో కాండమును వేరునుగూడ

నిందుకు సాధనము లగుచున్నను పుష్పములవలని సంతానవృద్ధి యే సామాన్యమైనది.


ప్రతిపూవునందును సాధారణముగా రక్షకపత్రములు (Sepals) ఆకర్షణపత్రములు (Petals), కింజల్కములు లేక పురుషపత్రములు (Stamens), పుష్పగర్భములు లేక స్త్రీపత్రములు, (Carpels) అను నాలుగుభాగము లుండును. *

పువ్వున కడుగుననుండు (సాధారణముగా) నాకుపచ్చని వర్ణముగల పత్రములు రక్షకపత్రము లనబడును (19-వ పటము చూడుడు). పుష్పముయొక్క లోపలిభాగములను సంరక్షించుట వీని ముఖ్యవ్యాపారము.

మనోహరములగు వివిధవర్ణములతో నెప్పుడు, రక్షకపత్రములకు లోపలిభాగముననుండు పుష్పపత్రములకు ఆకర్షణ పత్రములని పేరు. తమమనోహరవర్ణములచేతను, తమయడుగు భాగములందు గూడియుండు మకరందముచేతను భ్రంగాదుల నాకర్షించుటచే వీనినామము సార్థకనామ మగుచున్నది.

* సామాన్యముగా నేకబీజదళములలో రక్షకపత్రములకును ఆకర్షణ పత్రములకును బదులుగా పరిపత్రములు (Perianth) అనబడు సౌకేవిధమగు పత్రము లుండును.

19-వ పట్టాము.



పుష్పప్రతములయాకారము జూపుపటము.

పూవుయొక్క నిలువుకోత (VERTICAL SECTION.)

५. — ५० ५.

ర. — రక్షకప్రతము.

అ. — అకర్మణ్యతము.

పు. — పురుషపత్రము లేక కింజల్కము ఇందు చెందుభాగములు గలవు. పో-పోగు; పు. అం—పురుషాంగము. ఇందుగల సూక్ష్మవీజములు (పుష్పాడి రేణువులు) నల్లని చుక్కలుగా చూపబడినవి.

స్త్రీ-స్త్రీప్రత్యయ లేక అండాశయము. ఇందు మూడుభాగములు గలవు. (1) పొ-పొట్ట; (2) కొ. కా-కొనకాడ; (3) కొ. ది. కొనదిమ్మ, స్థూ. స్థూలబీజాశయము. కుడివైపుననున్న కొనదిమ్మమీద నొకసూక్ష్మ బీజము జేరియున్నది. అది క్రమముగా పటములో చూపబడిన వల్లనిగోటు దారిని స్థూలబీజాశయమును జేరబోవుచున్నది.

ఆకర్షణపత్రములకు లోపలిభాగమున నమర్పబడి పొడవు గను సన్నముగను ఉండు అంగములు పురుషపత్రములు - ప్రతి పురుష పత్రమునందును సామాన్యముగా 'పోగు' 'పురుషాంగము' అను రెండుభాగము లుండును. దారమువలె పొడవుగా నుండుభాగము 'పోగు' (filament). దీని చివరనుండు జీలకర్ర పాయవంటిభాగము పురుషాంగము (anther). బాగుగ వికసించినపుష్పమునందలి పురుషాంగమునందు పుప్పొడి(Pollen) అనబడు పసుపుపచ్చగా నుండు రేణువులు గాననగును. వీనికి నూత్న బీజములు (Microspores) అనిపేరు.

పై మూడువిధముల పత్రములకును మధ్యనుండుభాగము నకు పుష్పగర్భమని పేరు. సాధారణముగా నెక్కిక్కపువ్వునందు ఒక్కొక్కపుష్పగర్భముమాత్రమే యుండును. నారింజ, జల్లేడు మొదలగు గొన్నిటియందుమాత్ర మొకటికంటె నెక్కుడు పుష్పగర్భము లుండవచ్చును. పుష్పగర్భమునందు మూడుభాగములు గననగును. అడుగున లావుగనుండునది 'పొట్ట' (Ovary) అనబడును. చివర కొంచెము లావుగ నుండుభాగము 'కొనదిమ్మ' (stigma) అనబడును. ఈరెంటికిని మధ్యభాగము 'కొనకాడ' (style) అనబడును. 'పొట్ట' యందు 'స్థూలబీజాశయములు' అనబడు అండాకృతిగల యంగము లుండును. ఇందు స్థూలబీజములను భాగము లుండును.

పుష్పమునందలి పైజెప్పబడిన నాలుగుభాగములలో

కింజల్కములును అండాశయములును, * కాయలును విత్తులును ఏర్పడుటకు ముఖ్యావయవములు. పుష్పము వికసించినపుడు అండాశయమునందలి పురుషాంగములోని పుష్పాడి రేణు వొకటి పుష్పగర్భముయొక్క కొనదిమ్మయందు పడి అందుజొచ్చి కొనకాడగుండ పొట్టలోని స్థూలబీజాశయము జేరి యందలి స్థూలబీజముతో సంయోగము నొందును. ఇట్టి సంయోగముచే నేర్పడిన బీజము సంయుక్తబీజ మనబడును. స్థూలసూక్ష్మబీజములు సంయోగము నొందుటయే పుష్పములు 'గర్భవతులగుట' యనబడును. సంయుక్తబీజము ఏర్పడినది మొదలు మిగుల చురుకుగా నెదిగి విత్తనములందలి పిండముగా మారును. స్థూలబీజాశయమే పిండమును గప్పియుండు బీజ కవచములు (Testa) గా మారుటవలన 'విత్తు' ఏర్పడును. పుష్పగర్భమే యెదిగి గింజల నావరించియుండు ఫలకవచము (Pericarp) గా మారుటవలన కాయయగును. గర్భవతిగానిచో పుష్పగర్భముగాని అందలి స్థూలబీజముగాని యిట్లు వృద్ధిజెందక ఎండిపోవును.

ఆకర్షణపత్రములును, కింజల్కములును స్థూలసూక్ష్మబీజముల సంయోగానంతరము వాడిపోవును. రక్షకపత్రములు మాత్రము సామాన్యముగా చివరవరకునుండి యెదుగుచున్న కాయను సంరక్షించుచుండును. దానిమ్మ జేమ మొదలగు జాతు

లలో రక్షకపత్రము లన్నియుజేరి కాయయొక్క పైబెరడుగా నేర్పడి లోపలిభాగములను సంరక్షించుచున్నవి.

భృంగాదుల నాకర్షించుటచే నాకర్షణపత్రములు సార్థక నామముగలవి యగుచున్ననని పైని వ్రాయబడెను. మధుర మకరందముతోను, మనోహరవర్ణములతోను, భృంగాదులకు విందుగొలుపుటవలన పుష్పమున కేమైన ప్రయోజనము గలదా? లేక పుష్పములు కేవలపరోపకారబుద్ధితో నిట్టివిని జేయుచున్నవా?

పుష్పమునందు రక్షకపత్రములు, ఆకర్షణపత్రములు, పురుషపత్రములు, స్త్రీపత్రములు అని నాలుగుభాగము లుండునని యిదివరలో వ్రాయబడెను. కాని, కాకర, గుమ్మడి మొదలగు కొన్నిజాతులలో రక్షక ఆకర్షణపురుషపత్రములుమాత్రముండి స్త్రీపత్రములు లోపించును. ఇట్టివానిని పురుషపుష్పములు (Male Flowers) అనవచ్చును. కొన్నిటిలోపురుషపత్రములు లోపించి తక్కినమూడును ఉండును. ఇట్టివానిని స్త్రీపుష్పము (Female Flowers) అనవచ్చును. కాకర గుమ్మడి మొదలగు జాతులలో స్త్రీపుష్పములును, పురుషపుష్పములును ఒకేపాదన పూయును. తాడి బొప్పాయి మొదలగు జాతులలో నివివేరువేరు వృక్షములపైనుండును. ఇట్లు పురుషపత్రములును స్త్రీ పత్రములును వేరువేరు పుష్పములందుగాని, వేరువేరు వృక్షములందుగాని యుండునపుడు పుష్పములు గర్భవతులగుటకు పురుష

పత్రములనుండి పుప్పొడిరేణువులు, స్త్రీపత్రములందలి కొన
దిమ్మలమీది కెవ్వరిచేతనయిన గొనిపోబడవలెనుగదా !
భృంగాదులే యీపనిని జేయుభటులు.

ఏకపుష్పమునందే స్త్రీ పురుషపత్రములు రెండును ఉన్న
పుటికిని సామాన్యముగా నెప్పుడును, వానియందలి స్థూల
నూత్నబీజములు సంయోగము నొందవు. పొందినను, ఒకే
పుష్పమునందును, ఒకేవృక్షమునందును పుట్టుటవలన నన్న
చెల్లెండవంటి వగుటచే మానవులలో వలెనే ఇట్టివానిసంయో
గమువలన బుట్టు సంతానము బలహీనముగ నుండును. కాన,
సామాన్యముగా నెకే పుష్పమునం దుద్భవించు స్థూల నూత్న
బీజములుసంయోగము నొందకుండుటకు తగిన యేర్పాట్లన్ని
యో ఆయాజాతుల పుష్పముల నిర్మాణమునందే గలవు.
కొన్నిటిలో స్త్రీపురుషపత్రములు రెండును నెకేసారిగా
వికసింపవు. అట్లు వికసించినను పురుషపత్రములు స్త్రీపత్ర
ములకంటె క్రిందుగానుండుటచే నందలి పుప్పొడి పైనున్న
కొనదిమ్మమీది కెగురలేకుండును. ఇట్టి యేర్పాట్లొకను
అనేకములు గలవు. కాని వానినిగురించి యిచట వ్రాయ నవ
కాశములేదు.

పుప్పొడి సౌకపుష్పమునుండి మరియొకపుష్పమునకు గొని
పోవుటకు, మనోహరములగు వర్ణములుగలజాతులలోను, ఆకర్ష
ణపత్రముల మొదట మకరందము గలజాతులలోను సామాన్య
ముగా తుమ్మెదలు, తేనెటీగలు, శీతాకోకచిలుకలు, చీమలు మొద

లగుకీటకములు సాహాయ్యపడును. ఇవి మకరందమును గ్రోల వచ్చినపుడు ఒకపుష్పమునందలి పుష్పాడి వానిశరీరములకు (ముఖ్యముగా రెక్కలకు) అంటుకొని, అవి మరియొక పుష్పము నందు వ్రాలినపుడు, అందలి కొనదిమ్మకు అంటును.

వరి, జొన్న మొదలగు తృణజాతులందును, కొబ్బరి తాటి మొదలగు వృక్షములందును, పుష్పములు మిగుల సూక్ష్మములు గను, సౌందర్యహీనములుగను ఉండుటచే నవిభృంగాదుల నాకర్షింపలేవు. ఇట్టివానిలోనవి చేయుపని గాలియే జేయుచున్నది. నీటియందు పెరుగు నుద్భిజ్జ జాతులలో నీరే యిట్టిదూత.

సంయోగమునొందు స్థూలసూక్ష్మబీజములు వేరువేరు పుష్పములలోనివై యుండుట సంతానబలమునకావశ్యకమనిపైని వ్రాయబడెను. ఇదిగాక సంతానముబలముగానుండుట కవిపుష్టి గలవిగను తెగులు లేనివిగను ఉండవలెను. వానియందు ఏవైన సుగుణములున్న యెడల సంతానమునందును ఆసుగుణములుండు ను. వానియందు ఏవైన దుర్గుణములున్న యెడల సంతానము నందును ఆదుర్గుణములుండును.

రెండుగోధుమ మొక్కలు దాహరణముగా దీసికొందము. అందొకటి తెగులుపట్టని జాతియై, యితరవిషయములలో సామాన్యమయిన దనుకొండు. రెండవదానిగింజలు పిండికి మిగుల ప్రశస్తమయినవయి, యితరవిషయములలో సామాన్యమైన దనుకొండు. ఈరెండురకముల మొక్కలపూవులయందలి స్థూలసూక్ష్మబీజములును, సంయోగము నొందునట్లు జేసి యందువలన పుట్టుగింజలను జాగ్రత్తచేసి, మరుసటిసంవత్స

3. అ.] విలోమగర్భత్వాదనము, విజాతీయగర్భత్వాదనము. 89

రము చల్లినయెడల మొలచుమొక్క లంతగా తెగులుపట్టనివిగా నుండి పిండికి సామాన్యజాతులకంటె ప్రశస్తమగు గింజలనిచ్చును. ఈమొక్కలలో బలముగలవియు తెగులుపట్టనివియు వెదకి, వానినుండి పండిన స్ఫుటమయిన గింజల నేరి మరుసటిసంవత్సరము సాగుచేసి మరల నిట్లే మంచిగింజలేరి ఆమరుసటిసంవత్సరము మరల వానిని సాగుచేసి ఇట్లు మరలమరల మంచివాని నేరి సాగుచేయుచు వచ్చినయెడల కొన్ని సంవత్సరముల కంతగా తెగులుపట్టనిదియు, పిండికి ప్రశస్తమగునదియు క్రొత్తగోధుమ జాతి యొకటి యేర్పడును.

ఇట్లొకజాతి (species) లోని వేయగు నెకరకమునందలి పుష్పా డిత్తో మరియొకరకమునందలి పుష్పములను గర్భవతుల జేయుటకు ' విలోమగర్భత్వాదనము' (Cross fertilisation) అని పేరు. వేరువేరుజాతులలో నీవ్యాపారము జరిపినయెడల నది విజాతీయగర్భత్వాదనము (Hybridisation) అనబడును. ఈరెండు ఉపాయములచేతనే అమెరికా మున్నగు నాగరికదేశములలో ధాన్యాదులలోను, ప్రత్తి మొదలగువానిలోను, ఫలజాతులలోను, మంచిమంచి క్రొత్తరకములను పుట్టించియున్నారు.

కాయ (THE FRUIT.)

స్థూలనూత్నబీజముల సంయోగబలిమిచే మార్పుల నొందిన పుష్పగర్భముయొక్క పరిణామరూపమే కాయయని యిదివరలో వ్రాయబడెను. కొన్నిటిలో పుష్పగర్భమునందే

గాక దాని చుట్టుపట్లనుండు ఇతరభాగములందుగూడ మార్పులు గలుగుచున్నవి. పుష్పగర్భములందును యితరభాగములందును గలుగు మార్పులందలి తారతమ్యములనుబట్టి కాయలందు అనేక భేదములు గలుగుచున్నవి.

కాయలు 'గుంజుకాయలు' (రసయుతఫలములు = succulent fruits) అనియు ఎండుకాయలు (శుష్కఫలములు = dry Fruits) అనియు ద్వివిధము. రసయుతఫలములు మరల శిలాఫలములు (ఔంకకాయలు = Drupes) మృదుఫలములు (కండకాయలు = Berries) అని ద్వివిధము. లోపల ఔంకవంటి గట్టిభాగముగలిగి, పైని మెత్తని పొరగలిగియుండు మామిడి కొబ్బరి మొదలగుఫలములు శిలాఫలములు. ద్రాక్ష అరటి మొదలగు ఫలకవచము మెత్తగానుండునవి మృదుఫలములు. శుష్కఫలములు మరల విదారణఫలములు (పగులుకాయలు = Dehiscent fruits) అవిదారణఫలములు (పగులనికాయలు = Indehiscent fruits) అని ద్వివిధము. విదారణఫలములలో ననేక భేదములు గలవు. అందు ఏకవిదారణఫలములు, ద్వివిదారణఫలములు బహువిదారణఫలములు అనునవి ముఖ్యములు. జిల్లేడు మొదలగు వానిలోవలె నొకవైపుననే పగులుకాయలు ఏకవిదారణఫలములు. చిక్కుడు, కంది, పెసర మొదలగువానివలె రెండువైపులను పగులుకాయలు ద్వివిదారణఫలములు. బెండ, పత్తి మొదలగువానిలోవలె ననేక యరలుగ పగులునవి బహువిదారణఫల


3. అ] సామాన్యఫలములు, సోదరఫలములు, మిశ్రమఫలములు. 9k
ములు. చింతకాయ మొదలగు యెండినను పగులనికాయలు అవి,
దారణఫలములు.

మనము వడ్లగింజ యనునది నిజముగ కాయ. గింజకాయ..
ఊక, చిట్టు అగుభాగము ఫలకవచము. దానిలోపలనుండుభాగ
ము నిజమయినగింజ. ఇట్లే మొక్కజొన్న, జొన్న మొదలగు
గింజలుగూడ ఫలములేగానిగింజలుగావు. ఎంతయెండినను పగు
లవు గావున నివియవిదారణఫలము లనిపించుకొనును.

కొన్ని పుష్పములయందు అండాశయము ఒక్కటేయుండును.
అట్టిపుష్పములనుండి ఒక్కటియే కాయపుట్టును. ఉ. చిక్కుడు,
పెసర మొ. ఇట్టివానికి సామాన్యఫలములు అనిపేరు. మరికొన్ని
పుష్పములలోనొక్కొకపూవునందు అనేక అండాశయములుండి
ఒక్కొక అండాశయమునుండి యొక్కొక కాయపుట్టిఆకాయలన్ని
యు వేరు వేరుగనుండియును ఒకగుత్తిలో వ్రేలాడుచుండును. ఉ.
సంపంగి. వీనికి సోదరఫలములనిపేరు. మరికొన్ని పుష్పములలో
అనేక అండాశయములుండి అవి యన్నియు అంటుకొనిపోయి
ఒక్కటేకాయగా నేర్పడును. ఉ. నారింజ. ఇట్టికాయలకు మిశ్రమ
ఫలములనిపేరు. కాని సామాన్యఫలములు సోదరఫలములు
మిశ్రమఫలములు అను నీమూడువిధములైన ఫలములునుగూడ
నిజమైనకాయలే; అనగా నవి అండాశయములనుండి మాత్రము
పుట్టినవే.

ఇట్లు గాక అండాశయములోపాటు పుష్పమునందలి
ఇతరభాగములుకూడ నృద్ధిపొందుటవలన నేర్పడినకాయలకు

దొంగకాయలనిపేరు. ఉ. జీడిమామిడికాయయొక్క తొడిమ గుంజ గలదై కాయయొక్క భాగముగా నేర్పడుచున్నవి. అందు నిజమయినకాయ జీడిగింజ యనబడు భాగము. కాయ యొక్క ముఖ్యభాగములన్నియు నం దిమిడియున్నవి. 'కొన్ని వృక్షములలో అనేకపూవులు గుత్తులుగా జేరి యొక్కొక



20-వ పటము.

గుత్తితో సంబంధించియుండు తొడిమలు మొదలగువానితో మిశ్రమై యొక్కొకకాయ యగుచున్నది. ఉ. అనాస, పనస, మర్రి మొదలగుకాయలు. పనసకాయలో ఒక్కొకతొన ఒక్కొక ఆడపువ్వు.


3. అ.] ఫలములందలి నిర్మాణభేదము లుద్దేశ్యపూర్వకములు. 93:

ఏ చెట్టునపుట్టుకాయ లా చెట్టుక్రిందనే పడుచు వాని నెవరును కడుపనియెడల వానిలోనివిత్తు లక్కడనే రాలి మొలచిన మొక్కలన్నియు నచటనే క్రిక్కిరిసి యుండవలసి నచ్చును.. ఇట్లయినచో సూర్యరశ్మియు నాహారమును అన్నిటికిని చాలక యవిక్షీణించును. పూవుయొక్కయు దానినుండి పుట్టు కాయల యొక్కయు ముఖ్యోద్దేశ్యమయిన జాతీయవృద్ధి కే భంగము గలుగును. ఇట్లుగాకుండ, విత్తనములు తగిన ప్రదేశములకు దూర దూరముగా పంపబడుటకు గల్పింపబడినవే ఫలములందలి వివిధ భేదములు. పక్షులుగాని యితరజంతువులుగాని తినదగిన భాగము లున్న కాయలను అవి తినుటకు చెట్టునుండి కొనిపోయి వాని యందలివిత్తులను లక్కడక్కడ వదలివేయును. కొన్ని కాయలు జంతువులయొక్క శరీరముల కంటుకొని వాని కెరుకలేకయే దూరముగా గొనిపోబడును. (ఉ అంట్రెంతలు.) కొన్ని వానిలోని గింజలు దూరముగా పడునట్లు తటాలునపగులును. కొన్ని నీటిలో బడి కొట్టుకొనిపోవును. ఉ. కొబ్బెరకాయ. ఇట్లు ఫలముల వివిధ నిర్మాణభేదములన్నియు; ఉద్దేశ్యపూర్వకములు.

విత్తు లేక గింజ (THE SEED.)

విత్తు స్త్రీప్రతముయొక్క పొట్టలోని స్థూలబీజశయము. యొక్క పరిణామరూపమని యిదివరలో వ్రాయబడెను. ఫలములవలెనే విత్తులును అనేక భేదములు గలిగియున్నవి.

ఏక బీజదళోద్భిజ్జములవిత్తులు వానిపేరు సూచించునట్లు ఒక బీజదళమునే గలిగియుండును. వడ్లగింజలో పైయూక ఫలకవచ మని వెనుక వ్రాయబడెను. లోపలనుండు నిజమైనగింజపైనుండు దంపినపుడు 'తవుడు' అగు కొంచెమెర్రనిభాగము బీజకవచము (testa). మరముతినుబియ్యపుగింజ బీజదళము (cotyledon) దీనికొనయందు అంటియుండు చిన్నకొక్కెమువంటి భాగము 'బీజాంకురము'. ఇదియు బీజదళమునుగలసి పిండము (Embryo) అనబడును.



21-వ పటము.

1. వడ్లగింజ. 2 బియ్యపుగింజ. ఇందు. బీ. ద—బీజదళము; బీ. అం—బీజాంకురము. (వీనియకారము నిజాకారముకంటె సుమారు 4 రెట్లుగా చూపబడినది)

3 చిక్కుడుగింజ. 4 పప్పుబద్దలునిడదీసిన చిక్కుడుగింజ, ఇందు. బీ. ద—బీజదళము. బీ. అం—బీజాంకురము.

ద్విబీజదళములలో రెండుబీజదళములుండును. ఒకయనప
 గింజనుగాని చిక్కుడుగింజనుగాని తీసికొని పరీక్షింతము. అందు
 పైపొర బీజకవచము. దానిలోపలనుండుభాగము 'పిండము'
 అనబడును. ఇందలి పప్పుబద్దలు బీజదళములు. వీనిమధ్య
 మొక్కవలెనుండుభాగమే బీజాంకురము. ఆముదపుగింజమొద
 లగు కొన్నిటిలో బీజకవచమునకును బీజదళములకును మధ్య
 'బీజపోషకము (Endosperm) అను మరియొక పొరయుండును.
 కొబ్బరికాయలోని కొబ్బరియు, ఈతగింజలోని కఠినమయిన
 భాగమును యిట్టివే.

. విత్తులు తల్లివృక్షములనుండి దూరముగా కొనిపోబడు
 టకు తగిన యేర్పాట్లు ఫలమునందేకాక గింజలయొక్క నిర్మా
 ణమునందుగూడ ననేకములుగలవు. కొన్ని జంతువుల శరీరముల
 కంటుకొనును. కొన్ని టికిదూదిపింజెవంటి రోమములుండుటచే
 నవిగాలిలోనెగిరి దూరముగాపోవును. ఉ.ప్రత్తి. జిల్లేడు. కొన్ని
 నీళ్లలో తేలునట్లు నిర్మింపబడియుండును. ఇట్లే మిగులవిచిత్రము
 లగు నేర్పాట్లన్నియోగలవు.

బీజాంకురమునందు ప్రథమమూలము, ప్రథమశాఖాంకు
 రము అని రెండుభాగములుండును. విత్తుమొలచునపుడు ప్రథమ
 మూలము క్రిందికిదిగి వేరుగా పరిణమించును. ప్రథమశాఖాం
 కురముపైకి పెగల్చుకొనివచ్చి యాకులుగను కాండముగను
 పరిణమించును.

సామాన్యముగా సేవృక్షముయొక్క విత్తులనుండి మొలచి పెరిగిన వృక్షములు ఆవృక్షముయొక్క గుణములనే గలిగి యుండును. గాని యొక్కొకప్పుడు ఏకాకణమువలననో బిడ్డయందు తల్లియొక్క గుణములకంటె భిన్నగుణములు పుట్టుచుండును. మన మొక మంచిజాతిమామిడి టెంకల ననేకము పాతి తోట పెంచినయెడల నందలి వృక్షములన్నియు తల్లివృక్షమిచ్చునట్టి ఫలముల నీయక వేరువేరుగుణములుగలవాని నిచ్చును. కావుననే మామిడితోటలను పెంచువారు సామాన్యముగా అంట్లను పాతుచున్నారు. అంట్లలో మొక్కయెట్టిదయినను దానిఫలము సామాన్యముగ దానికి కట్టబడినకొమ్మ యేచెట్టుదో దానిఫలమువలె నుండును.

ఇట్లే మన మితరదేశములనుండి సన్నని వడ్లజాతులను దెచ్చి ఇచట పైరుచేయుచువచ్చినయెడల క్రమక్రమముగా ముదుగగుచున్నవి.

మనము కొన్నికొన్ని సస్యములను పరీక్షించినయెడల నందు అక్కడక్కడ సామాన్యపు మొక్కలకంటె భేదముగా నుండు మొక్కలగుపడును. వీనిని 'కేఫీలు' (Sports) అందురు. ఇవియన్నియు విత్తనములో మారురకములు కలియుటవలన బయలుదేరినవి గావు. ప్రధానమయిన రకమునుండియే యేకాకణమునుండియో భిన్నధర్మములు గల మొక్కలు కొన్ని పుట్టి యుండును. 'కేఫీలు' అనుమాట యిందు ఇట్టి మొక్కల కుపయోగింపబడుచుండును. కేఫీలు సామాన్యముగా పనికిమాలి

నవిగా నెంచబడుచున్నను అప్పుడప్పుడు వానిలో ప్రధాన రకముకంటె శ్రేష్ఠగుణములు గలవి యుండవచ్చును. అట్టి వానిని వేరుగా సాగుచేసినయెడల ప్రయోజనకరముగు క్రొత్తరకములు లభించును. ఐరోపా అమెరికా మున్నగు దేశములలోని సస్యములలో గొన్నికొన్ని రకము లిట్లు లభించినవే.

ఆయాజాతుల పుష్పములయొక్కయు, ఫలములయొక్కయు, విత్తులయొక్కయు స్వభావములను గ్రహించుటవలన కృషి వలుడు వాని సుగుణదుర్గుణములను కనిపెట్టి విలోమగర్భోత్పాదనము (Cross-fertilisation) విజాతీయగర్భోత్పాదనము (hybridisation) అంటుకట్టుట, కేళీలలో మంచివానినేరి వృద్ధి చేయుట మొదలగు నుపాయములచేత మంచిమంచి క్రొత్తజాతులను పుట్టించుటకును, అంతవరకున్న జాతులను క్షీణింప కుండగ జేయుటకును సమర్థుడగును.

ఉద్భిజ్జముల వర్గీకరణము.

(Classification of Plants)

ఈయధ్యాయముమొదట సుద్భిజ్జములు నాలుగుతరగతు లనియు, అందు హెచ్చుతరగతి యుద్భిజ్జములు నగ్న బీజములు,

కోశస్థబీజములు అని ద్వివిధమనియు, కోశస్థబీజములు మరల ఏకబీజదళములు ద్విబీజదళములు అని ద్వివిధమనియు వ్రాయబడెను. ఏకబీజదళములును ద్విబీజదళములునుగూడ వాని పుష్పములందలి నిర్మాణభేదములనుబట్టి యనేకములగు ' అను లోమములు ' (Natural orders) గ విభాగింపబడుచున్నవి. ప్రతి యనులోమమును కొన్ని ' గణము ' (Genus) ల సముదాయమయి యున్నది. ప్రతిగణమును కొన్ని జాతులు (Species) గావిభజింపబడుచున్నది. జాతులందు ఉపజాతులు (Varieties) గూడ నుండవచ్చును. ఉద్భిజ్జములలోని కొన్ని ముఖ్యజాతులు ఈక్రింద అనులోమములుగ విభజించి వ్రాయబడును.

ఐరోపీయభాషలందును, మరికొన్ని యితరదేశభాషలందును, శాస్త్రీయగ్రంథములందుద్భిజ్జముల యొక్క ' లాటిన్ ' (Latin) భాషలో శాస్త్రీయనామములే వాడబడుచున్నవి. ఇట్లు వాడుటవలన వేరువేరుభాషలవా రొకరితో నొక రేవిషయమునగాని సంప్రతించుటకు మిగుల వీలుగ నుండును. కావున నిచట నాయాసస్యములయొక్కయు అనులోమములయొక్కయు లాటిన్ శాస్త్రీయనామములుగూడ వ్రాయబడును.

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
A ఏకబీజదళములు.	వరి (కొనామణి,	Oryza Sativa
1. గ్రామినములు (Graminae)	ఆట్రగడార, సంగి మొ. ఉపజాతులు)	
అనగా గడ్డి జాతులు.	Paddy	Triticum Vul gare
కాండము మొక్కజొన్న	పొట్టిగోధుమ	
మొదలగు కొన్ని జాతుల	Soft wheat	„ Spelta
లో దక్కసాధారణముగ	పొడుగుగోధుమ	
గుల్లగా నుండును. మొ	Spelt wheat	Zea Mays
క్క మొదటినుండి సామా	మొక్కజొన్న	
న్యముగా ననేకములగు పి	Maize	Andropogon Sorghum
లుకలు(Side-shoots)బయ	జొన్న (పచ్చజొన్న)	
లుదేరును. ఉ. వరిదుబ్బు, చె	తెల్లజొన్న మొ.	Elucine Co- racanà
రుకుదుబ్బు. ఆకులు నిడివి	ఉపజాతులు)	
గానుండును. వాని మొదటి	Great Millet	Pennesetum Typhoidium
భాగము కాండమును జట్టి	చోడి	
యుండు కోశము (Leaf	Ragi	PaspalumSr- obiculatum
sheath)గానేర్పడును.పుష్ప	గంటె	
ములు చిన్నవి. వీనిగుత్తుల	Spiked millet	Setaria Ita- lica
కు వెన్నులు (earheads)	ఆరికె	
అనిపేరు. పుష్పములుగాలి	Kodo millet	
వలననే గర్భవతు లగును.	కొర్ర	
	Italian millet	

అనుభవముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
	బరిగలు లేక వరిగలు Common millet చామలు Little millet చెరుకు Sugarcane వెదురు Bamboo	Panicum Mi- liacium „ Miliare Sacharum offi- cinalis Bambusa Ar- undinacia
2. సామములు (Palmae) కాండము సామాన్యము గా శాఖలు లేనిదిగను, గట్టి దిగను ఉండును. ఆకులుకొ న్నిటిలో కొబ్బరియాకులవ లెను కొన్నిటిలో తాటియా కులవలెను ఉండును. పుష్ప ములుచిన్నవి. కింజల్కము లును పుష్ప గర్భములును వేరు వేరుగా పుష్పములం దుండును. పుష్పములుగాలి వలననే గర్భవతులగును.	కొబ్బరి (గంగాఫ) లము, చెన్నంజి మొ. ఉపజాతులు) Coconut తాటి Palmyra ఈత Wild date ఖర్జూర Arabian date	Cocos Nuci- fera Borassus-Fla- belliformis Phoenix Syl- vestris „ Dactyli- fera

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
<p>3. సిటామినములు (Scitamineae)</p> <p>కాండము సామాన్యముగా నేలలోనుండు దుంపయైయుండును. అరటి స్తంభము డిప్పల (అకులతోడి మెల) కూడికయేగాని నిజమైన కాండము కాదు. పూవులగుత్తులకు “గొల” లని పేరు. విత్తునకు సామాన్యముగా మొలచు శక్తియుండదు. జాతీయవృద్ధికి దుంపలనుండి పుట్టుపిలకలే (Suckers) సాధనము.</p>	<p>అరటి (బొంత, అమృతపాణి, చక్కెర కేళీ మొ. ఉపజాతులు)</p> <p>Plantain and Banana</p> <p>పసుపు</p> <p>Turmeric</p> <p>మామిడల్లము</p> <p>Mango ginger</p> <p>అరోరూటు</p> <p>Arrow root</p> <p>అల్లము</p> <p>Ginger</p>	<p>Musa Sapientum</p> <p>Curuma Longa</p> <p>„ Amada</p> <p>„ Angustifolia</p> <p>Zinziber officinalis</p>
<p>4. లిలియములు (Liliaceae)</p> <p>కాండము నేలలోనుండు గడ్డ (bulb) యొక్క క్రింది భాగము. జాతీయ వృద్ధి గడ్డలును విత్తులుగూడ సాధనములు.</p>	<p>నీరుల్లి</p> <p>Onion</p> <p>వెల్లుల్లి</p> <p>Garlic</p>	<p>Allium Ceba</p> <p>Allium Sativum</p>

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగు పేర్లు, ఇంగ్లీషు పేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు
<p>B. ద్విబీజదళములు.</p> <p>1. లెగ్యుమినములు (Legu- menosae)</p>	<p>కంది } Red gram } సెనగ } Bengal gram } పెసర } Green gram } మినుము } Black gram } ఫ్రెంచిచిక్కుడు } French beans } ఉలవ } Horse gram } అనుములు } Lablab } బొబ్బరి } Cow gram } బటానీ } Peas } సోయా చిక్కుడు } Soy bean } వేరుసెనగ } Ground nut }</p>	<p>Cajanus In- dicus Cicer arietini- num Phaseolus Radiatus „ Radiatus var mungo „ Vulgaris Dholicos Bi- florus „ Lablab Vigna Cati- yang Pisum Sati- vum Glycine Soja Arachis Hy- pogaea</p>

ఈ అనులోమములో
మూడు ఉపలనులోమము
లుగలవు. అందు ముఖ్యము
పాపిలియోనేసే (Papilion-
aceae) అనునది. ఇందు అవి
సిచ్చెట్టు మొదలగు పెద్ద
వృక్షములు మొదలు పెస
ర మొదలగు చిన్న మొ
క్కలవరకుగల జాతు లనే
కములు గలవు. ఇదలి
జాతుల వేళ్లయందు కొ
న్ని సూక్ష్మజీవులు మను
ష్యశరీరములందలి చెమట
కాయలవంటి కాయలు పు
ట్టించును. ఈ కాయలు
సూక్ష్మ దండికలతో నిండి
యుండును. ఈ సూక్ష్మ

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యతగణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
దండికలు వాయువునుండి నత్రజనిని దీసికొనిమొక్క ల వేళ్ల కిచ్చును. ఇట్టిసస్య ములు పెరుగునపుడు నేల యందలి నత్రితములు వ్య యముగాక పోవుటయెగాక కొంతవరకు వృద్ధియగును. కావుననే ఈయనులోమము లోని సస్యజాతులు నేలకు సత్తువ జేయునందురు. పుష్ప ములుకొంచెమించుగాశీత కోక చిలుకలవలెనుండును. సామాన్యముగా కీటకముల చేగర్భవతులు జేయబడును	జనుము Sunn-hemp నీలి Indigo లూనర్ Lucerne గోరుచిక్కడు Cluster bean	Crotolaria juncia Indigofera Tinctoria Medicago Sa- tiva Cyamopsis Psoroloides
2. యూఫోర్బియములు (Euphorbiaceæ) కాండము సామాన్య ముగా పాలుగలిగి (Milky) యుండును. పూవులుచిన్న వి. ఇందొకజాతియగు ఆము దపుచెట్టునందు స్త్రీపురుష	ఆముదము Castor కట్ట పెండలము Cassava పెద్దడిశిరిక చెముడు Milkhedge	RicinusCom- munis Manihot Uti- lissimus Phyllanthus emblica Enphorbia tirucall

అనులోపముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
పత్రములు వేరువేరు పుష్ప ములందుండును.	క్రోటనులు Crotons	Croton—
3. పెడాలినములు(Pedalinae) నువ్వు ఇందుముఖ్యమై న జాతి. ఇందు ఆకులు క్రిందివి పెద్దవిగను, పైవి చిన్నవిగను ఉండును. పూ వులు గంటవలె నుండును.	నువ్వు Gingelly	Sesamum in- dicum
4. కంపోజిటములు(Compo- sitae).	కుసుంబా Safflower	Carthamus Tinctorius
వీనిలో పువ్వులు కొన్ని టిలో స్త్రీ పత్రములును కొన్ని టిలో పురుష పత్రము లును కొన్ని టిలో రెండు ను లేనివిగనుండును. కొ న్ని టిలో రెండును ఉం డును. వీనిలో మనము సాధారణముగా పువ్వు అనునది అనేక పూవుల కదాని ప్రక్కనొకటియమ ర్పబడిన పూలగుత్తి.	వలిసెలు, వెజ్జినూ గులు Niger చేమంతి Crysanthemum బంతి African Marigold సూర్యకాంత లేక ప్రాద్దుతిరుగుడు Sunflower లెట్యూసు Lettuce	Guizotia A- byssinica Crysanthemum Indicum Tagetes erec- ta Helianthu Annus Lactucus Sa- tiva

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేళ్లు, ఇంగ్లీషుపేళ్లు.	జాతుల లాటిన్ పేళ్లు.
5. క్రూసిఫరములు (Cruciferae)	ఆవ Mustard	Brassia Juncia
ఇందు పుష్పములు 4	కాబేజి Cabbage	„ Oleracia
ఆకర్ణాపత్రములను 4 రక్షక పత్రములను గలిగియుండు	ముల్లంగి Radish	Raphanus sativus.
ను. ఇవి X (Cross) వలె నమ ర్పబడియుండుటచే నీయను లోమమున కీపేరుగలిగెను.		
కాయలో రెండరలుండును.		
6. మాల్వేసములు (Malvaceae).	చెట్టుప్రత్తి Tree Cotton	Gossypium Arboreum
పుష్పములు మిగుల రమ్య ముగను పెద్దవిగను ఉండు	పొలముప్రత్తి Field cotton	Gossypium Hebaceum
ను. కింజల్కములు అనేక ములుండును. ఇవియన్ని	అమెరికాప్రత్తి American cotton	Gossypium Barbadense
యు గలసి పుష్పగర్భము	బెండ Ladies' fingers	Abelmoschus Esculentis
చుట్టను గొట్టముగా నేర్ప డును.	గోగు Roselle	Hibiscus sab dariffra
7. సాలనేసములు (Solanaceae)		
ఇందలి జాతులు సామా	పొగాకు Tobacco	Nicotiana Ta bacum

అనుభూమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
న్యముగా చిన్న మొక్కలు (Herbs or shrubs). కొన్ని విషయుతములు ఉ. ఉమ్మె త్త. ఆకరణ వ్రతములన్ని యు గలిసి గరాటీ (fun- nel) వలెగాని గంటవలెగా ని యుండును. అండాశయ ము రెండు కోశములు గలి గియుండును. వీని బూడిద యందు పొటాష్ ఎక్కువ గ నుండును.	ఉరలగడ్డ Potato వంగ Brinjal మిర్చి Chillie సీచువంగ Tomato	Solanum Tuberosum ,, Melnena Capsicum Frutescens Lycopersi- cum Esculen- tum
8. అంబేలిఫరములు (Umbelli- feræ) పుష్పములు. అందమగు గుత్తులుగానుండును. గుత్తి యందు పూవులు అన్నియు నొక చోటనుండియే పుట్టి ఒ కేనుట్టముగా గాని గొడుగు వలెగాని యమర్పబడియుం డును. అండాశయములు రెండును గలిసి యేకముగ నుండును.	ధనియం Coriander జీలకఱ్ఱ Cumin గాజరగడ్డ Carrot సెలరి Celery	Coriandrum sativum Cuminum Ciminum Daucus carota Apium Gra- veolens

అనులోమముయొక్క పేరు, ముఖ్యలక్షణములు.	అందలిముఖ్యజాతుల తెలుగుపేర్లు, ఇంగ్లీషుపేర్లు.	జాతుల లాటిన్ పేర్లు.
<p>9. క్యూకర్బిటములు (Cucurbitaceae)</p> <p>ఇందలి జాతులు సామాన్యముగా తీగలుగా నుండి ప్రాకుట కనుకూలమగు నులితీగలుగలిగియుండును. అండాశయములును కింజల్కములును వేరువేరువుప్పుములందుండును.</p>	<p>గుమ్మడి Pumpkin</p> <p>కాకర Bitter gourd</p> <p>బూడిదగుమ్మడి Ash gourd</p> <p>ఆచగ Bottle gourd</p> <p>పొట్ల Snake gourd</p> <p>బీర Ribbed gourd</p>	<p>Cucurbita Maxima</p> <p>Momordica Charantia var. muricata</p> <p>Benincasa cerifer</p> <p>Lagenaria Vulgaris</p> <p>Tricosanthsn Anguian</p> <p>Luffa Acutua gula</p>
<p>10. అనాకార్డిసములు (Anacardiaceae)</p> <p>ఇందలి జాతులు సామాన్యముగా పెద్ద చెట్లుగా నుండును. రక్షకపత్రములు, అకర్షణపత్రములు, కింజల్కములు 4, 5, ఉండును. పుష్పములు కీటకముచే గర్భవతులు చేయబడును.</p>	<p>మామిడి Mango</p> <p>జీడిమామిడి Cashew not</p>	<p>Mangifera Indica</p> <p>Anacardiumm occidentle</p>

తక్కిన సస్యజాతుల 'లాటిన్' పేర్లును, అనులోమములును వానినిగురించి వేరువేరుగా చర్చించుచోట (రెండవసంపుటము నందు) వ్రాయబడును.

మనుష్యులపేళ్లలో నింటిపేరు, మనిషి పేరు అనురెండుభాగములున్నట్లులే లాటిన్ భాషలో నేయుద్భిజ్జముపేరునం దయినను రెండుభాగములుండును. మొదటిభాగము అది యేగణములోనిదో ఆగణము యొక్కపేరును తెలియజేయును. రెండవది జాతియొక్క ప్రత్యేకస్వభావమును తెలియజేయును. లాటిన్ పేళ్లన్నియు సామాన్యముగా సార్థకములుగా నుండును. కాన వానిపేళ్లను బట్టియే వాని స్వభావమును కొంతవరకు గ్రహింపవచ్చును.

సామాన్యముగా నొకజాతిలోని యుపజాతులొకదానినొకటి మిగుల పోలియుండును. ఒకేగణములోని జాతులన్నిటికిని పోలిక అంతవిశేషముగానుండకపోయినను, సామాన్యలక్షణము లనేకములుండును. వేరువేరుగణములలోని జాతులైనను ఒకే యనులోమములోని వయినయెడల వానికిని గొన్ని సామాన్య లక్షణము లుండును. కావున నేదైన కొత్తసస్యమును సాగుచేయవలసి వచ్చినపుడు అది యేయనులోమములోనిదో, యేగణములోనిదో తెలిసికొనినయెడల దాని నెట్లుసాగు చేయవలెనో కొంతవరకు గ్రహింపవచ్చును.

పసుపును, అరోరూటు (arrow root) ను ఒకే యనులో మములోని వగుటచే అరోరూటు మనమెరుగని సస్యమైనను దానిని కొంచెమించుమించుగా పసుపువలెనే సాగుచేయ వచ్చునని యూహింపవచ్చును. పొగాకు, బంగాళాదుంప, వంగ, మిర్చి మొదలగునవి ఒకే యనులోమములోనివగుటచే ఒకదానికి పొటామ్మెరుపు అనుకూలించినచో తక్కిన వానికిని అనుకూలించునని యూహింపవచ్చును. జొన్న, మొక్కజొన్న మొదలగు తృణధాన్యములును, పెసర, మినుము మొదలగు కాయధాన్యములును తమలో తా మొకదాని నొకటి అనేకవిషయములతో పోలియున్నవని వేరుగజెప్పనక్కరలేదు.



నాల్గవ యధ్యాయము.



శీతోష్ణస్థితి.

(CLIMATE.)

చెట్లుమొండయి తే చేరిక వాన *

మృగశిరకు ముంగిళ్లుచల్లబడును.

కా రీకమాసమున కడపటివానలు.

ఉద్భిజములనావరించియుండు వాయు వతిశీతలముగగాని యత్యుష్ణముగగాని యుండు నెడల వానియందు కర్బనసమీకరణము (Carbon assimilation) క్రమముగా జరుగదని వెనుకటి యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. సాధారణముగా వాయువు యొక్క యుష్ణోగ్రత (Temperature) 30° కంటె + తగ్గినగాని, 50° కంటె హెచ్చినగాని యుద్భిజములందలి జీవవృత్తులు కట్టు

* కాలమానస్థితిని వర్ణమునుగురించిన సా మెతలనేకము తెనుగుభాషలో గలవు. అందుచాలభాగము శాస్త్రసమ్మతములయిన విషయములను (Scientific matters) గుఱించియే బోధించునుగాని కొన్నిటి యాధార్థ్యము నింకను శాస్త్రీయముగా బరిశోధింపవలసియున్నది.

+ 30° అనగా శతవిభాగిఅంశములనియగ్ధము. 50° అనగా 50 శతవిభాగిఅంశములు. 120° అనగా 120 ఘనరెన్ హీట్ అంశములనియగ్ధము.

వడును. కావున నుద్భిజ్జముల వృద్ధికి వాని నావరించియుండు వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రత యనుకూలముగనుండుట యావశ్యకము

వాయువునకు చలనము దానియందలి శీతోష్ణభేదముచేతనే గలుగుచున్నది. గాని యొకప్పుడొకవైపుచుండియు మఱియొకప్పుడు మఱియొకవైపుచుండియు వీచుటకును, ఒకప్పుడు మెల్లగను, మఱియొకప్పుడు చుఱుకుగను, వీచుటకును కారణము. వాయువుయొక్క ఉష్ణోగ్రతాభేదములే. పయరగాలి కాయధాన్యములకును (Pulses) దాళువా (2nd crop) పరిచేలకును మంచిదందురు. తూర్పుగాలిసారువా (1st crop) పరిచేలకు మంచిదందురు. తుపానులవలన సస్యముల కపరిమితనష్టముగలుగుచున్నది. శీతోష్ణభేదములచే వాయువునందు ఉద్భిజ్జముల కనుకూలప్రతికూలములగు ఇట్టి మార్పులుగలుగుచుండుటచే వాయువుయొక్క శీతోష్ణభేదములకును ఉద్భిజ్జములకును ఇది యొక అప్రత్యక్షసంబంధమని చెప్పవచ్చును.

ఉద్భిజ్జముల కత్యావశ్యకమగు వర్షము కొన్ని స్థలములందు విస్తారముగను కొన్నిటియందు తక్కువగను గుఱియుటయు ఒక కాలమునందు విశేషముగను మరియొక కాలమునందు తక్కువగను గుఱియుటయు, మొదలగు భేదములుగూడ వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రతా భేదములవలనను, వానివలన బుట్టు వాయుప్రవాహభేదములవలనను గలుగుచున్నవి. కావున నిది యుద్భి

జ్ఞములకును వాయువుయొక్క శీతోష్ణ భేదములకును గల మరియొక యప్రత్యక్షసంబంధము.

ఇట్లే వాయువునందు ఆర్ద్రతా (Humidity) భేదములును, మంచుకురియుట, వడగండ్లుపడుట మొదలగు వికారములు (Phenomena) ను ఉష్ణోగ్రతా భేదములవలననే గలిగి యుద్భిజ్జములకు గొన్ని సమయములం దనుకూలతయు మరికొన్ని సమయములందు ప్రతికూలతయు గలిగించుచున్నవి. కావుననే చెల్లుచేమలకును, జంతుజాలములకును అనుకూలతా ప్రతికూలతలను గలిగించు వాయుప్రవాహములు, వర్షము, మంచు మొదలగు నన్ని టిస్వభావమును తెలియజేయుటకుగాను 'శీతోష్ణస్థితి' యను మాటయొక్కటియే యుపయోగింప బడుచున్నది.

వ్యవసాయదారుడు తన సస్యములను బాగుగ పెరిగి ఫలింపజేసికొనుటకు వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రతకును, అందలి భేదములవలన గలుగు వాయుప్రవాహములు వర్షము మొదలగు వానికిని, ఉద్భిజ్జములకునుగల సంబంధములను బాగుగ గ్రహించి వానిని సాగుచేయు విధానములను ఆయాస్థితిగతుల కనుకూలముగ కూర్చుకొనవలెను.


వాయువుయొక్క శీతోష్ణ భేదములనుగురించియు, వాని వలనగలుగు మార్పులను గురించియు చర్చించు శాస్త్రము 'అంతరిక్ష శాస్త్రము' (Meteorology) అనబడును. ఇది పదార్థవిజ్ఞాన శాస్త్రమునకొక శాఖ. ఈయధ్యాయమున నిందలి ముఖ్యంశములనుగురించి సంగ్రహముగా వ్రాయబడును.

ఉష్ణోగ్రత (TEMPERATURE)

సూర్యకిరణములు వాయువుగుండ ప్రసరించుచున్నను, అందు తేమ (నీటియావిరి) లేనియెడల వాయువునకు వానినుండి యుష్ణము నాకర్షించుశక్తి లేదు. వాయువునకు వేడిమి చాల వరకు, మొదట సూర్యకిరణములచే నేలయొక్కగాని దానిని గప్పియుండు జలముయొక్కగాని ఉష్ణతలము వేడియొక్కి వానినుండి యుష్ణత పైకి ప్రచరించుట (Radiating) చేత గలుగు చున్నది. కావున వాయువుయొక్క శీతోష్ణభేదములు దాని క్రిందనుండు భూభాగములకును, జలభాగములకును సూర్యుని వల్లన గలుగు నుష్ణతాభేదముల ననుసరించియుండునని గ్రహింప వలయును.

భూమికి సూర్యునియుష్ణత సర్వకాలములందును, సర్వభాగములకును సమముగా ప్రసరింపదు. భూమి కొంచెమించుమించుగ నారింజపండువలె గుండ్రముగ నున్నదనియు, అది తన అక్షము (axis) చుట్టును 24 గంటల కొకసారి తిరుగుచు సంవత్సరమున కొకసారి సూర్యునిచుట్టును ప్రదక్షిణము చేయుచున్నదనియు చదువరులు చిన్ననాడే తెలిసికొనియుందురు. భూమి గుండ్రముగానుండి తనఅక్షముచుట్టును 24 గంటల కొకసారి తిరుగుచుండుటచే సూర్యునికిరణములు ఎప్పుడయినను భూమియొక్క సగముభాగముపైనిమాత్రమే పడునుగాని అంతటనుపడవు. (22.వ పటముచూడుడు.) ఇందువలననే దివా


రాత్రము లేర్పడెను. ఏప్రదేశముగాని పగలు సూర్యకిరణప్రసారము గలిగియుండుటచే రాత్రికంటె నుష్ణముగనుండును. దీనినిబట్టి యాప్రదేశమునందలి వాయువును ఉష్ణోగ్రతాభేదములను బొందును.



22-వ పటము.

సూర్యకిరణములు భూమియొక్క నిరక్షరరేఖ (Equator) సమీపమున నున్న ప్రదేశముపై దూరముగా నుండువాని యందుకంటె నూటిగాపడును. సమానపరిమాణముగల కిరణ సముదాయము నూటిగా ప్రసరించుచోట్ల ఏటవాలుగా పడు చోట్లకంటె కొంచెము స్థలముమీదనే పడుటచే ఎక్కువ యుష్ణ తను గలిగించును. ఇట్లు కొన్నిప్రదేశములు మరికొన్నిటికంటె నెక్కువగా వేడియొక్కుటవలన వానిపై వాయువునందును

ఉష్ణోగ్రతాభేదములు గలుగును. కావుననే సైబీరియామొదలగు నిరక్షరరేఖకు దూరముననున్న ప్రదేశములందలి వాయువు చెన్నపురిరాజధానివలె నిరక్షరరేఖకు సమీపమున నున్న వానియందలి వాయువుకంటె శీతలముగ నుండును.



23-వ పటము.


- 1 ఉత్తరశీతలమండలము (N. Frigid Zone).
- 2 ఉత్తరసమశీతోష్ణమండలము (N. Temperate Zone).
- 3 ఉష్ణమండలము (Torrid Zone).
- 4 దక్షిణసమశీతోష్ణమండలము (S. Temperate Zone).
- 5 దక్షిణశీతలమండలము (S. Frigid Zone).

ఉ.—ఉత్తరధృవము. ద.—దక్షిణధృవము. ని. రే. నిరక్షరరేఖ.

ఈభేదములనుబట్టి భూతలము 5 మండలములుగ విభాగింపబడుచున్నది.

నిరక్షుర రేఖకు ఇరుప్రక్కలనుండు నది (3) 'ఉష్ణమండలము' (Torrid Zone) ఈమండలమున కిరుప్రక్కలను ఉండు రెండుమండలములును 'సమశీతోష్ణమండలములు' (Temperate Zones.) ధృవముల (Poles) నంటియుండునవి రెండును 'శీతలమండలములు' (Frigid Zones) (23వ పటముచూడుడు).

24-వ పటము.



1. మార్చి 21 తేదీని భూమియొక్క స్థానము. భూమియొక్క రెండు ధృవములును సూర్యునికి సమదూరముగనుండును. రాత్రియు పగలును సమానపరిమాణము గలిగియుండును.
2. జూను 21 వ తేదీని భూమియొక్క స్థానము. ఉత్తరధృవము సూర్యునివై పునకు వంగియుండును. ఉత్తరార్ధమునందు పగలు రాత్రికంటె పొడవు.

3. సెప్టెంబరు 23 వ తేదీని భూమియొక్కస్థానము చెండు ధృవముల ను మరల సూర్యునికి సమదూరముగ నుండును. రేయింబవళ్ళంతటను సమముగ నుండును.
4. డిసెంబరు 22 వ తేదీని భూమియొక్కస్థానము. దక్షిణధృవము నూ ర్యునికి సమీపముననుండును. దక్షిణాగ్రమునందు పగలు రాత్రికంటె చాడవు.

భూమి సూర్యునిచుట్టును దిరుగునప్పుడు దానికి గలుగుస్థాన భేదములచే సూర్యకిరణములు కొంతకాలము నిరక్షరరేఖ కు త్తరభాగమునకును కొంతకాలము దక్షిణభాగమునకును ఎక్కువ సూటిగా ప్రసరించును. (24 - వ పటము చూపుడు). ఇట్లుత్తరభాగమున నెక్కువ సూటిగా పడునపు డది దక్షిణ భాగముకంటెను, దక్షిణభాగమున నెక్కువ సూటిగా పడు నపు డది యుత్తరభాగముకంటెను ఉష్ణముగ నుండును. వసంత కాలము (Spring) గ్రీష్మకాలము (Summer) ఆకు రాలుకాలము (Autumn) శీతకాలము (Winter) అను నాల్గుకాలములును ఇందు వలననే గలుగుచున్నవి. కావున, ఆయాప్రదేశముల శీతోష్ణ భేదములకు భూమికి సూర్యునిచుట్టును తిరుగునపుడు గలుగు స్థానభేదములు మరియొక కారణము.

వాయువునకు అందు తేమలేనియెడల సూర్యకిరణములు తనగుండ ప్రసరించుచున్నను వానినుండి యుష్ణతనాకర్షించు శక్తి లేదనియు వాయువున కుష్ణత చాలవరకు క్రింది భూ భాగములనుండిగాని జలభాగములనుండిగాని ప్రచరించుట

చేతనే గలుగుచున్నదనియు పైని వ్రాయబడెను. కావున వాయుమండలముయొక్క అడుగుభాగమునకు (అనగా భూమికి సమీపముననున్న భాగమునకు) పైభాగమునకంటె ఎక్కువ యుష్ణత గలుగును. ఇందువలననే ఉన్నతప్రదేశములందు వాయువు సముద్రమట్టముననున్న ప్రదేశము లందుకంటె శీతలముగ నుండును. కావున ఆయాప్రదేశములందలి శీతోష్ణ భేదములకు వాని యున్నతభేదము లొక కారణము. కావుననే ఉదకమండలము యేర్కాడు మొదలగు నెత్తగుకొండలమీది ప్రదేశములందు బయల్ల (Plains) కంటె శీతలముగ నుండును.

నేలకు నీటికంటె యుష్ణప్రచారశక్తి ఎక్కువ. ఇందువలన భూభాగములపై వాయువు జలభాగములపై వాయువుకంటె త్వర లో వేడియొక్కును. కాన నిది వాయువుయొక్క శీతోష్ణభేదములకు మరియొక కారణము.

ముఖ్యముగా పైనివివరింపబడిన కారణములచేతనే ఆయా ప్రదేశములందును ఆయా కాలములందును వాయువునందు శీతోష్ణభేదములుగలుచున్నవి. ఇదిగాక నేలయొక్క స్వభావమును, జలాశయములసామీప్యమును అరణ్యములయొక్కయు సదులయొక్కయు విస్తారతయు ఈభేదములకు కొంతవఱకు కారణము లగుచున్నవి. జలాశయములకు మిగుల దూరముగ నుండు చెట్లుచేమలులేని యిసుకయెడారికంటె సముద్రప్రాంతములందలి నానావిధతరులతాగుల్మీదులతో నెప్పు


వండలి నేల సమశీతోష్ణముగను సస్యానుకూలముగను, నివాస యోగ్యముగను ఉండునని వేటుగఁజెప్ప నవసరములేదు.

ఉష్ణతామాపకము (Thermometer) అను యంత్రముచే నేప్ర దేశమందలి వాయు వెవుడెంతయుష్ణోగ్రతను గలిగియుండునో కనిపెట్టవచ్చును. (14-వ పుట చూడుడు.) మనమేదేని యొక ప్రదేశమునందలి వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రత నుష్ణతామాపకముచే ప్రతిదినమును కొన్ని సంవత్సరములు పరీక్షించిన యెడల దానియందలి తారతమ్యములు కించిచ్చేదములతో ప్రతి సంవత్సరమును ఒకేతీరుననుండును. వేసవిలో కొంచెమెచ్చు తగ్గుగా ప్రతిసంవత్సరమును ఉష్ణత హెచ్చుగనేయుండును. శీతకాలములో శీతలము కొంచె మించుమించుగా ప్రతిసంవత్సరము నొకేవిధముగ నుండును. మనము ప్రతిదినమును కొన్ని సంవత్సరములవఱకు ఏప్రదేశమునందయినను ఆయా కాలము లందు వాయువుయొక్క ఉష్ణోగ్రతను కనిపెట్టుచువచ్చినయెడల దాని బట్టి ఆప్రదేశమునందలి శీతోష్ణభేదము లిట్టివని గ్రహింపగలము. ఈవిధమనరాజధానిలో జిల్లాకొకచోట అంతరిక్ష విద్యాశాల (Meoteological station) స్థాపించబడియున్నది. కృషి వలుడు తాను సాగుచేయుప్రదేశమందలి శీతోష్ణభేదముల స్వభావమును కొంచె మించుమించుగా తన జిల్లాలోని అంత

రిక్షవిద్యాశాలలో కనిపెట్టి న్రామబడు ఉష్ణోగ్రతాపట్టిక (Temperature tables) నుబట్టి తెలిసికొనవచ్చును.

అంతరిక్షశాస్త్రజ్ఞులు పయోగించు ఉష్ణతామాపకములు మూడువిధములు. ఒకటి యేసమయమునందుగాని వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత యింతనితెలుపును. ఇది సామాన్యోష్ణతా మాపకము (Ordinary Thermometer). రెండవది గడచిన 24 గంటలలోను, వాయువునందుగలుగు అధికతమోష్ణోగ్రత¹ (Maximum Temperature) ను తెలియజేయును. ఇది అధిక తమోష్ణతామాపకము (Maximum Thermometer). ఇట్లే

25-వ పటము.




(ఈపటమునందు వైది అధికతము, క్రిందిది అల్పతము, ఉష్ణతామాపకములు.)

1 మిగుల నెక్కువయూష్ణోగ్రత.

మూడవది అల్పతమోష్ణోగ్రత² (Minimum Temperature) ను దెలియజేయును. ఇది అల్పతమోష్ణతామాపకము (Minimum Thermometer). ఏదినముయొక్కగాని అధికతమోష్ణోగ్రతను, అల్పతమోష్ణోగ్రతనుకలిపి సగముచేసినయెడల ఆదినపుమధ్య మోష్ణోగ్రత (Mean Temperature) ఇంతని తెలియును. ఇట్లు ప్రతిదినమును ఒకసంవత్సరమువరకు మధ్యమోష్ణోగ్రతను గనుగొని వానిని సగటుచేసినయెడల ఆసంవత్సరపు సగటు మధ్యమోష్ణోగ్రత (Average mean Temperature) తెలియును. ఈవిధముగ ననేకసంవత్సరముల సగటు మధ్యమోష్ణోగ్రతను ఏప్రదేశమగ్రిదైనను కనిపెట్టవచ్చును.

ప్రతిదినముయొక్కయు అధికతమోష్ణోగ్రతకును అల్పతమోష్ణోగ్రతకును గలభేదము ' ఉష్ణోగ్రతాసంచారము ' (Range of Temperature) అనబడును. పైవి చెప్పిన విధమున సీయుష్ణోగ్రతాసంచారమునకును సగటు (Mean) కనుగొనవచ్చును.

మన మేప్రదేశముయొక్కగాని శీతోష్ణస్వభావమును గ్రహించుటకు ఈసగటు మధ్యమోష్ణోగ్రతయు, సగటు ఉష్ణోగ్రతాసంచారమును ముఖ్యనూచకములు.



చెన్నపురి రాజధానియందలి ఆయా జిల్లాలయొక్క ముఖ్య పట్టణములందలి 5 (1896-1900) * సంవత్సరములపై సగటు మధ్యమోష్ణోగ్రతయు, సగటు ఉష్ణోగ్రతాసంచారమును ఈ క్రింది టేబుల్లో వివరింపబడును. (26-వ పటము చూడుడు.)

జిల్లా	పట్టణము.	సగటు మధ్యమోష్ణోగ్రత ఫ. అంశములు.	సగటు ఉష్ణోగ్రతాసంచారము. ఫ. అంశములు.
గంజాం	గోపాలపురము	79.8	13.6
విశాఖపట్టణం	వాల్తేరు	82.	14.1
గోదావరి	కాకినాడ	83.0	15.0
కృష్ణా	మచిలీపట్టణము	83.0	16.3
కర్నూలు	కర్నూలు	83.3	23.9
బళ్లారి	బళ్లారి	82.9	22.7
కడప	కడప	86.0	21.7
నెల్లూరు	నెల్లూరు	85.2	19.6
చెంగల్పట్టు	చెన్న పట్టణము	83.3	16.5
చెన్న పట్టణము			
దక్షిణార్కాడు	గూడలూరు (Cuddalore)	82.4	17.0
నేలము	నేలము	82.8	22.3

* మ శ యా శం జిల్లాయొక్క సగటుమాత్రము 1901-1905 సంవత్సరములది.

జిల్లా	పట్టణము.	సగటుమధ్యమోష్ణోగ్రత ఫ. అంశములు.	సగటు ఉష్ణోగ్రత తాపంచారము. ఫ. అంశములు.
కోయంబత్తూరు	కోయంబత్తూరు	80.5	20.3
తిరుచునాపల్లి	తిరుచునాపల్లి	85.0	20.2
తంజావూరు	నాగపట్టణము	81.2	13.7
మధుర	మధుర	84.1	19.5
తిర్నల్వేలి	తిర్నల్వేలి	85.7	17.6
మలయాళం	కల్లికోట	80.5	12.2
దక్షిణకన్నడం	మంగుళూరు	81.0	12.7
నీలగిరి	వెల్లింగ్టన్	62.9	19.1

పై పట్టికలన చెన్నపురిరాజధానిలో నీలగిరి మొదలగు నున్నతప్రదేశములందు దక్క తక్కినవానియందు సగటుమధ్యమోష్ణోగ్రత సామాన్యముగ 40° లకు పైనే యుండునని తెలియును. నీలగిరిజిల్లాయొక్క సగటుమధ్యమోష్ణోగ్రత 62.9° లుమే యయియున్నది. ఇట్లే శైవరాయకొండలు, పలని కొండలు మొదలగు నితరప్రదేశములందుగూడ 60.70° లు మాత్రమే యుండును. ఇట్టిప్రదేశములు కాఫీ, తేయాకు మొదలగు సమశీతోష్ణప్రదేశములందు పెరుగు సస్యముల కనుకూలముగ నుండును. పట్టుపురుగులను పెంచుటకును ఇట్టి ప్రదేశములే తగినవి.


మనుష్యులయొక్కయు, పశువులయొక్కయు, సస్యముల

యొక్కయు ఆరోగ్యమునకు సగటు ఉష్ణోగ్రతాసంచారమెంత తక్కువగానున్న సంతమంచిది. ఈవిషయమందు గంజాం విశాఖపట్టణం, తంజావూరు, దక్షిణకన్నడం, మళయాళం జిల్లాలు తక్కినవానికన్న సమకూలములు. కడప, కర్నూలు, అనంతపురం, బళ్లారి జిల్లాలు మిగుల ప్రతికూలములు.

సామాన్యముగా నీడేశమందు జనవరి నెల (పువ్యమాఘ మాసములు) అతిశీతలము. మే నెల (వైశాఖజ్యేష్ఠములు) అత్యుష్ణకాలము.

వాయుప్రవాహములు (WINDS).

క్రిందనున్న పటములో జూపబడినప్రకారము ఒకగ్లాసులో



27-వ పటము.

నీరుపోసి కొంచెము అంపపుపొట్టువేసి త్రిపది (Tripod) మీద నుంచి దానికింద నొకప్రక్కగా నొకదీపము నుంచినయెడల కొంతసేపటికి ఆప్రక్కనున్న నీరు పైకి ప్రవహించుచున్నట్లు ఆ ప్రక్కనున్న అంపపుపొట్టు పైకి లేచుచుండుటవలన మనము గ్రహింపగలము. (27-వ పటము చూడు.) ఇట్లే రెండవప్రక్క నీరు క్రిందికి ప్రవహించుచున్నట్లును తెలియును. వెచ్చజేయ బడిన ప్రక్కనీరు ఉష్ణముచే వ్యాకోచమునొంది సాంద్రత తగ్గి తేలికయై పైకిలేచుచున్నది. ఈస్థలము నాక్రమించుటకు చల్లనినీరు రెండవప్రక్కను క్రిందికి దిగుచున్నది.

ఇట్లే వాయువుగూడ ఉష్ణప్రదేశములందు పైకి ప్రవహించుచు శీతలప్రదేశములందు క్రిందికి దిగుచుండును. ఉష్ణప్రదేశములందలి వాయువు ఉష్ణతవలన వ్యాకోచమునొంది తేలికయై కొంతపైకి ప్రవహింపగనే యచటి వాయువుయొక్క సాంద్రత తగ్గును. సాంద్రత యెక్కువగనుండు చుట్టుప్రక్కల శీతల ప్రదేశములనుండి వాయు విచటికి ప్రవహించును. పైకిపోయిన వేడిగాలి ఈశీతలప్రదేశములనైపునకు ప్రవహించి క్రమముగా చల్లబడి బరువెక్కి యచట క్రిందికి దిగును. ఇట్లు వాయువుయొక్క సాంద్రత తక్కువగనున్న ప్రదేశములకు సాంద్రత యెక్కువగనున్న ప్రదేశములనుండి వాయు వెప్పుడును ప్రవహించుచుండును.

కొన్ని ప్రస్తకములను తీసికొని ఒకదానిపై నొకటిపెట్టినయెడల అన్నిటికంటె క్రిందిదానిని పైవన్నియు నొక్కును. పై

నుండి మూడవపు స్తకమును పైరెండుపు స్తకములు మాత్రమే నొక్కును. రెండవదానిని పైది యొకటిమాత్రమే నొక్కును. ఈనొక్కుట యనునది బరువును బట్టియుండును. ఎక్కువ బరువుగలవస్తువు ఎక్కువ గట్టిగా నొక్కగలదు. అనగా నెక్కువగా 'క్రిందిదానిని 'పీడించును' అని చెప్పవచ్చును. అట్లు పీడించు శక్తి 'పీడనము' అని చెప్పబడును. బరువుగల ప్రతిపదార్థమునకును పీడనశక్తి యుండుటచే గాలికిగూడ నిట్టి శక్తిగలదు. దీనికి 'వాయుపీడనము' (Atmospheric Pressure) అనిపేరు. పీడనశక్తి బరువునుబట్టి యుండుటచే, ఉష్ణముచే వాయువుతేలికయై పైకి పోవుటవలన దాని సాంద్రత తగ్గియున్న ప్రదేశములం దీశక్తి తక్కువగనుండును. వాయుపీడనము తక్కువగ నున్న ప్రదేశములకు ఎక్కువగనున్న ప్రదేశములనుండి వాయువు ప్రవహించును.

ఏప్రదేశమునందలి వాయుపీడనముయొక్క పరిమితినిగాని 'భారమితి' + (Barometer) అను యంత్రముచే మనము తెలిసికొనగలము. ఈయంత్రసహాయమువలన ఆయాప్రదేశములందలి వాయుపీడనశక్తియొక్క పరిమితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలిసికొనుటవలన వాయువు యెప్పు డెచటనుండి యెచటికి ప్రవహింపనున్నదో ఎంతవడిగా ప్రవహించునో మొదలగు సంశయములను కొంతముంధే తెలిసికొనవచ్చును. అంతరిక్షవిద్యాధికారులు

ప్రతిజిల్లా ముఖ్యపట్టణమునందలి వాయువీడనశక్తియొక్క పరిమితిని గనిపెట్టి అందలి తారతమ్యములవలన వాయువునందు గలుగు మార్పులను నూచించుచు ప్రతిదినమును నెకపట్టికను. చెన్నపట్టణమునందు ముద్రించి ప్రకటించుచుందురు. దీనియందలి ముఖ్యాంశములు చెన్నపట్టణమునందలి ముఖ్యదైనిక (Daily) పత్రికలలోగూడ ప్రకటింపబడుచుండును.

మనహిందూదేశమందు దానిచుట్టుపట్లనున్న భూభాగములయందును, జలభాగములందును ఆయాకాలములందు ఉష్ణోగ్రతాభేదములచే గలుగు వాయువీడనమందలి తారతమ్యములచే రెండుబలమైన వాయుప్రవాహములు గలుగుచున్నవి. ఇందు సామాన్యముగా జూన్ మొదలు సెప్టెంబరుకడవఱకును నైఋతిమూలనుండివచ్చు ప్రవాహమొకటి. దీనికి నైఋతివర్ష వాయువు (South West Monsoon) అనిపేరు. అక్టోబరు మొదలు జనవరివరకును ఈశాన్యమునుండి, ప్రవహించునది రెండవది. దీనికి ఈశాన్యవర్ష వాయువు (N. E. Monsoon) అనిపేరు. నైఋతివర్ష వాయువు ఈశాన్యవర్ష వాయువుగా మారునప్పుడు వాయువు కొంతకాలము నిలుకడగా నేవైవునుండియు రాక ఒకప్పు డొకవైపుననుండియు మరియొకప్పుడు మరియొకవైపుననుండియు వీచుచుండును. శీతకాలములో ఉదయమున ఉత్తరమునుండి గాలి వీచుచుండును. దీనినే మనము కొండగాలియందుము. వేసవి కాలములో పగటివేళ పడమటినుండి ఉష్ణవాయువువీచును. దీని

ని పడమటిగాడ్పు అందుము. ఈ రెండు కాలములందునుగూడ సాయంకాలము (కొన్ని దినములు మధ్యాహ్నమునుండియు) కొంచెమించుమించుగా నాగ్నేయమునుండి మెల్లనిగాలి వీచును. దీనిని పయరగాలి యందుము. అప్పుడప్పుడు వాయు వీడనమునందలి స్థానికభేదములచే తుపానులును గాలివానలును, వేసవికాలములలో గాలి దుమారములును, సుడిగాలులును గలుగుచున్నవి. వీని కన్నిటికిని మూలకారణము ఉష్ణోగ్రతాభేదములే గదా!

వాయుప్రవాహములే వర్షమునిచ్చు మేఘములను దూర ప్రదేశములనుండి దీసికొని వచ్చుచున్నవి. వానివలననే సస్యముల కొక్కొకప్పుడు మేలును ఒక్కొకప్పుడు కీడును గలుగుచున్నది. కావున వ్యవసాయదారు డీవాయుప్రవాహముల గతులను వాని కారణములను దెలిసికొనినయెడల ఆయాకాలములందలి వాయుప్రవాహముల గతికిని వాని ననుసరించి యుండు వర్షము, వాయువునందలి ఆర్ద్రత (Humidity) మొదలగువానికిని, సస్యముల వృద్ధిక్షయములకును గల సంబంధములను గనిపెట్టి ఏసస్యమున కేకాలము తగినదో తెలిసికొని వాని ననుకూలముగ అప్పుడు సాగుచేయ గలుగును. ఏసస్యమున కెప్పు డేవని చేయవలెనో ఆపనులను సకాలములో చేయగలుగును.

వర్షము (Rain)

నూర్మ్యుని యుష్ణముచేత సముద్రములు చెరువులు మొదలగు జయాశయములనుండియు నేలనుండియు నీరు ఆవిరిరూపమున పైకి లేచుచున్నది. ఇట్లు లేచు తేచు కొంత పైకిపోయి మేఘముగ నేర్పడుచున్నది. కొంతభాగము వాయువునం దంతటను వ్యాపించియుండును.

మేఘములు వాయుప్రవాహముల ననుసరించి యొకచోటి నుండి మరియొకచోటికి కొట్టుకొని పోవుచు, చలిగాలి సోకినపుడు గాని చల్లని పర్వతపార్శ్వముల దాకినపుడు గాని వానియందలి యావిరి నీరయి వర్షరూపమున నేలపైబడును. ఎత్తయిన పర్వతములును, పెద్దపెద్ద అడవులును గల ప్రదేశములం దీ మేఘములు నిలుచుటచే అట్టిప్రదేశములందు వర్షములు మెండుగ నుండును. కావున సరణ్యములను వృద్ధిచేయుట దేశమునకు ఔమకరము.

వర్షము సస్యములకు ముఖ్యవశ్యక మగుటచే మనరాజధానియందలి వర్షపాతము (Rain fall) యొక్క స్వభావమును గురించి కొంత తెలిసికొనవలయును.

నైఋతివర్షవాయువును, ఈశాన్యవర్షవాయువును, ఈ రాజధానికి వర్షమునిచ్చు ముఖ్య వాయుప్రవాహములు. కురియు వర్షమునందు చాలభాగము ఈరెంటికాలములోనే గురియును.

తక్కిన కాలములలో వర్ష మతిస్వల్పముగ నుండును. వర్ష పాతమునుబట్టి 12 నెలలును ఈక్రిందివిధముగ విభాగింపబడుచున్నవి:—

1. జనవరి మొదలు మార్చి కడవరకు, పొడినెలలు (అనగా వర్షము లేనినెలలు) అనబడును. ఇందు సామాన్యముగ వర్షము కురియదు.

2. ఏప్రిల్ మే నెలలు వేడినెలలు (ఉష్ణకాలము) అనబడును. ఇందు యెండలు తీక్షణముగ నుండును. ఇందు గాలి దుమారములతో కూడిన కొంచెము వర్షము (Mango showers) కురియును.

3. జూన్ మొదలు సెప్టెంబరు కడవరకు నైఋతివర్ష కాలము. ఇది విస్తారము వర్షము కురియుకాలము. ఇందలివర్షములు సామాన్యముగా 'పడమటివర్షములు' అనబడును.

4. అక్టోబరు మొదలు డిశంబరు కడవరకు ఈశాన్యవర్ష కాలము. ఇందు వర్షము నైఋతివర్ష కాలము నందుకంటె కొన్ని జిల్లాలలో తక్కువగను మరికొన్నిటిలో నెక్కువగను గురియును. ఇందలి వర్షములు సామాన్యముగా "తూర్పువర్షములు" అనబడును.

వర్షముయొక్క పరిమితిని గనిపెట్టుటకు 'వర్షమాపకము' (Rain gauge) అనుసాధనముగలదు. (28-వ పటముచూడుడు.)

1 గజము వెడల్పును 1 గజము పొడవును గల సమమయి గచ్చునేలచుట్టును దానిపై గురియు వర్షము పైకిపోకుండ అంచు గట్టినయెడల అందు 1 అంగుళములోతు నీరు నిల్చునట్లు వర్షము గురియునేని ఆప్రదేశమున 1 అంగుళము వర్షము గురిసెనందురు. ఇట్లు 1 గజముపొడవును 1 గజము వెడల్పునకును బదులుగా ⁵సీసా పైని 5 అంగుళముల మధ్యకొల్తగల గుండ్రని ఇత్తడిగరగ(Funnel) ను ఒక సీసాపై బెట్టి బయటనుంచి



28-వ పటము.

చినయెడల ఆ 5 అంగుళముల మధ్యకొల్తగల స్థలముపై గురియు వర్షపునీరును ఆసీసాలోనికి పోవును. ఈనీటిని 5 అంగుళములు మధ్యకొల్తగల 'గ్లాసు'లో పోసినయెడల నది యెన్ని అంగుళముల లోతువరకు వచ్చునో వర్ష మన్ని యంగుళములని చెప్పబడును. కొలతపాత్ర 5 అంగుళముల వెడల్పు గనుండిన యెడల మిగుల పెద్దదగుటచేత వాడుక కనుకూలముగ నుండదు. ఒక అంగుళము ఎత్తును అనేక చిన్న చిన్న భాగములుగా విభాగింప వీలుండదు. కావున సామాన్యముగా 5 అంగుళముల మధ్యకొల్తగల స్థలముపై గురియు $\frac{1}{16}$ అంగుళము వర్షపునీరు రమారమి 5 అంగుళముల ఎత్తువరకు వచ్చునంత మధ్యకొల్తగల నిలువు 'గ్లాసు' కొల్త కుపయోగింపబడును. ఈ యరంగుళము వర్షపునీరుపట్టుఎత్తును 50 భాగములుగా విభాగింప.

బడుటచే వర్ష ముయొక్క పరిమాణమును అంగుళములో నూరవ వంతువరకు నిర్ణయింపవచ్చును. అంగుళములో నూరవవంతుకు సెంటు (Cent) అని పేరు. ఒకటింబైతికయంగుళమనగా 1 అంగుళము 25 సెంటులు. అంగుళ మనగా రమారమి రెండు దుక్కులు.

వర్షమాపకము ప్రతి 'తాలూకాకచ్చేరీ' లోను మనము చూడవచ్చును. ఈయంత్రసాహాయ్యముచే అనేకసంవత్సరముల నుండి ఆ యాస్థలములందు, యేదినమున నెంతవర్షము గురి సెనో నిర్ణయింపబడి లెక్కవ్రాయబడి యున్నది. మనరాజ ధానిలోని ఆయా జిల్లాలందలి 30 సంవత్సరముల (1870-1899) మీది సగటువర్షపు పరిమితియు తడిదినముల * సంఖ్యయొక్కసగటును ఈదిగువ వివరింపబడును. (29-వ పటము చూడుడు).

జిల్లా సగటువర్షము తడిదినముల విశేషాంశములు.

అం.సెం. సగటు.


గంజాము 45.46. 59. సముద్రతీరమునకంటె లోవ
ల నెక్కువగురియును.

విశాఖపట్టణము 41.32. 56.

సముద్రప్రాంతము.

* తడిదిన్నము (Wet day) అనగా 10 సెంటిమీటర్లవైగా వర్షముగురిసిన దినములు. 1 సెంటు అయినను వర్షము గురియైనదియు (Rainy days) వర్షపుదినములు అనబడును.

విశాఖపట్టణము	} 57.16. 83		జయపురమునందు రమారమి 66 అంగుళములు అందు పడమటివర్షము 58 అం॥
పర్వతప్రాంతములు			
గోదావరి	38.73	48	భద్రాచలంవద్ద రమారమి 41 అం॥ అందు పడమటివర్షము 33 అం॥
కృష్ణా	33.08	47	డెల్టాలో లోపలి భాగములకంటె నెక్కువగురియును.
కర్నూలు	26.36	41	పడమటి వర్షములు నల్లమలల వలన మధ్య భాగమున నెక్కువగ నుండును.
బళ్లారి	22.68	40	రామదుర్గమునందు మాత్రము 40 అం॥ వరకు గురియును.
అనంతపురము	22.81	36	
కడప	27.84	41	పుల్లంపేట తాలూకాలో మాత్రము ఊర్పుకనుమల వలన రమారమి 40 అం॥ గుళములు గురియును. ఉత్తర దక్షిణ భాగములందు వర్షము మిగుల తక్కువ



గం-గంజాం. వి-వికాఖపట్టణము. గో-గోదావరి. కృ-కృష్ణ. గుం-గుంటూరు. క-కర్నూలు. బ-బళ్లారి. ఆ-ఆనంతపురం. కడ-కడప. నె-నెల్లూరు. చెం-చెన్నలక్ష్మి. చి-చిత్తూరు. ఉ-ఉత్తరాంధ్ర. ద.ఆ-దక్షిణాంధ్ర. సే-సేలము. కో-కోయంబత్తూరు. తిరు-తిరుచనాపల్లి. తం-తంజావూరు. మ-మధుర. రా-రామనాథపురము. తిర్న-తిర్నల్వేలి. సీ-సీలగిరి. మళ-మళయాళము. దక-దక్షిణకన్నడము.

నెల్లూరు	41-00	41	సముద్ర తీరమున నెక్కువ. లోపల తక్కువ.
చెంగల్పట్టు	45-04	53	ఇందు తూర్పు వర్షము లెక్కువ.
దక్షిణార్కాడు	43-20	52	సముద్రతీరమున వర్ష మెక్కు వ. లోపల తక్కువ. ఇందును తూర్పువర్షము లెక్కువయ్యే.
ఉత్తరార్కాడు	37-08	49	తూర్పుభాగమున పడమటి కంటె నెక్కువ.
సేలము	31-85	47	శైవరాయ కొండలపైని ర మారమి 63 అం॥ వరకు గురియును. ఇందు పడమటి వర్షము లెక్కువ.
కోయంబత్తూరు	25-82	42	ఉత్తరమున కొండలును అ డవులును ఉండుటచే 35 అం॥ వరకు గురియును. మధ్యభాగమున 21 అం॥ మాత్రమే. ధారాపురమున 19 అం॥ మాత్రమే గురి యును.

తిరుచునాపల్లి	34-20	47	ఉత్తరమున నెక్కువ; దక్షిణమున తక్కువ.
తంజావూరు	44-40	55	సముద్రతీరమున నెక్కువ ; లోపలతక్కువ ; తూర్పువానలు విశేషముగా గురియును.
మధుర.	30-19	43	పలని కొండలపైని 67 అం. వరకు గురియును.
తిర్నల్వేలి.	26-80	41	ఇందు పడమటివానలుమిగుల తక్కువ. పొడినెలలలో నిచట తక్కిన చోట్లకంటె నెక్కువ గురియును.
మలయాళము.	114-39	117	దక్షిణవై నాడులో 158అం. వరకు కురియును. అందు 128 అం. పడమటివర్షమే లోపలగానున్న పాలఘాట్టు నందు 75అం. మాత్రమె.
దక్షిణకన్నడం.	143-32	121	పర్వతముల ప్రక్కల 184 అం.వరకు గురియును. మంగుళూరునందు 133 అం.
నీలగిరి.	63-91	102	పడమట 157 వరకు గురి

యును. పడమటిభాగమున
పడమటివర్షములును తూర్పు
భాగమున తూర్పువర్షములు
ను మొదలు.

పైపట్టీవలన మలయాళం దక్షిణకన్నడం ఈజిల్లాలలో 100 అం.లకెక్కువవర్షము గురియునని తెలియును. అట్టిప్రదేశములలో కాలవలతోను, చెరువులతోను నిమిత్తములేకయే కేవల వర్షాధారమున వరిపంటగూడ పండును. మిరియాలును ఏలకులును పండుజిల్లా లివియే. ఆజిల్లాలయందలి పడమటి కనుమలు నైఋతి వర్షవాయువు నడ్డకొనుటచేతనే, యచట నంతవర్షము కురియును. కర్నూలు, కడప, బళ్లారి, అనంతపురం, కోయంబత్తూరు, తిర్నల్వేలి జిల్లాలలో వర్షము మిగులతక్కువ. కొన్ని భాగములలో 25 అం. లకంటెను తక్కువగనుండును. తక్కిన జిల్లాలలో వర్షము మధ్యమముగానుండును.

పడమటి వానలు దక్షిణకన్నడం, మలయాళము, విశాఖపట్టణము నందలి పర్వతప్రాంతములు, వీని యందు విశేషముగా (50 అంగుళములకుపైగా) కురియును. తిర్నల్వేలిలోను కోయంబత్తూరులో కొన్ని భాగములందును, మిగులతక్కువ (15 అం. లకు లోపు)

తూర్పు వానలు, చెన్నపురికి దక్షిణమున సముద్రప్రాంతము లందును సీలగిరి, పలనికొండలు వీని తూర్పుభాగము లందును

మెండు. (25 అం. ల కెక్కువ) అచట వ్యవసాయమునకు పడమఱ
టివానలకంటె తూర్పువానలే ముఖ్యమయినవి. తక్కినజిల్లాలలో
తూర్పువానలు అంతగా కురియవు(25.అం.లకు లోపు). గంజాం.
విశాఖపట్టణము జిల్లాల వర్షతప్రాంతములందును కర్నూలులో
కొంతభాగమునను తూర్పువానలు మిగులతక్కువ.

పొడినెలలో వర్ష మన్ని జిల్లాలలోను తక్కువయేకాని తిర్న
వేలి నీలగిరి వీనిలోమాత్రము తక్కినవానికంటె కొంచెమెక్కు
వగా (రమారమి 3 అం. లు) గురియును. అట్టిచోట్ల నది కొంత
వరకు వ్యవసాయమున కుపయోగించును.

వేడినెలలో మలయాళం పలనికొండలు వీనియందు మాత్ర
ము 10 అం. ల కెక్కువగా కురియును. దక్షిణకన్నడం కోయం
బుత్తురు, నేలం జిల్లాలలోను విశాఖపట్టణం గంజాం జిల్లాల
కొన్ని భాగములందును 5 మొ. 10 అం. ల వరకుగురియును..
5 అంగుళములకు పైవైన కురియుచోట్ల కొన్ని జిల్లాలలో ఈవర్షము
విత్తులుచల్లుట కుపయోగించుచున్నది. తక్కినభాగములలో
నేలను తొలకరి సస్యములకు దున్నుటకు మాత్ర ముపయో
గించుచున్నది. గోదావరి జిల్లాలోను కర్నూలు కడప, నెల్లూరు
జిల్లాల పడమటి భాగమునను, పొడినెలలలో వర్షము మిగుల
తక్కువ. . .

పైని వివరింపబడిన వర్ష ప్రాంతమునందలి భేదములకు ఆయా

చోట్లగల పర్వతములయొక్కయు వాని మధ్యనుండు లోయల యొక్కయు స్థానములను బట్టి వర్షవాయువుల గమనమునందు భేదములు గలుగుటయె.

వ్యవసాయదారునకు వర్షమువలని ప్రయోజనము అది కురియుకాలమును బట్టియు, ఒక్కొక్కసారి కురియుపరిమితినిబట్టియు ఉండును. శీతకాలములో 1 అంగుళము వర్షము గురిసినయెడల వేసవికాలములో నొకయంగుళము గురిసినదానికంటె నెక్కువ యుపయోగకరము. $\frac{1}{2}$ గంటలో రెండంగుళముల వర్షము కురియుటకన్న నారెండంగుళములే 24 గంటలలో గురియుటమేలు. నేల యిదివరకే పదునుగానున్నపుడు చిన్నచిన్న జడులయినను ఉపయోగించును. పదునులేని నేల కట్టిజడులవలన లాభముండదు. 40 అం. లవర్షము 2-3 మాసములలోనే గురిసి వేసి, తక్కిన నెలలన్నియు వర్షములేక యుండుటకంటె, నంతకుతక్కువ వర్షమయినను, 5-6 మాసములవరకు అప్పుడప్పుడు కురియుచుండుట వివిధసస్యములను సాగుచేయుట కనుకూలముగనుండును.

వ్యవసాయదారుడు తాను సాగుచేయు ప్రదేశమున సగటున ప్రతిమాసమునగాని ప్రతిపక్షమునగాని ఎంతవర్షముగురియునో ఆవర్ష మెన్ని దినములలోకురియునో తాలూకా కచ్చేరీలలో నుండు పట్టణములన దెలిసికొనవచ్చును. ఇట్లు తెలిసికొనినయెడల ప్రదేశమున నేకాలమున నేపైరుపెట్టుట కనుకూలమో యాహింపవచ్చును. సామాన్యముగా కృషివలులు తాముసాగుచేయు

ప్రదేశములను గూర్చిన యీయంశములను కొంతవరకు అనుభవముచేతనే తెలిసికొనుచున్నారని అంత సూక్ష్మముగా గ్రహింపజాలరు. ఏదైన కొత్తప్రదేశమునకు బోయి వ్యవసాయ మారంభించదలచినయెడల నప్పుడు వారియనుభవముచాలదు.. ఇతర వృత్తులలో మెలగుచుండి కొంతకాలమైనపిమ్మట వ్యవసాయవృత్తి నవలంబించువారికి అట్టియనుభవజ్ఞానము కూడ యుండదు.

వర్షపునీరు క్రిందపడునప్పుడు అదివాయువునుండి కొంతఅమ్మోనియా (Ammonia)ను పీల్చును. మెరుములు ఉరుములు గలుగునపుడు విద్యుచ్ఛక్తిచే వాయువునందలి నత్రజనియు, తేమయు రసాయన సంయోగమునొందుటచే కొంత నత్రికామ్లము జనించి వర్షముతో క్రిందపడును. ఇదిగాక వర్షధారలు క్రిందికివచ్చునప్పుడు వాయువునందలి కొన్ని సేంద్రియపదార్థపు రేణువులనుగూడ పట్టి తెచ్చును. నత్రజని సస్యములకు కావలయు ముఖ్యపదార్థములలో నొకటియగుటచే వర్షమువలన నేలకు కొంత సారము చేరుచున్నదని చెప్పవచ్చును. 1888వ సం. లో చెన్న పట్టణమున వర్షముతో ఎకరమునకు 4పౌనుల నత్రజని నేలకు జేరెనని లెక్కవేయబడెను. తొలకరివాసలలో పైని చెప్పిన నత్రజని సంబంధమైన పదార్థములు విశేషముగానుండుటచే నవి సస్యములకు మిగుల నుపయోగకరము. 'తొలకరివాసలు మొలకకు తల్లి' యని సామెతయే..

వడగండ్లు (Hail)

వర్షముపైనుండి పడునపుడు 32° ఫ.లకు తక్కువ యుష్ణోగ్రత గలగాలి వీచినయెడల వర్షబిందువులు గడ్డకట్టి రాళ్ళనలె నగును. ఇవియే వడగండ్లు. వడగండ్లు సామాన్యముగా పొడినెలల లోను, తొలకరియందును పడుచుండును. వడగండ్లు పెద్దవిగా నున్నయెడల జంతువులకును సస్యములకును గూడ హాని కలుగును.

ఇటలీదేశములోను ఉత్తరహిందూస్థానములో కొన్ని ప్రదేశములందును వడగండ్లు తరుచుగాపడును. ఇటలీదేశములో వీని వలన ద్రాక్షవాటికలకు ప్రతియేటను మిగులనష్టము గల్గుచుండుటచే నొక ద్రాక్షవాటికాపాలకుడు (vine grower) వడగండ్లుపడకుండుటకు ఒకయు పాయమునుగనిపట్టెను. తనవాటికల చుట్టునున్న గుట్టలపై ఫిరంగులనుంచి, మబ్బుపట్టి వడగండ్లు పడునను అనుమానము తోచినప్పుడు ఆమబ్బులవైపునకు ఫిరంగులను కాల్చుటవలన వర్షముమాత్రము గురిసి వడగండ్లుపడుట మానుచుండెను. ఇట్టిప్పు డాదేశమున ననేకచోట్ల చేయుచున్నారట.

ఆర్ద్రత (Humidity)

సూర్యనియుష్ణతచే జలాశయములనుండి పైకిపోవు తేమలో కొంతభాగము వాయువునం దంతటనువ్యాపించియుండునని పైని వ్రాయబడెను. ఉద్భిజ్జములు సరిగా పెరుగుటకు ఆయాజాతు

లకుతగినంత తేమవాయువునం దుండవలెను. కావున వ్యవసాయ దారుడు వాయువునందు తేమ యెపు డెంతగలదో యెపుడెంత యుండిన నాయూ సస్యముల కనుకూలమో తెలిసికొనవలెను.

వాయువుయొక్క ఉష్ణోగ్రతనుబట్టి అందుండ గలుగు తేమకు పరిమితిగలదు. వాయువుయొక్క ఉష్ణోగ్రత యెంత ఎక్కువగనున్న అందు అంత ఎక్కువ తేమయుండగలుగును. ఏయుష్ణోగ్రతయందు గాని తేమ ఎంతయుండగలుగునో అంతయు నున్న యెడల నపుడు వాయువు తేమతోనిండి (ఆర్ద్ర)తాపూరితమయి యున్నదందురు. ఉష్ణోగ్రతయు తేమయు హెచ్చుగానున్న వాయువునుచల్ల పరచిన యెడల అందదివరకున్న తేమయంతయు అందుండ లేక పేరుకొని నీటిబిందువులుగా దానిచుట్టుపట్లనున్న పదార్థములపైబడును. ఇది యే 'మంచు' (Dew). ఇది మన మొక ప్రయోగము నలన ప్రత్యక్షముగాజూడగలము. మన మొక పాత్రములో మంచు గడ్డతో చల్లపరచి నీరుపోసి బల్లపై నుంచినయెడల కొంత సేపటికి పాత్రము పైభాగమున నీటిబిందువులు గాననగును. ఆపాత్రము చుట్టునున్న వాయువు అతిశీతలోదకముగల పాత్ర నంటుటచేత దాని యుష్ణోగ్రతతగ్గి అందంతవరకున్న తేమయంతయు అందుండజాలక పేరుకొని పాత్రమున కంటుకొనెను.

సస్యములకు వాయువునందలి తేమయొక్క యుపయోగము, ఏసమయమునందుగాని దానియందు అప్పటి యుష్ణోగ్రతనుబట్టి అది తేమతో నిండియుండుట కుండవలసిన తేమలో నూటికెన్ని

పాళ్లుండునో, దానిని బట్టియుండును. సమానమైన రెండు పెద్ద కొట్టున్న వనుకొనుడు. అం దొక దానియందలి వాయువుయొక్క ఉష్ణోగ్రత 100° ఫ. లు అనియు ఆర్ద్రతాపూరితమగుటకు అందు 80 తులముల తేమ యుండవలయుననియు అనుకొనుడు. ఆ గదిలో 56 తులముల తేమమాత్రమే యున్నయెడల అందుండ వలసినదానిలో నూటికి 70 పాళ్లుండును. రెండవగదిలో వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 80° ఫ. అంశములును ఆర్ద్రతాపూరితమగుటకు అందుండవలసిన తేమ 64 తులములును అనుకొనుడు. అందు 48 తులములుమాత్రమే యున్నయెడల ఆర్ద్రతాపూరిత మగుటకు ఉండవలసినదానిలో నూటికి 75 పాళ్లుండును. మొదటి కొట్టులో 56 తులముల తేమయున్నప్పటికిని అందలివాయువు తేమతో నిండియుండుటకుండవలసిన తేమలో నూటికి 70 పాళ్లు మాత్రమే యున్నది. రెండవదానిలో 48 తులములు మాత్రమే యున్నప్పటికిని, ఉండవలసినదానిలో నూటికి 75 పాళ్లున్నది. మన మొకతడిబట్టను మొదటిదానిలో నారగట్టినయెడల అందు తేమ తక్కువగానుండుటచేత రెండవదానిలోకంటె త్వరలో నెండును. కావున వాయువు తేమగానుండుటయు, పొడిగా నుండుటయు ఆర్ద్రతాపూరితమగుటకు అందుండవలసిన తేమలో నూటి కెన్ని పాళ్లుండునో దానినిబట్టి నిర్ణయింపబడును.

వాయువుయొక్క ఆర్ద్రతను (తేమను) గనిపెట్టుటకు 'ఆర్ద్రతాసూచకము' (Hygrometer), అనుసాధనముగలదు.

అంతరిక్షవిద్యాధికారులు దీనిచే ఏప్రదేశమున వాయు వెపు డెంత తేమగనుండునో కనుగొని, వారు ప్రతిదినమును ప్రచురించు పట్టివలన ప్రజలకు తెలియజేయుచుందురు.

మొక్కల నొకచోటినుండి తీసి మరియొకచోట పాతునపుడును, విత్తనములు చల్లనపుడును, వాయువు తేమగానుండుట మంచిది. విత్తనములు, దుంపలు మొదలగునవి నిలవచేయు స్థలములందు వాయువు తేమగా నుండగూడదు. పొగాకు మొదలగు ద్రవ్యములను బాగుచేయునపుడు ఆర్థిక అందుకు తగినట్లుండని యెడల నవి చెడును. ఇట్లే వ్యవసాయదారుడు చేయవలసిన పనులనుబట్టి కొన్ని సమయములందు వాయువు విస్తారము తేమగను, కొన్ని సమయములందు తక్కువ తేమగను ఉండవలసి యుండును. కావున తాను చేయు పనులకును, సస్యముల వృద్ధికిని వాయువెపు డెంత తేమగనుండుట మంచిదో, వాయువు ఎపుడెంత తేమగనున్నదో తెలిసికొని, వాయువుయొక్క ఆర్థిక ననుసరించి వ్యవసాయదారుడు తనసస్యములను, వానికి తానుచేయవలసిన పనులను, వానికాలములను మార్పుకొనుచుండవలెను. కొన్ని కొన్ని విలువగల సస్యముల విషయములో తగిన కట్టడములవలన ఆర్థికతను ఎపు డెట్లుండవలెనో అట్లుండు నట్లు చేసికొనవచ్చును. ఉద్యానవనములలోని ఫెరను గృహములు (Fern Houses) ఇట్టివే.

మంచు. (Dew)

మంచేర్పడు విధానము పైని నూచింపబడెను. మంచు చెన్న పురిరాజధానిలో శీతకాలము (నవంబరు మొదలు ఫిబ్రవరి కడవరకు) నందు విస్తారము పడును. ఈ కాలములో అదివరకు కురిసిన వర్షములవలన నేల మిగుల తేమగానుండుటచే పగలు వాయువునందు విస్తారము తేమచేరును. రాత్రి యుష్ణత మిగుల తగ్గుటచే త అందలి తేమలో కొంతభాగము గడ్డి, చెట్లయాకులు మొదలగు వానిమీద నీటిబొట్లుగా పడును. ఉలవ మొదలగు పయరచేలకు మంచు మిగుల యావశ్యకము. అవి వర్షమంతగా లేకపోయినను మంచు వలననే పెరుగును.

పొగమంచు (Fog)

పొగమంచు అనునది వాయువునందలి తేమ, పైని చెప్పినట్లు చెట్లు మొదలగు వానిమీదగాక వాయువునందలి నూత్నములగు దుమ్మురేణువులను పట్టుకొని గాలిలోనే తేలుచుండుటచే పొగవలె కనుబడు జలరేణు సముదాయము.

తేనెమంచు (Honey Dew)

తేనెమంచు నిజముగ మంచుకాదు. అది యొక వీధమయిన చిన్న చిన్న పురుగులచే విడువబడు ద్రవము. ఈ చిన్న పురుగులు చెట్లపైనుండి ద్రవమును క్రిందికి విడుచుచుండును. ఇది తేనెవలె జిగటగానుండుటచే మామిడి మొదలగు వృక్షములయొక్కయు

కాయ ధాన్యములయొక్కయు పువ్వులలోని పుప్పొడిరేణువులు అవియున్నచోటనే అంటుకొని పోవుటవలన, పుష్పగర్భంబుల కొనదిమ్మల మీదికిపోయి వానిగర్భవతుల జేయజాలవు. కావుననే పుష్పగర్భములు పెరిగి కాయలుగాక, యెండి రాలి పోవును.

ఉష్ణోగ్రత వాయుప్రవాహములు వర్షము మొదలగువాని యందలి మార్పులకు కొన్ని కారణములు పైని వ్రాయబడెను. కాని, అంతరిక్షశాస్త్రజ్ఞులు వాని నన్నిటిని కనిపెట్టి గలిగిరని చెప్పుటకు వీలులేదు. కొన్నికొన్ని కారణములు తెలిసినను కొన్ని తెలియనివిగూడ కలవు. కాని క్రమక్రమముగా వానినన్నిటిని తెలిసికొని రాబోవు స్థితిగతులను ఇప్పటికంటె నిశ్చయముగ చెప్పగలుగుదురని నమ్మవచ్చును.

ఉష్ణోగ్రత మొదలగువానికిని ఆయాసస్యములకును గల సంబంధములనుగూడ శాస్త్రజ్ఞు లింకను పూర్ణముగ కనిపెట్టిరని చెప్పుటకు వీలులేదు. అమెరికా మొదలగు వ్యవసాయ ఖిబి వృద్ధిగనున్న దేశములలో ఈవిషయమయి వ్యవసాయదారులుగూడ వృక్షశాస్త్రజ్ఞులను చాల పరిశ్రమ చేయుచున్నారు. కాని మన దేశమున నట్టికృషి యల్పముగానున్నది. ఇంతవరకు శాస్త్రజ్ఞులచే గనిపెట్టబడిన అంశములు కొన్ని ఆయాసస్యములను గూర్చి వేరు వేరుగా ప్రస్తావించుచో (రెండవసంపుటమునందు) వ్రాయబడినవి.



ఐ ద ప య ధ్యా య ము.

నేల (THE SOIL.)

మొక్కలు తమ వేళ్లను పాతుకొని నిలువబడుటకు నేల యాధారమనియు, తమకు కావలసిన యాహారద్రవ్యములలో కర్బనద్వ్యవ్లజనిదము (Carbon dioxide) గాక తక్కినవాని నన్నిటిని యవి తమ వేళ్లవలన నేలనుండియే దీసికొనుననియు మూడవ యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. నేలయొక్కస్థితి యీ రెండు పనులకును అనుకూలముగ నుండనియెడల నందు సస్యములు బాగుగ పెరిగి ఫలింపవు. వ్యవసాయదారుడు తాను పైరుచేయు నేల వాని కనుకూలమగు స్థితియం దున్నదో లేదో తెలిసికొని, అనుకూలస్థితియందు లేనియెడల దానిని తగినవిధమున బాగుపరచవలెను. ఇట్లుచేయగలుగుటకు కృషివలు డాయాసస్యముల స్వభావమును గురించియెగాక, నేలయొక్క నిర్మాణమును గురించియు, భౌతికరసాయన ధర్మములను గురించియు తెలిసికొనుట యావశ్యకము. కావున నీవిషయములను గూర్చి బోధించు 'భూగర్భశాస్త్రము' (Geology)ను గూడ కొంతవరకభ్యసించవలయును.

భూగోళము మొదట కరగిన లోహమువలె నుష్ణాధిక్యముచే ద్రవపదార్థముగ నుండెననియు, కాలక్రమమున నా

యుష్ణము తగ్గిపోయి దానియుపరిభాగము గట్టిపడి శిలారూపము దాల్చెననియు భూగర్భశాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఇప్పటికిని భూమి యొక్కలోపలిభాగము ఉష్ణద్రవరూపముగా నున్నదనుటకు అగ్నిపర్వతములనుండి వెలువడు కరగినరాళ్లు మొదలగునవి ప్రత్యక్ష దృష్టాంతములు. వడలిన పండుయొక్కచర్మము ముడతలుపడునట్లు భూమియొక్క యుపరిభాగము మొదట గట్టిపడినపుడు దానియందు మిట్టపల్లము లేర్పడెను. ఉన్నతములగు గుట్టలును పర్వతములును ఇట్లేర్పడిన మిట్టలు. వాని మధ్యనుండు లోయలు ఇట్లేర్పడిన పల్లములు.

కట్టినపు డెంతో రమ్యముగను నున్నగను ఉండు రాతికట్టడములయొక్క గోడలను కొన్ని సంవత్సరముల తర్వాత చూచినయెడల నవి యక్కడక్కడ గుంటలుపడి చేతితో రాచినయెడల గర గర లాడుచు కొంతదుమ్ము క్రిందరాలును. ఏటేట మరమ్మత్తుచేయనియెడల నెంత గట్టిగాకట్టిన సాధము లయినను కొంతకాలమునకు శిథిలము లగును. మనమేదేని పర్వతముపైకి పోయి చూచినయెడల నచటి రాతిప్రదేశము బీటలు దీసి విశ్లేషము (Disintegration) నొందుటయు వివిధ పరిమాణములు గల శిలాఖండములు దానినుండి విడిపోవుటయు నిట్లు విడిపోయిన పదార్థములలో కొంతభాగము వాగులపెంబడి కొట్టుకొనిపోవుటయు కాననగును.

మొదట్ట గట్టిపడినపుడు భూతలమంతటను రాతిప్రదేశమే యయియున్నను, కాలక్రమమున నా ప్రదేశమందలి శిలా విశ్లే

షము నొంది మిట్టప్రదేశములందలి విశ్లేషిత పదార్థములు పర్వము మొదలగువాని వలన పల్లపుప్రదేశములలోనికి కొట్టుకొని పోయి యచటి విశ్లేషిత పదార్థములతోడజేరి యందలి శిలాప్రదేశమును గప్పచుండెను. ఇట్లు పర్వతములు మొదలగు నున్న తప్రదేశము లందలి పాషాణములు శిథిలమగుటయు, విశ్లేషిత పదార్థములన్నియు కూడుకొనుట వలన పల్లపుప్రదేశములు పూడికొంతవరకు సమప్రదేశములగుటయు గడియారపుముండ్లు కదలుచున్నట్లు కనబడకయే తిరుగుచున్నట్లు సర్వకాలములందును జరుగుచునేయున్నవి. ఇంతేగాక పల్లపుప్రదేశములలో జేరిన తరువాతగూడ నీవిశ్లేషిత పదార్థములు మరింత విశ్లేషమునొంది కొంతతేమతోను ఆకులములు క్రుళ్లుటవలన నేర్పడినకొంత సేంద్రియ పదార్థముతోను కూడి యనేకమార్పుల నొందుచుండును. ఇట్లు పాషాణముల విశ్లేషమువలన నేర్పడి పల్లపుప్రదేశములలో కూడుకొని యిదివరలో ననేక మార్పులను బొందినట్టియు యింకను అనేక మార్పుల బొందుచున్నట్టియు, వివిధ పరిమాణములుగల శిలా రేణు సంచయమే 'మన్ను' (Soil) అనబడుచున్నది. మనమేదేని రాతిని నుత్తేతోగొట్టి పొడిచేసినయెడల నాచూర్ణము కొంచె మించుమించుగా మంటిని పోలియుండును. మన్ను యిట్లోక సారిగాగాక కాలక్రమమున ననేక భౌతిక రసాయనవికారములు గల్గుటచే నేర్పడిన రాతిపొడుమే గాని వేరొకటికాదు. ఇట్టి మంటిచే నాక్రమింపబడిన ప్రదేశమునే వ్యవసాయదారులు 'నేల' (Soil) అందురు. 'భూమి'


‘క్షేత్రము’ అనుపదములు నేలకు నామాంతరములుగా నుపయోగింప బడుచున్నవి.

సాధారణముగా నేలయందు ఏటేట నాగళ్లు మొదలగు పనిముట్లచే కదుపబడు భాగము ‘నేల’ ‘పైనేల’ (Soil or surface soil) అని పిలువబడును. సామాన్యముగ పైనేల 8 అంగుళముల లోతువరకును గలభాగమని చెప్పవచ్చును. దానికి క్రిందిభాగమంతయు ‘క్రిందినేల’ (Sub soil) అనబడును.

ఇంతవరకు నేల శిలావిశ్లేషమువలన నేర్పడెనని తెలిసికొంటిమి. ఇక శిలావిశ్లేషమునకు గారణము లేవియో విచారితము.

వాయువునందు నైదింట నొక పాలుగా నున్న అప్లజని (Oxygen) యను మూలద్రవ్యమునకు కొంచె మించుమించుగా తక్కిన మూలద్రవ్యము లన్నిటితోను, రసాయనసంయోగము నొందు శక్తిగలదని రెండవ యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. ఇనుపవస్తువులు త్రుప్పుపట్టి క్రమక్రమముగా శిథిలమగుట వాయువునందలి అప్లజని యినుముతోగలిసి దానిని లోహికాప్లజనిదము (లోహికా = Fe_2O_3) అను శాస్త్రీయనామముగల త్రుప్పు అనుపదార్థముగ మార్పుటచేతనే. ఇట్లే పాషాణములందును ఇనుము మొదలగు మూల ద్రవ్యములతో వాయువునందలి అప్లజని రసాయన సంయోగమునొందుటచే త్రుప్పువంటి పదార్థములేర్పడి వానినుండి విడిపోవుటచేత నవి

గుల్ల బారి కొంతవరకు శిథిలమగును. కావున అప్పుడని శిలావిశ్లేషమును గలిగించు ముఖ్యకర్తలలో నొకటి.




30-వ పటము.

నదులు పర్వతములను దొలిచివేయుట.

జలము మరియొకబలమైన విశ్లేషకర్త. నీటిలో ఉప్పు చక్కెర మొదలగు కొన్ని పదార్థములు కరగునని యందరకును దెలిసినదే. పాషాణములయందుండు ఇట్టి పదార్థములు కొన్ని జలము వర్షరూపమున శిలాప్రదేశము పైబడి ప్రవహించు నపుడు ఆనీటిలో కొంతవరకు విలీనమై దానితో పల్లపుప్రదేశములలోనికి బోవును. నీటిలో బొగ్గుపులుసు గాలి (కర్బనద్వ్య యుజనిదము) కరగియున్న యెడల దాని ద్రావణశక్తి మరింత యుక్కువగును. వర్షపునీటిలో కొంత నత్రికామ్లముగూడ కలిసి యుండునని వెనుకటియధ్యాయమున వ్రాయబడెను. ఇదిగూడ

నీటియొక్క ద్రావణశక్తిని హెచ్చించును. పాషాణములందలి కొన్ని పదార్థము లిట్లు కరగిపోగానే అవిగుల్లబాటి క్రమక్రమముగా శిథిలమగును. నీరు పాషాణములపై బ్రవహించునపుడు ఆప్రవాహపు రాపిడిచేతగూడ వానికి కొంత యరుగుదల గలుగును. సముద్రపుటలలచే దానియొప్పుననుండు భూప్రదేశమురంజుగలుగువిశ్లేషమును అట్టిప్రదేశమునకు బోయి చూచినవారు ప్రత్యక్షముగా చూచియుందురు. (31వ పటము చూడు)



31-వ పటము.

‘జలాపాతము’ (Water Fall) లలో నీరు ఎత్తుప్రదేశము నుండి క్రిందపడునపు డాప్రదేశమునందు విశ్లేషము గలుగునని చెప్పనక్కరలేదు. జలమునకు అష్టజనిపత పాషాణములందలి కొన్ని పదార్థములతో రసాయనసంయోగమునొంది క్రొత్తపదార్థములను పుట్టించి వానిని శిథిలముచేయు శక్తిగూడగలదు. విశ్లేషితపదార్థములను మిట్టప్రదేశములనుండి పల్లపుప్రదేశములలోని కీడ్చుకొనిపోవునది ముఖ్యముగా వర్షపునీరేయని యిదివరలోనే వ్రాయబడెను.

జలమిట్లు ద్రవరూపముననేగాక శీతలప్రదేశములందు ఘన రూపమున గూడ శిలావిశ్లేషమును గలిగించుచున్నది. సీరుగడ్డ కట్టునప్పుడు దాని 'ఆయతనము' (Volume) వృద్ధిపొందునని రెండవ యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. శీతలప్రదేశములలో సీరు శిలాప్రదేశమందలి పగుళ్లలోను గుంటలలోను చేరినపుడు శీతలము హెచ్చేనేని యదిగడ్డకట్టి విజృంభించును. ఈవిజృంభణ మువలన తుపాకిమందుపెట్టి కాల్చినట్లు ఆశిలాప్రదేశము కొంత పగులును. ఇదిగాక పర్వతములపై పేరినమంచు విస్తారము కూడుకొని యచట నిల్వలేక అప్పుడప్పుడు క్రిందికి దిగజారును. ఇట్లు కొండలంతేసిమంచుముద్దలు (Avalanches) పర్వతములపై నుండి దిగజారునపుడు ఆపర్వతముల ప్రక్కలందు రాళ్లపై రాచు కొనుట చేతను ఆరాళ్లనొకదానిపై నొకదానిని రాచుటచేతను వానియం దరుగుదల గలుగును. ఇట్లరుగుటవలన నేర్పడిన పదార్థములు మంచుకొండతో క్రిందికిపోయి అదికరగినపుడు ఆనీటితో మరికొంతదూరము కొట్టుకొనిపోవును.

శీతోష్ణములుగూడ శిలావిశ్లేషమునకు కారణములుగా నున్నవి. మనమేదేని యద్దపుపెంకును దెచ్చి చురుకుగా వెచ్చ జేసినయెడల నది చిట్టి తుత్తునియలగును. దీపము మీద నుంచ బడు కాలిన ధూమనాళిక (Chimney) పై నీటి తుంపరలుపడిన గాని, చలిగాలి సోకినగాని అదివెంటనే పగిలిపోవును. ఇట్లే శిలాప్రదేశము సూర్యుని యుష్ణతవలన కొంతవరకు శిథిల

మగును. శిలాప్రదేశము ఎండచే కాలియున్నపుడు వర్షముగురిసిన గాని చలిగాలి వీచినయెడలగాని మరింతశీఘ్రముగా పగులును. ఈ పగులుటకు కారణము వివిధస్వభావములుగల శిలారేణువులలో కొన్ని మరికొన్నిటికంటె శీఘ్రముగ సంకోచము నొందుటయే. చల్లగానున్న శిలాప్రదేశమున కుష్ణత తగిలినపుడుగూడ నందలి రేణువులన్నియు సమానముగా వ్యాకోచమునొందక పోవుటచే కొంత విశ్లేషము గలుగును. ఉష్ణత పదార్థములందు గలుగు రసాయన సంయోగ వియోగములకు దోడ్పడుటచే గూడ శిలావిశ్లేషమునకు గారణమగుచున్నది.

చెట్లయొక్క వేళ్లు గోడలలో ప్రవేశించి క్రమక్రమముగా విజృంభించి వానినిశిథిలముచేయుట మన మక్కడక్కడ చూచుచున్నాము. ఇట్లే షర్వతములపై నెచటనైన గొంతమన్నునిల్చినేని యచట విత్తనములెట్లో పడి మొక్కలుమొలచి వేళ్లను నాటుకొని యీ వేళ్లపైనుండు రోమములచే విడువబడు అష్టరసముల ద్రావణశక్తిచేతను, అవి సందులలోచేరి విజృంభించుట చేతను కొంతవిశ్లేషము గలుగుచున్నది. ఇట్లుపెరుగు చెట్ల యాకులు రాలి క్రుళ్లుటవలన నేర్పడిన సేంద్రియపదార్థములు గూడ శిలాప్రదేశమునందలి పదార్థములతో రసాయన సంయోగము నొందుటవలన దానిని కొంతవరకు మెత్తబరచగలవు.

పైనివ్రాయబడిన ముఖ్య స్వాభావిక కారణములచేతనే శిలావిశ్లేషము గలిగి నేల లేర్పడుచున్నది. నేలయం దెల్లప్పుడును గలుగుచుండు మార్పులకును నవియే ముఖ్య కారణములు. అవి

గాక నేలయందు గలుగు మార్పులకు అందలి క్రిమికీటకాడులును, కొన్ని నూత్నజీవులు (Bacteria) ను గూడ సాహాయ్యపడుచున్నవి. ఈవిషయమును గురించి రాబోవు సభ్యాయములలో కొంత వ్రాయబడును.

నేల యన్నిప్రదేశములందును నొకేవిధముగా నుండదు. కొన్నిచోట్ల నెర్రగను, కొన్నిచోట్ల నల్లగను ఉండును. కొన్నిచోట్ల జిగురుగను కొన్నిచోట్ల గుల్లగను ఉండును. ఇట్లు నేల భిన్నభిన్నధర్మముల గలిగియుండుటకు దానిపుట్టుకకు మూలమగు పాషాణస్వభావములందలి భేదములే ముఖ్యకారణము. కావున వ్యవసాయదారు డాయానేలలస్వభావమును బాగుగ గ్రహించుటకు పాషాణభేదములను గురించియు వాని సంఘటనము (Composition)ను గురించియు కొంత తెలిసికొనవలెను.

భూతలమునందలి పాషాణములు (Rocks) అన్నియు 'ఖనిజములు' (Minerals) అనబడు పదార్థములయొక్క సముదాయములు. నియత సంఘటనమును (Definite Composition) సామాన్యముగా 'నియతాకారమును' (Definite Geometrical shape) గల స్ఫటికములు (Crystals) గా పాషాణములందు ప్రత్యేకముగా నుండు నిరిండియ పదార్థముల (In-organic bodies) కు ఖనిజములని పేరు. ఖనిజములు మూల ద్రవ్యములయినను కావచ్చును. లేకరెండుగాని రెంటితక్కువగాని మూలద్రవ్యముల రసాయన మిశ్రేణములయినవియు యుండవచ్చును. బంగారమును, గంధకమును ఖనిజరూప


ముగా సంభవించు మూలద్రవ్యముల కుదాహరణములు. రసాయన మిశ్రేణములగు ఖనిజములు సాధారణముగా అవ్వజనిదములుగాని, శైలితములు, గంధకీతములు, గంధకీదములు, హరిదములు మొదలగు లవణములుగాని యయియుండును. కొన్ని ముఖ్య ఖనిజములపేళ్లును వాని సంఘట్టనమును ముందువ్రాయబడును.

సృష్టియందలి రమారమి యెనుబది మూలద్రవ్యములలోను సామాన్యముగా ఖనిజములం దుండునవి సుమారు పదియారు మాత్రమే. ఈపదియారును గలిసి భూమియొక్క ఉపరిభాగమునందు నూటిలో ఇంచుమించు 99 పాళ్లున్నవని శాస్త్రజ్ఞులు లెక్కవేసిరి. అందు—

ఉపధాతువులు	ధాతువులు
అవ్వజని రమారమి 50 పాళ్లు	స్ఫటము రమారమి 10 పాళ్లు
శైలము ,, 25 ,,	ఖటికము ,, 4. 5. ,,
కర్బనము	మగ్నము ,, 3. 5. ,,
గంధకము	సోడియము } ,, 3. 6. ,,
ఉదజని ,, 2 ,,	పొటాసియము }
హరినము	లోహము
స్ఫురము	మాంగనము } ,, 0. 4. ,,
వత్తజని	భారము }
77 పాళ్లు	22.0 పాళ్లు

తక్కినవన్నియు గలిసి యొకపాలుండును.

ముఖ్యముగా పైపదియారు మూలద్రవ్యములచే నిర్మితము లగునట్టియు చెన్నపురి రాజాధానియందలి పాపాణములందు సామాన్యముగా సంభవించునట్టియు కొన్ని ఖనిజముల పేళ్లను వాని సంఘటనమును యీక్రింద వివరించెదము.



32-వ పటము.

(శి లా స్ఫ టి క ము.)

1. స్ఫటికము (Quartz):— ఇది శైలావ్లజనిదము ($\text{శై ల}_2 = \text{SiO}_2$). ఇసుకముఖ్యముగా స్ఫటికపురేణువుల సముదాయమే. స్వచ్ఛముగా స్ఫటికము కొన్ని నదులయందు ఇసుకరూపమునను

కొన్ని పాషాణములందు శిలాస్ఫటికములు (Rock crystals) అనుపేరుగల ఆరుకోణముల పట్టకములు గాను లభించుచున్నది. కొన్ని కొన్ని విలువగల రాళ్లుగూడ నితరపదార్థములు గలియుట వలన మనోహరవర్ణముగలిగిన స్ఫటికపురాళ్లే యయియున్నవి.

2. భూస్ఫటికము (Felspar):—ఈ ఖనిజము ముఖ్యముగా స్ఫటము యొక్కయు, పొటాసియము, సోడియము, ఖటికము, పీనిలో నెకటి రెంటి యొక్కయు మిశ్రమ శైలితము (Double silicate). పొటాసియము మాత్రమేగల భూస్ఫటికమునకు పొటాష్ భూస్ఫటికము (K_2O , Al_2O_3 , 6 SiO_2) అనియు, సోడియము మాత్రమే గల భూస్ఫటికమునకు సోడా భూస్ఫటికము (Na_2O , Al_2O_3 , 6 SiO_2) అనియు పేర్లు. సామాన్యముగా నొక విధమగు తెలుపురంగుగలిగి యుండునట్టి యీ భూస్ఫటికపు రేణువులను మనము కొన్ని రాళ్లయందు స్పష్టముగా జూడగలము.

3. అభ్రకము (Mica):—ఇది ఊరములు, లోహము మగ్గుము, స్ఫటము, పీనిమిశ్రమ శైలితము. ఊరములెక్కువగా నున్న యెడల నది తెల్లగానుండును. దీనికి శ్వేతాభ్రక మనిపేరు. మగ్గు మెక్కువగ నున్న యెడల నదినల్లగనుండును. దీనికి కృష్ణాభ్రక మనిపేరు. అభ్రకమునకు పారదర్శకము (Transparent) గా నుండు రేఖలుగా విడిపోవు స్వభావముగలదు. కాకిబంగార మని పిల్లలాడుకొనున దీ యభ్రకమే.

4. శృంగతేజము (Hornblende):—ఇది స్ఫటామ్లజనిదమును లోహామ్లజనిదమును నెక్కువగాగల మగ్నము, లోహము, ఖటికము వీని మిశ్రమ శైలితము. ఇది సాధారణముగా నలుపురంగును గాని కొంచె మాకుపచ్చనతో గూడిన నలుపువర్ణమును గాని గలిగియుండును. ఇది యొకవిధమగు నల్లని కొమ్ముయొక్క పరమును పోలియుండుటచే శృంగతేజ మను పేరు పెట్టబడెను.

5. స్కాంతాయితము (Magnetite):—ఇది లోహపర్యమ్లజనిదము*=(లో₃ అ₄ Iron Peroxide F_3O_4). దీనిని సామాన్యముగా నూదంటురాయియందురు. రక్తాయితము (Hematite) అనునది లోహికామ్లజనిదము. (లో₂ అ₃ $=F_2O_3$) ఎర్రగానుండుటచే దీని కీ పేరుగలిగెను. లిమ్నాయితము (Limonite) అనునది జలముతో గూడిన లోహికామ్లజనిదము (2లో₂ అ₃, 3ఉ₂ అ₃ $=2Fe_2O_3, 3H_2O$). ఇది యొకవిధమగు పసుపుపచ్చనివర్ణము గలిగియుండును.

6. ఖటికాయితము (Caleite):— ఇది ఖటికకర్బనితము ఖళి₃ అ₃ $=CaCO_3$. సీమసున్నముయొక్క పరిణామరూపము.

7. మోహాయితము (Apatite):— ఇది కొంత ఖటిక హృదిదముతోను, ఖటికప్లోగిదము (ఖప్లో₂ $=CaF_2$) తోను కూడిన

* మూడులోహపు షరమాణువులును నాలుగుఆమ్లజని షరమాణువులును గలిసియేర్పడిన లోహామ్లజనిదము. లోహికామ్లజనిదపు ఆణువునందుకంటే దీనిలో నెక్కువ ఆమ్లజని షరమాణువులుండుటచే నిది షర్యమ్లజనిదము అనిపించుచున్నది.

ఖటికస్ఫురితము. నెమలి యీకవలె భృమింపజేయు వర్ణము గలిగి యుండుటచే దీని కీపేరుపెట్టబడెను.

8. పలాశాయినము (Olivine):—ఇది మగ్నలోహశైలి తము (మ అ, లో అ, శైలి MgO , FeO , SiO_2). ఒకవిధమగు నాకుపచ్చనిరంగు (పలాశవర్ణము) ను గలిగియుండుటచే దీని కీ పేరుగలిగెను.

9. మృత్తిక (Clay) ఇది స్ఫటశైలితము ($\text{Al}_2(\text{SiO}_2)_3$). మృత్తిక సామాన్యముగా భూస్ఫటికముల విశ్లేషము వలన నేర్పడు చున్నను కొన్నిచోట్ల స్వభావసిద్ధ మయిన ఖనిజ ముగ్గుడ లభించుచున్నది.

పాషాణము లన్నియు పైని పేర్కొనబడిన ఖనిజముల లో నేవో కొన్నిటి సముదాయములై యున్నవి. చెన్నపురి రాజధానిలోని కొన్ని ముఖ్యపాషాణ జాతులపేర్లును వాని విశ్లేషమువలన నేర్పడు నేలలును యీక్రింద వివరింపబడును.

1. కణశిల (Granite):—ఇది ముఖ్యముగా స్ఫటికము పోటాష్ భూస్ఫటికము, అధికము, యీమూడు ఖనిజముల యొక్క సముదాయమై యున్నది. కణశిల సామాన్యముగా పాటలవర్ణము (Light red colour) ను గాని పాంశువర్ణము (Grey colour) ను గాని గలిగియుండును. చెన్నపురి రాజధాని యందలికణశిల సాధారణముగా నొకవిధ మగు పరిణామము నొంది పొరలు పొరలుగా సంభవించుచున్నది. ఇట్లు పొరలు పొరలుగానుండు (stratified) కణశిలయొక్క రూపాంతర

మునకు “నైసశిల” (Gniess) అనిపేరు. ఎర్రనేలలు ముఖ్యముగా నైసశిలావిశ్లేషమువలన పుట్టుచున్నవి. అవి ఫలదతయందు మధ్యమములు. ఎర్రనేలలు చెన్నపురి రాజధానిలో కొంచె మించుమించుగా నన్ని జిల్లాలలోను గలవు.

2. బెసాల్ట్ శిల (Basalt):—ఈజాతిశిల ఖటికమును సోడియమును గల భూస్ఫటికము, శృంగ తేజము, స్కాంతాయిలము, వీనికూడికవలన నేర్పడినది. ఈ శిలయందు అక్కడక్కడ పలాశాయిసపు కణములుగూడ యుండుట గలదు. కడప పలక రాళ్లు బెసాల్ట్ శిలాసంబంధము లై యున్నవి. బెసాల్ టు శిలాపర్వతములు చెన్నపురి రాజధానియందరుదు. అయినను వీనివిశ్లేషమువలన నేర్పడినది చెప్పబడు రేవడినేలలు కొన్నికొన్ని జిల్లాలలో విశేషముగా గలవు. అందు కడప కర్నూలు బళ్లారిజిల్లాలు ముఖ్యములు. కోయంబత్తూరు తిరుచనాపల్లి తిర్నల్వేలి జిల్లాలలోగూడ నిట్టినేల లక్కడక్కడ గలవు. ఈ నేలలకు, మృదువు గను నల్లగను ఉండుటయు తడిసినపుడు జిగటగనుండుటయు ముఖ్యధర్మములు. చెట్లుచేమ లంతగాలేక ఫలదత(Fertility)యందు మధ్యమముగా నుండును. ఇట్టి నేలలు బెసాల్ టు పర్వతములు లేనిచోట్లను వాని కతిదూరమునను ఉండుటచేత భూగర్భశాస్త్రజ్ఞు లవి యాజాతిశిలనుండి పుట్టిన వని నిశ్చయముగా చెప్పజాలకున్నారు. రాజమహేంద్రవరము సమీపమున మాత్రము కొన్నిచోట్ల నీ పాపాణము లున్నట్టు తెలియవచ్చుచున్నది.

3. వాలుకాశిల లేక ఇసుకరాయి (Sand stone):—
 వాలుకాశిలలు మృత్తిక సున్నము శైలము మొదలగు సంశ్లేష
 కర్తలవలన బంధింపబడుటచే శిలారూపమును దాల్చిన యిసుక
 రేణుసముదాయములు. వీని విశ్లేషమువలన పుట్టిన నేలలు
 “ఇసుక నేలలు” (Sandy soils). వాలుకాశిలయందు కొంచె
 మినుము కలిసియున్న యెడల దానికి కొంచె మెర్రనిరంగు కలు
 గును. అట్టిపాపాణములనుండి పుట్టిన నేలలు యెర్ర నేలలను
 పోలియుండును. కాని వానికంటె సారహీనములు. ఇట్టి నేలలు
 తూర్పుసముద్రతీరమున కాకినాడ మొదలు కాలిమిరు అగ్రము
 (Point Calimere) వరకును విశేషముగా గలవు.

4. ఇష్ట కాశిల (Laterite):—ఇది మృత్తికచే బంధింప
 బడినట్టియు రమారమి సగముభాగమువరకు లోహికామ్లజని
 దము గలిగియుండునట్టియు నొకవిధమగు వాలుకాశిల. ఇట్టిక
 వర్ణమును గలిగియుండుటచే దీని కీపేరుగలిగెను. కంకర నేల
 లీజాతి పాపాణములనుండి యేర్పడినవి. అవి చెంగల్పట్టు నెల్లూరు
 నీలగిరిజిల్లాలలో విశేషముగా గలవు.

5. ఖటికశిల లేక సున్నపురాయి (Lime stone):—
 ఇది సామాన్యముగా కొన్ని మాలిన్యపదార్థముల (Impurities)
 తో కూడిన ఖటికాయితము. దీనినే సున్నపురాయి యందురు.
 దీనినుండి పుట్టిన నేలలు ‘సున్నపునేలలు.’ (Calcareous soils)
 అనబడును. ఇట్టి నేలలు చెన్నపురి రాజధానియందరుదు.

కోయంబస్తూరుజిల్లాలో కొన్ని చోట్లదక్క తక్కినజిల్లాలలో సంతగా కానరావు.

పైని నైసికశిలనుండి యెర్ర నేలలును బెసాల్ టు శిలనుండి. రేవడి నేలలను వాలుకాశిలనుండి యిసుక నేలలును, ఇసుకాశిలనుండి కంకర నేలలును, ఖటికశిలనుండి సున్నపు నేలలును పుట్టునని వ్రాయబడెను. మనరాజధాని లోనివిగాక 'వండలి నేలలు' అనబడు మరియొకవిధ మగు నేలలుగూడ విశేషముగా గలవు. అవి పైని పేర్కొనబడినవానివలె నేదో యొకజాతి పాషాణములనుండిగాక పలువిధము లగు వానినుండి విశ్లేషితపదార్థములు జలప్రవాహములచే నొకచోట జేర్పబడుటచే నేర్పడినవి. వండలి నేలలు (Alluvial soils) సాధారణముగా నదులసాగరసంగమ స్థానములకు సమీపమున నేర్పడు చుండును. కృష్ణా గోదావరి కావేరీ మొదలగునదుల 'డెల్టాల' లో నీ నేలలు మొందుగా గలవు. ఇవి పలువిధము లగు శిలలనుండి పుట్టుటచే సామాన్యముగా తక్కినవానికంటె సారవంతములు. వీనియందు వృక్షకోటికి కావలయు నాహారద్రవ్యము లన్నియు తగినంతయుండును.

నేలలవర్గీకరణము (Classification of Soils)

నేలలకు వాని పుట్టుకనుబట్టియు, ఉనికినిబట్టియు, భౌతిక రసాయన ధర్మములనుబట్టియు వివిధము లగు పేళ్లు గలుగుచున్నవి. పుట్టుకనుబట్టి చెన్నపురి రాజధానియందలి నేలలు పైని యారు విధములుగ విభాగింపబడెను.

ఉనికినిబట్టి నేలలు జన్మస్థానికములు (Sedentary soils) అపసీతములు (Transported soils) అని ద్వివిధము. విశ్లేషిత పదార్థములు పుట్టినచోటనే కూడుకొనుటచే నేర్పడిన నేలలు జన్మస్థానికములు. ఎర్రనేలలు సాధారణముగా నిట్టివై యుండును. విశ్లేషితపదార్థములు పుట్టుచోట్లు సామాన్యముగా నేటవాలుగా నుండుటచేత నాపదార్థము లెచటనైనను విశేషముగా కూడుకొనుట దుర్లభము. కాన ఇట్టి నేలలు లోతుగ నుండవు. విశ్లేషితపదార్థము లేవిధములుగ గాని పుట్టినచోటినుండి మరియొక స్థలమునకుబోయి కూడుకొనుటచే నేర్పడిన నేలలు అపసీతములు. విశ్లేషితపదార్థములు జన్మస్థానమునుండి యితరచోట్లకు పోవుటకు జలప్రవాహములును వాయువును ముఖ్యకారణములు. ఈ కారణభేదములను బట్టి అపసీతములు, వాతాపసీతములు (Drift soils) జలాపసీతములు (Alluvial soils) అని ద్వివిధము. గాలికి ఎగిరిపోవు బొండు ఇసుకనేలలు వాతాపసీతములు. ఇట్టి నేలలు సామాన్యముగా సముద్రపు తీరమున నుండును. గుంటూరుజిల్లాలో బాపట్ల తాలుకాలో నిట్టివి విశేషముగా గలవు. వాతాపసీతములు సాధారణముగా వాలుకా శిలలనుండి పుట్టినవగుటచే సారహీనములై యుండును. పలువిధములగు పాషాణములనుండి పుట్టిన వని యిదివరలో వ్రాయబడిన వండలి నేలల జలాపసీతములు. ఇట్టి నేలలు సామాన్యముగా లోతుగా నుండును.

‘కోడె యడుగులో కోటివర్ణాలు భూమి’ యనునట్లు నేల యం దడుగడుగునకును వర్ణభేదము లుండును. అయినను సామాన్యముగా నేలలు రంగునుబట్టి ఎర్రనేలలు, (Red soils) నల్లనేలలు, (Black soils) బూడిదరంగునేలలు, (Grey soils) కపిలవర్ణపునేలలు (Brown soils) తేలిక వర్ణపునేలలు (Light coloured soils) అని లుట్లు విభజింప బడుచున్నవి. నైసికశిల నుండి పుట్టునేలలు యెర్రనేలలని యిదివరలో వ్రాయబడెను. నల్ల నేలలలో ముఖ్యమైనవి రేవడినేలలు. రేవడినేలలు అచ్చరేవడి లేక, కృష్ణరేవడి, చాడురేవడి అని ద్వివిధము. వేసవికాలములో పైని చాడురుకు రేవడి చాడురేవడి. శక్తినిది అచ్చరేవడి. మిగులప్రాచీనములగు గ్రామకంఠములయందలి పాటినేలలును, గుంటూరుజిల్లాలో కనిగిరి తాలుకాలో కొన్ని చోట్లగల (అభృత మెక్కువగా నుండుటచేత. బూడిదరంగును గలిగియుండు) ‘కాకి బుసుగ’ నేలలును (Micaceous soils) బూడిదరంగునేలలు. కపిలవర్ణపు నేలలలో వండలినేలలు ముఖ్యములు. తేలిక వర్ణపు నేలలకు ఇసుకనేల లుదాహరణములు.

నేలలు అందలి మంటిరేణువుల పరిమాణమునుబట్టి యిసుక నేలలు, (Sandy soils) గరుపనేలలు, (Loamy soils) బంక నేలలు (Clayey soils) అని త్రివిధము. మంటిరేణువులువాని పరిమాణమునుబట్టి ఈక్రిందివిధముగ విభాగింపబడుచున్నవి:—

$\frac{1}{5000}$ అం. కంటే తక్కువ మధ్యకొల్తగల రేణువులు.
బంకమన్ను (Clay)

$\frac{1}{5000}$ మొ. $\frac{1}{250}$ అం. వరకు ,, వండలి (Silt)

$\frac{1}{250}$ మొ. $\frac{1}{25}$ అం. ,, ,, ఇసుక (Sand)

$\frac{1}{25}$ మొ. $\frac{2}{5}$ అం. ,, ,, కంకర (Gravel)

$\frac{2}{5}$ అం. కంటే నెక్కువ మధ్యకొల్తగల రేణువు లన్నియు
రాళ్లు (Stones) అనబడును.

బంకమన్నును వండలియు గలిసి మూటిలో రెండుపాళ్ళ కెక్కువగా నున్నయెడల నట్టినేలలు బంకనేల అనబడును. అవి రెంటికీ తక్కువగను, ఒకటికీ యెక్కువగను ఉన్నయెడల నట్టి నేలలు గరుపనేలలు అనబడును. అవి రెండును మూటిలో నొకపాలుకంటే తక్కువగానుండు నేలలు ఇసుకనేలలు. బంకనేలలకును గరుపనేలలకును మధ్యస్థముగ నుండునేలలకు బంకగరుములు (Clay loams) అనియు ఇసుకనేలలకును గరుపనేలలకును మధ్యస్థముగ నుండునేలకు ఇసుకగరుములు (Sandy loams) అనియుగూడ పేళ్లుగలవు.

రసాయన సంఘట్టనమునుబట్టిగూడ నేలలకు పలువిధము లగు పేళ్లు గలుగుచున్నవి. రసాయన పృథక్కరణమునందు నేల లందలి ద్రవ్యములు ఈక్రిందివిధముగ విభజింపబడుచున్నవి.

1. సేంద్రియపదార్థము, మిశ్రమజలము (Organic matter and combined water)

2. ఇసుక, మరికొన్ని అదృష్టవశాత్తూ లగు క్షైలితములు
(Sand and other Insoluble Silicates)

- 3 లోహికామలజనిదము ($\text{లో}_2\text{అ}_3 = \text{Fe}_2\text{O}_3$)
- 4 స్ఫటామలజనిదము ($\text{స్ఫ}_2\text{అ}_3 = \text{Al}_2\text{O}_3$)
- 5 మాంగనామలజనిదము ($\text{మా}_2\text{అ}_2 = \text{MnO}_2$)
- 6 ఖటికామలజనిదము ($\text{ఖ అ} = \text{CaO}$)
- 7 మగ్నామలజనిదము ($\text{మ అ} = \text{MgO}$)
- 8 పొటాష్ ($\text{పొ}_2\text{అ} = \text{K}_2\text{O}$)
- 9 సోడా ($\text{సా}_2\text{అ} = \text{Na}_2\text{O}$)
- 10 స్ఫురత్పూర్వామలజనిదము ($\text{స్ఫ}_2\text{అ}_5 = \text{P}_2\text{O}_5$)
- 11 గంధకత్యజమలజనిదము ($\text{గ అ}_3 = \text{S}_2\text{O}_3$)
- 12 కర్బనద్యజమలజనిదము ($\text{క అ}_2 = \text{CO}_2$)

నేలయందలి నత్రజనిసంబంధమైన పదార్థములు మొదటి భాగము (నేంద్రియపదార్థము, మిశ్రమజలము) లో జేరియుండును. నత్రజని సస్యములకు మిగుల విలువగల దగుటచే పృథ క్కరణమునందు దానిపరిమితి వేరుగ నిర్ణయింపబడుచుండును.

చదువరులు నేలయందలి ఘటకావయవములు (Constituents) పైని చెప్పిన రూపమున నేయుండునని యూహింతురేమో! అట్లుగాదు. అందలి మూలద్రవ్యములు పలువిధము లగు లవణములు మొదలగు రసాయన మిశ్రణములుగా నుండును. నేలయం దేయేమూలద్రవ్యము లేయే రూపమున యెంతెంతకలవో నిర్ణయ

యించుట కష్టమగుటచేతను, అట్లునిర్ణయించుట నేలయొక్క సారమును కనిపెట్టుటకు అత్యావశ్యకము కాకపోవుటచేతను రసాయనశాస్త్రజ్ఞులు ఆయా మూలద్రవ్యములు ఆమ్లజనిత రూపమున నుండునెడల నెంతంత యుండునో లెక్కవేసి వ్రాయుదురు. దీనినిబట్టి మనము నేలయం దుద్భిజ్యములకు గావలయు మూలద్రవ్యములలో నేదేదిలోటుగానున్నదో నేదేది సరిపడునంతయున్నదో తెలిసికొన గలుగుదుము.

రసాయన వర్గీకరణమునందు నేలలకుపైని చెప్పబడిన ఘటకావయవములలో నేది సామాన్యముగా నుండుదానికంటె నెక్కువగానుండునో దానినిబట్టి వివిధనామములు గలుగుచున్నవి. సేంద్రియపదార్థమును మిశ్రమజలమును తూనికకు నూటికి 5 పాళ్లకంటె నెక్కువగా నున్నయెడల నట్టినేలలు తోటనేలలనబడును. తోటల కనుకూలముగ నుండుటచే వీని కాపేరు గలిగెను. సేంద్రియపదార్థమును మిశ్రమజలమును నూటికిరువదిపాళ్లకంటె నెక్కువగా నున్నయెడల నట్టినేలలు పీటినేలలు (Peaty soils) అనబడును. ఖటికామ్లజనిత మెక్కువగాగల నేలలకు ఖటికభూము అనియు, (Calcareous soils) గంధకత్ర్యమ్లజనిత మెక్కువగాగల నేలలకు గంధకపునేలలు (Sulphatic soils), స్ఫురత్పంచామ్లజనిత మెక్కువగాగల నేలలకు స్ఫురపునేలలు (Phosphatic soils), లోహికామ్లజనిత మెక్కువగాగల నేలలకు లోహపునేలలు (Ferruginous soils) అనియు ఇట్లు

ఆయా ఘటకావయవము లెక్కువగాగల నేలల కాయాపేళ్లు గలుగుచున్నవి.

నేల లిట్లు పుట్టుక ఉనికి, రంగు, మంటి యణువుల పరిమాణము, రసాయన సంఘటనము వీనినిబట్టి వర్గీకరణము చేయబడుటయేగాక మరికొన్ని విషయములనుబట్టికూడ బాడువ నేలలు, ఇవక నేలలు, బొగ్గరపునేలలు, తేలిక నేలలు, బరువు నేలలు అని పలువిధములుగా పిలువబడుచున్నవి. బాడువనేల లనగా పల్లపునేలలు. ఇవక నేల లనగా ఎప్పుడును తేమగానుండు నేలలు. బొగ్గరపు నేల లనగా అం దే మాత్రము నీరు తక్కువయినను మొక్కలు వాడిపోవుటచే నీటిని విస్తారము గోరు నేలలు. తేలిక నేల లనగా దున్నుటకు సుళువుగానుండు ఇసుక నేలలు మొదలగునవి. బరువునేల లనగా దున్నుటకు కష్టముగా నుండు బంక నేలలు. తేలిక బరువు అను నపుడు అందలి 'తేలిక, 'బరువు' అనుశబ్దములకు సూచకయందు తేలిక, బరువు అని యర్థముకాదు. దున్నునపుడు పశువులకు గలుగు కష్టము నందు తేలిక బరువు అని మాత్రమే యర్థము. తూనికయందు బంక నేలల కంటె యిసుక నేలలే బరువుగా నుండును.

పైరుచేయబడు ముఖ్యసస్యములను బట్టి గూడ నేలలు జొన్న నేలలు గోధుమ నేలలు కాఫీ నేలలు అని యిట్లు వివిధములుగ పిలువబడుచున్నవి.

నేలల పృథక్కరణము (Analysis of soils)

నేలలయొక్క మంచి చెడ్డలు వాని భౌతికరసాయనధర్మముల ననుసరించి యుండును. భౌతికధర్మములు ముఖ్యముగా నందలి మంటిరేణువుల పరిమాణమునుబట్టి యుండును. కావున వ్యవసాయదారుడు తననేలయొక్క భౌతికస్వభావమును దెలిసికొనుటకు అందలి బంకమన్ను ఇసుక మొదలగు భౌతిక ఘటకావయవములు (Physical constituents) ఎన్నెన్ని పాళ్లు గలవో అనగా తననేల పైనిచెప్పిన బంకనేల, గరుపనేల మొదలగు తరగతులలో దేనిలో చేరునో నిర్ణయించుట యావశ్యకము. నేలయందలి భౌతిక ఘటకావయవములను విడదీసి యే దెన్ని పాళ్లున్నదో తెలిసికొనుట భౌతిక పృథక్కరణము (Mechanical Analysis) అనబడును.

నేలయొక్క రసాయనధర్మములను అనగా సస్యములకు కావలసిన యాహారపదార్థముల లోపాలోపము లనుగ్రహించుటకు అందుపైని వ్రాయబడిన 12 రసాయన ఘటకావయవముల (Chemical constituents) లో ఏదెన్ని పాళ్లున్నదో తెలిసికొనుట యావశ్యకము. నేలయందలి రసాయన ఘటకావయవముల పరిమాణమును తెలిసికొనుటయే రసాయన పృథక్కరణము (Chemical Analysis) అనబడును.

భౌతికపృథక్కరణముగాని రసాయన పృథక్కరణముగాని సామాన్య వ్యవసాయదారులు చేసికొనదగినవిగావు. వానికి

తగిన యుపకరణములను సంపాదించుట సామాన్య కళకళము. సామాన్యముగా తగిన యనుభవ మున్నయెడల నేల బంక నేలయో గరుపనేలయో ఇసుకనేలయో కంటితో పరీక్షించి చెప్పవచ్చును. కాన భౌతిక పృథక్కరణ మనుభవజ్ఞుల కంత యవసరములేదు. నేలయందలి యాహారపదార్థముల లోపాలోపములు కంటితో పరీక్షించి నంతమాత్రమున చెలియవు. అందుకు రసాయన పృథక్కరణమే సాధనము.

నేలల రసాయన పృథక్కరణమునకు తగిన ప్రయోగశాలలు (Laboratories) మనదేశమున విస్తారముగా లేవు. మరియు అది మిగుల వ్యయకర మగుటచే సామిచ్చి తమనేలలను పృథక్కరణము చేయించుకొను నంతటిశక్తి కృషీవలులలో ననేకుల కుండిదు. కావున రసాయన పృథక్కరణము సామాన్య వ్యవసాయదారులకు సులభసాధ్యము కాదు. అయినను వ్యవసాయాభివృద్ధి మార్గములను వెదకుటయందు తగినంత శ్రద్ధ జూపువారు దొరతనపువారిచే కోయంబత్తూరునందు స్థాపింపబడిన వ్యవసాయాన్వేషణశాల (Agricultural Research Institute) కు మచ్చులను బంపినచో వాని నచటి కర్షకరసాయనశాస్త్రజ్ఞుడు (Agricultural Chemist) పృథక్కరణము చేసి పర్యవసానమును తెలుపును. మచ్చుదీయు విధాన మీక్రింద వివరింపబడును.

మనము పృథక్కరణము చేయించదలచిన నేలయందు ఎకరమునకు 5, 6 చోట్ల 4 అంగుళముల చతురమును 8 అంగు

శముల లోతును గల మట్టిదిమ్మలను చుట్టును నరకి తీయవలెను. ఈదిమ్మల నన్నిటిని నలగగొట్టి యామంటిని బాగుగ కలిపి అందు సుమారు 10పౌను లొక చిన్న గోనెసంచిలోపోసి లోపల పంపువారిపేరును విలాసమును ఆమన్ను ఎచ్చటిదో మొదలగు విషయములును వ్రాసిన చీటి యొకటివేసి మూతి గట్టిగా కుట్టి రైలులో పంపవలెను. ఇది పైనేల యొక్క పృథక్ పృథక్ రణమునకు మచ్చుపంపుపద్ధతి.

క్రిందినేలయొక్క పృథక్ పృథక్ రణమునకు ఎకరమున 5, 6 చోట్ల పైనేలను అనగా 8 అం. లోతువరకు గల మంటినితీసి వేసి యీక్రింద 4 అంగుళముల చతురమును 8 అంగుళముల లోతును గల దిమ్మలను దీసి పైనివ్రాసినట్లే చేయవలెను. మంటి దిమ్మలను దీయుచోట్లు సాధ్యమయినంతవఱకు సమదూరముగా నుండవలెను.

చెన్నపురి రాజధానియందలి ఆయాజాతుల నేలలను వెనుక డాక్టరు లెదరు (Dr. Leather) గారు పృథక్ పృథక్ రిపోర్టు 1898 వ సంవత్సరమున వ్రాసియున్నారు. ఒక్కొక్కజాతిలోనే అనేకచోట్ల నేలలు పరీక్షింపబడినవి. వాని యందు ఈక్రింది పట్టిలో జూపబడిన ప్రకారము విశేషభేదములు గానవచ్చుచున్నవి.

చెన్నపురి రాజధానిలోని ముఖ్యజాతుల నేలల రసాయన సంఘటనము.

	కృష్ణ రేవడి నేలలు Black cotton soils	ఎర్ర నేలలు Red soils	వండలి నేలలు Alluvial soils	కాఫీ నేలలు Coffee soils	కంకర నేలలు Laterite soils.
నేల యొక్క పదార్థము. మిశ్రమజలము. Organic matter & combined water ఇసుక, అద్రాక్షణీయ శైలితములు. Sand and insoluble Silicates లోహికావజనితము (Fe_2O_3) స్పట్యూల్జనితము (Al_2O_3) మాంగన అవజనితము (MnO_2) ఖటికావజనితము (CaO) మగ్నీషియం అవజనితము (MgO) పొటాష్ (K_2O) సోడా (Na_2O) స్ఫురత్పంచావజనితము (P_2O_5) గంధకత్వశీలమైనది (S_3) కర్బునద్రవ్యమైనది (CO_2)	3.9-9.4* 62.5-78.5 4-11.5 6-14 1-26 1.0-7.7 2-2.5 15-1.14 0.1-0.7 19 లోపు అతిస్పృష్టము 14-8.58 0.12-0.48	% 24-7.4 80-90 3.5-10 1.5-15.8 0.7-2.0 1 లోపు 75 0.5-24 12-19 0.9-11 అతిస్పృష్టము 03-85 001-0.21	% 87-11.8 57-96 5-17 6-15 0.8-26 1 లోపు 2-1.8 0.5-43 0.6-2.42 0.8-4 అతిస్పృష్టము 03-16 008-105	% 11.8-15.9 56-60 9-12 17-20 0.7-0.9 3 5 14-29 0.8-0.8 0.5-20 అతిస్పృష్టము 03-10 0.48-1.70	% 1.8-9.01 అనిర్ణయము. 6.48 1-5-14 0.6-50 1 లోపు 8-7 0.9-40 0.4-82 3 లోపు అతిస్పృష్టము 0.5-28 0.10-0.89

* 8.9-9.4% అనగా నూటికి 8.9 పాళ్లు చెదలు 9.4 పాళ్లు అనియరము.

రసాయన పృథక్క-రణమునందు నేలయందలి ఆహారపదార్థముల మొత్తపు పరిమితియేగాక వానిలో నుద్భిజ్జములు తీసికొన దగినస్థితిలో (అనగా వానివేళ్లపై రోమములచే విడువబడు నమ్రసముతో గలిసిన నేలయందలి తేమలో కరగునట్టిస్థితిలో) నేది యెంతగలదోకూడ తెలిసికొనవచ్చును. ఆహారపదార్థము లలో మొక్కలు తీసికొన తగినస్థితిలోనున్న భాగమునకు సిద్ధాహారము (Available or active plant food) అనియు అట్లు గానిస్థితిలోనున్నవానికి సాధ్యాహారము (Dormant plant food) అనియు పేళ్లు.

నేల సామాన్యముగ అందు సస్యములను పైరుజేయుటకు తగియుండుటకు అధమము నూటికి రమారమి .03కి పాలు మొత్తము నత్రజనియు, .01కి పాలు మొక్కలు తీసికొనదగు స్ఫురత్పంచామ్రజనిదమును, అంతే పొటాష్, సుడొండ్లవలయును. మన రాజధానియందలి నేలలో, కాఫీనేలలను వదలివేసినయెడల తక్కినవానిలో నత్రజని మిగుల లోటుగా నున్నది. స్ఫురత్పంచామ్రజనిదమును తక్కువగానే యున్నది. కాని ఇతర దేశములందలి నేలలనుబట్టి చూచిన యెడల, ఉన్నదానిలో నెక్కువ భాగము 'సిద్ధము' గ నున్నది. పొటాష్ మొత్తపు పరిమితి యందు గాని సిద్ధభాగమునందుగాని అంతగా కొఱతగా నున్నట్లు గానబడదు. తక్కిన ఘటకావయవము లన్నియు తగినంత యున్నవి. సామాన్యముగా నేలలందు లోటు పడునవియు ఎరువుల రూపకముగా నేలకు జేర్చుచుండవలయువవియు మొదట పేర్కొనబడిన మూడు ఘటకావయవములే.

శేవడినేలలలో సామాన్యముగా పొటాష్ (పొ₂ అ)ను ఖటికాష్లుజనిదము (ఖ అ) ను తక్కినవానిలోకంటె నెక్కువగా నుండును. శేవడినేలలు నల్లగా నుండుటచే నందు సేంద్రియపదార్థము ఎక్కువగా నుండునని కొందరు తలచుచుండిరిగాని పృథక్కర్తరణమువలన నీనేలలలో సేంద్రియపదార్థము తక్కువగ నేయున్నట్లు తెలియుచున్నది. పైపట్టిలో సేంద్రియపదార్థము మిశ్రమజలము అని వ్రాయబడిన పరిమితిలో, విశేషభాగము మిశ్రమజలమే యయియున్నది.

ఎర్రనేలలో ఇసుకయు అద్రావణీయ శైలితములును ఎక్కువ. తక్కినవి సామాన్యముగా తక్కువ. కావున నీనేలలు అంత సారవంతమైనవిగావు. అయినను అక్కడక్కడ నిట్టినేలలలో గూడ కొన్ని సారవంతమయినవి గలవు. కర్నూలు జిల్లాలోని ఒక యెర్రనేలయొక్క పృథక్కర్తరణమును ఈక్రింద యుదాహరణముగా నిచ్చెదము.

సేంద్రియపదార్థము *	}	7. 40%	పొటాష్ (పొ ₂ అ)	0. 28%
మిశ్రమజలము				
ఇసుక అద్రావణీయ శైలితములు.	}	68. 60%	సోడా (సో ₂ అ)	0. 19%
లోహికాష్లుజనిదము (లో ₂ అ ₂)				
స్ఫటాష్లుజనిదము (స్ఫ ₂ అ ₃)		6. 82%	స్ఫురత్పంచాష్లుజనిదము.	
			[(స్ఫ ₂ అ ₅)	0. 06%
			గంధకత్ర్యష్లుజనిదము (గ అ ₃)	
			[అతిస్వల్పము.	
మాంగనాష్లుజనిదము (మా ₂ అ ₂)		0. 07%	కర్బవ ద్వ్యష్లుజనిదము (క అ ₂)	
ఖటికాష్లుజనిదము (ఖ అ)		0. 79%		[0. 20%
మగ్నాష్లుజనిదము (మ అ)		0. 80%		

* ఇందలి సత్రజని (న) 0. 0 51%.

వండలి నేలలు ఎర్ర నేలలకంటెను రేవడి నేలలకంటెను సామాన్యముగ సారవంతములు. పైపట్టిలో వ్రాయబడిన పృథ క్కరణము ఇసుకతో కూడిన వండలి నేలల పృథక్కరణము. కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలలోని వండలి నేలలు వానికంటె సారవం తములుగ నుండును.

కాఫీ నేలలు నీలగిరి మొదలగు శీతల ప్రదేశములలోనేగాని యితరచోట్ల లభింపవు. వానిలో సేంద్రియపదార్థము లెక్కువగ నుండును. కావున నవి సారవంతములు.

కంకర నేలలకును, ఎర్ర నేలలకును అంతగా భేదము లేదు. కొన్ని కంకర నేలలలో లోహికామ్లజనిదము విస్తారముగ నుండును.

నేలలయందు నత్రజని అందు ముఖ్యముగా ఆకులలములును, జంతుజాలముల క శేబరములును క్రుళ్లుటవలన నేర్పడిన సేంద్రియ మిశ్రణములుగను ఆ సేంద్రియ మిశ్రణములు మరికొన్ని మార్పు ల నొందుటచే నేర్పడిన నత్రాయితములుగను నత్రితములుగను ఉండును. స్ఫురత్పంచామ్లజనిదము ముఖ్యముగా పాషాణము లందలి మోహాయితముయొక్కయు జంతుజాలముల క శేబరము లందలి యెముకలు మొదలగువానియొక్కయు రసాయనవియో గమువలనగలిగిన స్ఫురితములు (Phosphates) గానుండును. పొటాష్ ముఖ్యముగా పాషాణము లందలి పొటాష్ భూ స్ఫటికముయొక్కవియోగమువలన నేర్పడి పొటాసియము

యొక్కయు స్ఫటముయొక్కయు మిశ్రమ ఉదజనశైలితము*
 (Hydrated Double Silicate of Potash and Alumina)
 గాగాని వాని ఉదజనహ్యుమితముగాగాని (Hydrated Double
 Humate of Potash and Alumina) గాగాని యుండును.
 ఇట్లే నేలయందు తక్కిన ఘటకావయవములును పాషాణము
 లందలి ఖనిజముల వియోగమువలన నేర్పడిన వివిధము లగు
 అవణములు మొదలగు పదార్థములుగా నుండును.

* జలముతోఁగూడిన శైలితములు.

ఆరవ యధ్యాయము



నేలల భౌతిక ధర్మములు


(PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS.)

నేలయొక్క వర్ణము (Colour) మృదుత్వము (Fineness) మొదలగు కొన్ని భౌతిక ధర్మములందలి భేదములను వెనుకటి యధ్యాయమున నూచించి యుంటిమి. ఆయాజాతుల నేలల భౌతిక ధర్మములందట్టి భేదము లింక ననేకములు గలవు. వానిని గురించి కృషీవలుడు కొంత తెలిసికొనినగాని, నేలను సస్యముల కనుకూలముగ జేయుటకు సాధనములను గ్రహింపజాలడు. కావున నీయధ్యాయమున నేలల ముఖ్యభౌతిక ధర్మములను గురించియు, ఉద్భిజ్జములకును వానికిని గల సంబంధములను గురించియు సంగ్రహముగ వ్రాయబడును.

నేల మంటి యణువుల రాశియని వెనుకటి యధ్యాయము నందు వ్రాయబడెను. నేలయొక్క ముఖ్యభౌతిక ధర్మములు అందలి రేణువుల పరిమాణమును, అవి యమర్పబడియుండు రీతిని, అనుసరించి యుండును.

మన మొక పెట్టెలో నారింజపండ్లను సర్దవలె నన్న రెండు విధములుగా నేర్దవచ్చును. నారింజపండ్లన్నియు గుండ్రనివియు నొకే పరిమాణముగలవియు అనుకొనుడు. వానిని కిక్కి-వ పటము

33 - వ పటము.



లో నెడమచేతివైపున (1లో) చూపబడిన విధమున సర్దిన యెడల నిలువు వరుసలలో నొకదానికేంద్రము * (Centre) మరియుకదాని కేంద్రముపైకి నూటిగా (లంబరూపముగా = Vertically) వచ్చును. కుడిచేతివైపున (2 లో) చూపబడినట్లు సర్దినయెడల వానికేంద్రము లొకదానిపై నొకటి లంబరూపముగ నుండును. పండ్లమధ్య సందులు మొదటిపీఠముగ సర్ది




* గోళముయొక్క మధ్యమునకు 'కేంద్రము' అని పేరు.

నప్పటికంటే చిన్నవిగ నుండును. రెండు విధములుగ సర్దినపెట్టెలును సమానపరిమాణము గలవియే యయిన యెడల మొదటి విధముగ సర్దిన దానిలోకంటే రెండవవిధముగ సర్దినదానిలో నెక్కువపండ్లు పట్టును. మొదటివిధముగ సర్దినయెడల, మధ్య సందుల మొత్తపు పరిమాణము పెట్టెయొక్క పరిమాణములో నూటికి 47. 64 పాళ్లుండునని నిర్ణయింపబడెను. రెండవ విధముగ సర్దినయెడల నూటికి 25.95 పాళ్లే యుండును. రెండవవిధముగ సర్దినపండ్ల మధ్యసందులలో సరిగా నిముడునట్లేవైన చిన్నచిన్నపండ్లను సర్దినయెడల నింకను మిగులు సందులమొత్తపు పరిమాణము పెట్టెయొక్క పరిమాణములో 6. 76 పాళ్లు మాత్రమే యుండునని నిర్ణయింపబడెను.

నేలయందును మంటిరేణువులు కొంచె మించుమించుగా గుండ్రముగనే యుండును. వాని మధ్య పైవిధముననే యవకాశములును ఉండును. ఈయవకాశముల మొత్తమునకు 'అంతరవకాశము (Interspace) అనిపేరు. నేలయందలి రేణువులన్నియు సమాన పరిమాణము గలవియై మొదటివిధముగా నిమిడియుండునెడల అంతరవకాశము ఎక్కువగా నుండును. చిన్న పెద్దరకముల రేణువులుండి రెండవవిధముగా నిమిడియున్న యెడల తక్కువగా నుండును. నేలయందలి రేణువులన్నియు పెద్దవయినను, చిన్నవయినను అన్నియు గోళాకారముగను సమానముగను ఉన్న యెడల అంతరవకాశమును సమానముగనే

యుండును. వానిమధ్యసందులు పెద్దవిగానుండునట్టిమిడియుండుటయేగాక రేణువులే గుల్లగా (Porous) నున్నయెడల సంతరవకాశము మరింత హెచ్చుగానుండును. నున్నపురాతి రేణువులు గుల్లగానుండును. హ్యూమస్ (Humus) రేణువులు అంతకంటెను గుల్లగానుండును. కావున నీవదార్థములు విస్తారముగల నేలలలో సంతరవకాశము హెచ్చుగానుండును. ఇసుక రేణువు లేమాత్రమును గుల్లగనుండవు. కాన ఇసుక నేలలో సంతరవకాశము మిగుల తక్కువగనుండును. సాగు (Tillage) మొదలగు పనులవలన నేలయందలి మంటిరేణువులు కొన్నికొన్ని యొకటిగాజేరి గుల్లగానుండు మిశ్రమరేణువులుగానేర్పడి గుల్లగా నిమిడియుండును. కావున బాగుగ దుక్కిపడిననేలలు అల్లుగానినేలలకంటె సంతరవకాశ మెక్కువగలవిగనుండును. సామాన్యముగా బంకనేలలం దంతరవకాశము సూటికి 50 పాళ్లుండును. ఇసుక నేలలలో 25 పాళ్లుమాత్రమేయుండును. ఇసుక నేలలో మంటిరేణువులు గుల్లగానుండకపోవుటయు, బరువుగానుండుటచే రెండవవిధముగా సద్దుకొనుటయు, అందలి యంతరవకాశము తక్కువగ నుండుటకు కారణములు.

నేలయందలి మంటిరేణువుల యుపరితలముయొక్క మొత్తపు విస్తీర్ణమునకు 'ఆంతరతలము' (Internal surface) అనిపేరు. ఆంతరతలముయొక్క పరిమాణము, అంతరవకాశముయొక్క పరిమాణమువలెగాక మంటిరేణువుల పరిమాణమును



34 - వ పటము.

బట్టియుండునూ అవి యెంతచిన్నవిగానున్న నాంతరతలమంత హెచ్చుగానుండును. 1 అంగుళము పొడవును, 1 అం. వెడ

ల్పును, 1 అం. ఎత్తునుగల యొక ఘనపదార్థముయొక్క ఉపరితలము 6 చతురపుటంగుళములుగదా ! $\frac{1}{2}$ అంగుళము పొడవును, వెడల్పును ఎత్తునుగల ఘనపదార్థములు 8 చేరినగాని వాని పరిమాణము 1 అంగుళముపొడవు వెడల్పు ఎత్తుగల ఘనపదార్థముయొక్క పరిమాణమునకు సరిపోదు. వీనిలో ప్రతి దానియొక్క యుపరితలమును $1\frac{1}{2}$ చతురపుటంగుళము లుండును. ఎనిమిదింటి యుపరితలమును 12 చతురపుటంగుళము లుండును. (పటము చూడు) పరిమాణమునందు 1 అం. పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తుగలపదార్థమును $\frac{1}{2}$ అం. పొడవు వెడల్పు ఎత్తుగల 8 పదార్థములును సమానమయినను, ఈయెనిమిదిపదార్థముల యుపరితలమును ఆయొకపదార్థముయొక్క యుపరితలముకంటె హెచ్చుగనున్నది. గుండ్రముగనున్న పదార్థములయిన నిట్టి భేదమేయుండును. కావున నేలయందలి రేణువు లెంత చిన్నవిగానున్నదాని యాంతరతల మంత యెక్కువగా నుండునని తెలిసికొనవలెను. మరియు కిక్కి-వ పటములోని రెండవవిధముగా నిమిడియున్న రేణువులుగల నేలలో మొదటివిధముగా నిమిడియున్న దానిలోకంటె సమాన ఆయతనము (Volume) నందే యెక్కువ రేణువులుపట్టును. కాన రెండవవిధముగా నిమిడియున్న మంటి రేణువులచే గూర్పబడిన నేలల యాంతరతల మెక్కువగా నుండును. గుల్లరేణువు లున్నయెడల నట్టినేలల యాంతరతలము మరింత హెచ్చుగానుండును. $\frac{1}{1000}$ అం. మధ్యకొల్తగల రేణువులుగల 1 ఘనపుటడుగు నేలయొక్క ఆంతరతలము రమారమి

1 యెకర ముండునని లెక్క వేయబడెను. బంక నేల లందు రేణువులు చిన్నవిగానుండుటచేతను, గుల్ల రేణువు లుండుటచేతను వానియాంతరతల మిసుక నేలల యాంతరతలముకంటె నెక్కువగ నుండును.

నేలయందలి మంటిరేణువులన్నియు సాధ్యమయినంతవరకు సమానపరిమాణముగలిగి యుండుటయు, ఆంతరతలము మిగుల తక్కువగాని మిగుల నెక్కువగాని కాకుండునట్లు రేణువులు మధ్యమ పరిమాణముగలవిగా నుండుటయు గుల్లరేణువు లెక్కువగానుండుటయు, మంచి నేలల లక్షణములు. ఇట్టి నేలల భౌతిక ధర్మములు సస్యముల కెట్లనుకూలములో ముందు తెలిసికొనగలము.

నేలయొక్క బరువు

THE WEIGHT OF SOILS

కొన్ని నేలలందలి మన్ను బరువుగానుండును. కొన్ని టీయం దలిది తేలికగానుండును. కొన్ని ముఖ్యజాతుల నేలలందలి మంటిబరు వీక్రింద వివరింపబడును.

నేల.	1 ఘ. అడుగుమంటి యొక్క బరువు.	1 ఎకరములో 9 అంగుళముల లోతువఱకుగల మంటియొక్క బరువు.
	రమారమి	రమారమి
బంక నేల (Clay soil)	66. 4 పౌనులు	215 0000 పౌనులు
గరుప నేల (Loamy soil)	76. 0 „	248 0000 „
ఇసుక నేల (Sandy soil)	80. 0 „	256 0000 „
పీటి నేల (Peaty soil)	49. 0 „	158 0000 „

1 ఘనపుటకుగు నీరు 62. 5 పౌనుల బరువుండును. నీటి యొక్క బరువును మానముగాచీసికొని దానితో పోల్చినయెడల పై నేలలతూనిక వరుసగా 1.06, 1.22, 1.28, 0.79, ఉండును. ఈయంకలే ఆయా నేలల తారతమ్యగరిమ(Specific Gravity) యని చెప్పబడును. స్వచ్ఛమయిన యిసుక రేణువులయొక్క తారతమ్యగరిమ 2. 60 ఉండును. అట్టి రేణువులచే నేర్పడిన నేలయొక్క తారతమ్యగరిమ 1. 45 మాత్రమే యుండును. నేలలో రేణువుల మధ్య సందులుండుటయు, ఆసందు లిసుక రేణువులకంటె దేలికయైన వాయువుతోగాని, నీటితోగాని నిండి యుండుటయు నిందుకు గారణములు.

నేలలబరువును గురించి తెలిసికొనుటవలన నేమి ప్రయోజనమని యడుగవచ్చును. నేలయొక్కబరువు ఘనపుటకుగున కింతయనిగాని, యింతలోతువరకు యెకరమున కింతయనిగాని తెలిసికొనిన యెడల, నందింతలోతులోపల నింత తేమగాని, యింత యాహారద్రవ్యము గాని గలదని లెక్క వేయవచ్చును. ఒకానొక నేలలో నత్రజని నూటికి. 03 పాలున్నదని రసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు చెప్పననుకొనుడు. బంక నేలయొక్క పై 9 అంగుళముల మంటి బరువు రమారమి 2150000 పౌనులు అని యిదివరలో వ్రాయబడెను. నత్రజని 100 పౌనులలో .03 పౌను గలదు.

కావున 2150000 పౌనులలో(అనగా ఎకరమున 9 అం. ల లోతువరకుగల మంటిలో నుండు నత్రజని $\frac{3 \times 2150000}{100 \times 100} =$

645 పానులు. దీనిని బట్టి యేదైన సస్యము నా నేలలో సాగు చేయు నెడల నందుకు దగినంత సత్రజనియందున్నదో లేదో తెలిసికొని లోటుగ నున్నయెడల నింత యెరువుమూలకముగ జేర్పవలయునని గ్రహింప వచ్చును.

నేలను దుక్కివలన గుల్లగ జేయుటచే నందలి యంతరవకాశము హెచ్చి, తేలికయగును. సున్నము మొదలగు కొన్ని పదార్థములను నేలయందు మిశ్రమ రేణువులను పుట్టించు శక్తిగలదు. ఇట్టి పదార్థములను జేర్చుటచేగూడ నేల తేలికయగును. నేలను అదుముటచే గుల్లతగ్గి బరువుపెచ్చును. పై నేలయొక్క బరువుచే నదుమ బడుటచేతను, పై నేలనుండి మృదువగు రేణువులు క్రిందికిపోయి అందలి రేణువుల మధ్యసందులలో నిరుకు కొనుట చేతను క్రింది నేల పై నేలకంటె బరువుగా నుండును.

స్నిగ్ధత

TENACITY

నేల యుద్భిజ్జములు సామాన్యముగా గాలిచే పడగొట్టి బడకుండ వేళ్లను పాతుకొని యుండుటకు దగినంత జిగురుగా నుండవలెను. కాని, నీరు, వాయువు సరిగా ప్రసరించుటకును, వేళ్లు సులభముగ దిగుటకును వీలులేనంత జిగురుగ నుండ గూడదు. మిగుల జిగురుగ నున్నయెడల దుక్కికిని వీలుగ నుండదు. నేలయొక్క స్నిగ్ధత, అందలి మంటి రేణువుల పరిమాణమును బట్టియు, స్వభావమును బట్టియు నుండును.

అణువు లెంత చిన్నవిగనున్న స్నిగ్ధత యంత హెచ్చుగ నుండును. నేలయందలి యంతరవకాశము నీటితో నిండి యున్నపుడు దాని స్నిగ్ధత హెచ్చును. తడిసిన యిసుక నున్న ము మొదలగు కొన్ని పదార్థముల సంశ్లేషశక్తి (Cohesion) వానియందలి నీ రిగిరిపోయిన వెంటనే తగ్గును. బంకమంటియొక్క సంశ్లేషశక్తి యట్లుతగ్గును. బంకమన్న తడిసినపిదప నెండిన కొలదిని గట్టిపడి రాతివలె నగును.

మంటి యణువులలో గొన్ని మిగుల నూత్నముగ నుండి తక్కిన వానికి సంశ్లేషమును గలిగించుచున్నవి. ఇట్టి స్వభావము నేలయందలి కొన్ని కొన్ని పదార్థముల రేణువులకు మిగుల విశేషముగ గలదు. వానికి బంధక పదార్థములు (Colloid substances) అని పేరు. బంధనపదార్థములలో 'బంధకమృత్తిక' (Colloid clay) ముఖ్యమయినది. ఇది జిగట స్వభావము మిగుల నెక్కువగగల మిగుల మృదువయిన మృత్తిక. దీనిరేణువులు నూత్నదర్శనిచే నయినను విడిగా గానరానంత చిన్నవి. బంకనేలలం దీపదార్థముచే నితర రేణువులన్నియు బంధింపబడుటచేతనే దాని స్నిగ్ధత హెచ్చుగ నుండును. ఇదిగాక నేలయందలి ఉదజనిత శైలితములును * ఉదజనిత స్ఫటితములును † (Hydrated silicates

* జలమతో గూడిన శైలితములు.

† స్ఫటికజనితము (AlO_3H_3) నందలి యుదజనికబదులు సోడియము పొటాసియము ఖటికము మొదలగు బలమయిన భస్మముల (Bases)ను ప్రవేశ పెట్టినయెడల వాని స్ఫటితము లేర్పడును.

and aluminates) కూడ బంధనపదార్థములే 'బంధకమృత్తిక' యొక్క బంధనశక్తి సున్నము, హ్యూమసు మొదలగునవి జేర్చుటచే తగ్గును.

సంకోచము.

SHRINKAGE.

బంక నేలలు తడిసి యెండినపుడు బీటలు దీయును. నేల యందలి తేమపోవుటచేత నందలి యణువులు మరింత దగ్గరగా జేరుటవలన గలిగిన సంకోచమే బీటలు దీయుటకు కారణము. బీటలుదీయు స్వభావము ఇసుక నేలల కంతగాలేదు. స్వచ్ఛమయిన యిసుక తడిసి యారినవెనుక నేమియు సంకోచము నొందదు. 100 ఘనపుటంగుళముల తడిసిన బంకమన్ను యెండిన పిమ్మట రమారమి 82 ఘనపుటంగుళములు మాత్రమే యుండును. సామాన్యముగా నేలలయొక్క సంకోచము నూటికి 10 మొదలు 15 పాళ్ల వరకు నుండును. నేల పగులుటవలన నందలి యుద్భిజ్జముల మృదువయిన వేళ్లు తెగును. కావున విశేషముగా పగులు నేలలు సస్యముల కంత మంచివిగావు. పగులు నేలలలో పైమన్ను నెరదలలోబడి యడుగునకు బోవుటవలన దున్నినట్లు గొంతవరకూ బైమన్ను క్రిందికిని క్రిందిది పైకిని వచ్చును. పగిలి నపుడు వాయుసంచారము బాగుగ నుండును.

వ్యాకోచము.

EXPANSION.

కొన్ని నేలలు తడిసినపుడు వ్యాకోచము నొందును. రేవడినేలలు అందలి యంత రవకాశమంతయు నీటితో నిండిన యెడల రమారమి నూటికి 7 పాళ్లు వ్యాకోచము నొందును. ఇసుక నేల లట్లు సామాన్యముగా వ్యాకోచమునొందవు. ఒక విధమగు నిసుక నేలలు తడిసినపుడు సంకోచము నొంది తిరుగ నెండి నపుడు మిగుల గట్టిపడును. ఇట్టి నేలలు నన్యముల కంతగా మంచివి కావు. *

నేలయొక్క వర్ణము

COLOUR.

నేలల వర్ణ భేదములు వెనుకటి యధ్యాయములోనే వివరింపబడెను. నేలయొక్క వర్ణము సామాన్యముగా దాని రసాయన సంఘటనము ననుసరించి యుండును. ఎర్ర నేలలకు వాని యందలి లోహికామ్లజనిదము ($\text{Fe}_2\text{O}_3 = \text{FeO}_3$) వలన నారంగు గలుగుచున్నది. నల్ల నేలల కావర్ణమందలి కొన్ని లవణముల చేతను ‡ సోడియంపదార్థముచేతను గలుగుచున్నది. సోడి

* ఇట్లు గట్టిపడుట కందుండు సోడియం కార్బోనేట్ (సో₂క₃ = Na_2CO_3) కారణమై యుండవచ్చును.

‡ ప్రత్తిరేవడినేల * నలుపురంగు అజతలితనయంత మైన స్కాంతాయితము (Titaniferous magnetite) వలనను, ద్రావణీయహ్యామసువలనను గలుగుచున్నదని ఈమధ్య శాస్త్రజ్ఞులచే నిర్ణయింపబడెను.

యపదార్థ మొక్కవయినకొలదిని నేలయొక్కవర్ణము నల్లన-
బడును. తేలిక వర్ణపునేలల కారంగు, అందలి యిసుక
రేణువులరంగునుబట్టి గలుగుచున్నది. ఇట్లే యితరవర్ణములును.
ఆయా నేలలందలి యాయాపదార్థముల వర్ణములనుబట్టి గలు-
గుచున్నవి. నేలయొక్క రంగునకును దాని భౌతికధర్మములలో
కొన్నిటికిని గల సంబంధములు ముందు తెలుపబడును.

నేలయొక్కగంధము

ODOUR.

గంధము (వాసన) నేలకు మఱియొక భౌతికధర్మము. మ-
న మేనేల నైనను బాగుగ పరీక్షించిన యెడల దానికి వాసన
కొంతగలదని గ్రహింతుము. నేలల వాసన వాని రసాయన
సంఘటనము ననుసరించియే యుండును. నేలకు గంధము
బహుస్వల్పముగా నుండుటచేతను సస్యములకును యీధర్మము
నకును అంతలో సంబంధమున్నట్లు గనబడక పోవుటచేతను దీని.
విషయమయి విస్తరించి వ్రాయ నవసరములేదు.

నేలయందలి జలము

SOIL WATER.

నేలయందుతేమ ముఖ్యముగా వర్షమువలననే గలుగు-
చున్నది. వర్షములేని కాలమందు సయితము వర్షపునీటిని నదుల
కానకట్టలు గట్టట వలనను, తటాకములు నిర్మించుట చేతను,
నిలువజేసి యుపయోగించుట వలన నేలకు దేమగలుగజేసి

సస్యమును బెంచుచున్నాము. నేలలోని కింకునీటిని గూడ నూతులుద్రవ్వి పైకితోడి సస్యముల కుపయోగించు చున్నాము. నేలలోని కింకునీరు కొన్నిచోట్ల నీటిబుగ్గలుగా పరిణమించుచున్నది. సింహాచలము, నీలగిరి మొదలగు ప్రదేశములలో నీ బుగ్గల నీరుకూడ సస్యముల కుపయోగింప బడుచున్నది. మంచు వలనగూడ నేలకు గొంత తేమ గలుగుచున్నది. కాని అది మిగుల స్వల్పము అయినను, కొద్ది తేమతోనే పెరుగు ఉలవ మొదలగు పైరుల కిదిమిగుల సహాయకరము. నేలకు వాయువునందలి తేమ నాకర్షించు శక్తికూడ కొంత గలదు. కానియది మిగుల స్వల్పము. ఇట్లాకర్షింపబడు తేమమంటిరేణువులను గట్టిగా నంటిపట్టుకొని యుండునే గాని సస్యముల కుపయోగింపదు. అయినను యీతేమ లేకపోయిన యెడల నర్జము మొదలగు వానివలన గలుగు తేమ కొంతమంటిరేణువుల నంటి పట్టుకొని సస్యముల కందదు. కావున నేలకు వాయువునుండి తేమ నాకర్షించు శక్తి తగినంత యుండుట గూడ మంచిదే. బంక నేల లందాంతరతల మెక్కువ యుండుటచే వానికీ శక్తి హెచ్చుగానుండును. ఇసుక నేలలకు దక్కువ.

జలగ్రహణశక్తి.

CAPACITY FOR WATER.

పొడినేలను తడిపినయెడల నది కొంతనీటిని సీల్చుకొనును. ఈధర్మమునకు జలగ్రహణశక్తియని పేరు. నేలయొక్క యంత

రవకాశ మొత్త హెచ్చుగ నున్న నందంత నీరు పట్టును. ఒకానొక ప్రయోగము (Experiment) నందు:—

100 ఘ. అడుగుల యిసుక నేలలో 89.4 ఘ. అ. నీరుపట్టెనని నిర్ణయింపబడెను.

„	గరుపనేలలో	45.1	„	„
„	బంకనేలలో	52.7	„	„
„	పీటులో	84.0	„	„

మఱియు 100 పానుల యిసుక నేలలో 24.7 పానుల నీరుపట్టెనని నిర్ణయింపబడెను.

„	గరుపనేలలో	32.5	„	„
„	బంకనేలలో	44.5	„	„
„	పీటులో	359.0	„	„

నేలయందలి యవకాశమంతయు నీటితో నిండియున్న యెడల నానేల జలపూరిత మయి (Saturated) యున్న దందురు. వర్షములు విస్తారము గురిసినపుడును వరిపొలమునకువలె విస్తారము నీరు పెట్టబడినపుడును దక్క సామాన్యముగా నేల జలపూరిత మయి యుండదు. జలపూరిత మయి యుండుట కుండవలసిన జలమునందు రమారమి నూటికి 40 మొదలు 60 పాళ్లకు మిగుల తక్కువగాని మిగుల నెక్కువగాని తేమ యుండునెడల సామాన్యముగా సస్యములకు ప్రతికూలము. అత్యధికముగ నున్న యెడల నందు వాయుప్రచారము సరిగానుండదు. అత్యల్పముగ నున్న యెడల దగినంత తేమ లేకపోవును. ఈ పరిమితి ఆ యా సస్యముల స్వభావమునుబట్టి గూడ ఉండును.

జలధారణశక్తి

(RETENTIVE POWER)

కొంతమంటి నొక చిల్లులుగల పెట్టెలోనుంచి యది జల పూరిత మగు సంతవర కందు నీరుపోసి కొంతసేపుంచినయెడల నందలి నీటిలో కొంతభాగము మంటి రేణువుల నంటుకొనియుండి తక్కినది క్రిందికి వడిసిపోవును. ఇసుక నేలలందలి నీరు, బంక నేలలందలి నీటికంటె నిట్లుశీఘ్రముగ వడిసిపోవును. వడిసిపోకుండ నీటినిపట్టి యుంచుశక్తికి “జలధారణశక్తి” యనిపేరు. ఇది నేలలయొక్క ఆంతరతలము ననుసరించి యుండును. బంక నేలలందాంతరతల మెక్కువగా నుండుటచేతనే వానికి జలధారణశక్తి హెచ్చు. నేలయందు గుల్లగానుండు మిశ్రమ రేణువులును, జిగురుపదార్థములును ఉన్న యెడల నీశక్తి మఱింత హెచ్చుగనుండును. మనము రెండు కుంకుడుగింజలను నీటిలో



కి5-వ పటము.

ముంచి యొకదాని నొకటి యంటునట్లు బల్లపైనుంచి మరియొక నీటి బొట్టుపైనివేసిన యెడల నారెండును ఒకదాని నొకటి యంటి యుండుచోటను అవిబల్లనంటుచోట్లను నీటి పొర దళముగా నుండును. (కి5-వ పటము చూడుడు) ఇట్లే నేలయందును మంటిరేణువు

లొకదాని నొకటి యంటుచోట్ల తేమపొర దళముగానుండును. కావున నిట్లుంటుచోట్లు విస్తారముగా నుండునట్లు, అనగా కి5వపట

ములో 2వ భాగమున జూపబడినవిధముగా నేలయందలి రేణువులమరియున్న యెడల నట్టి నేల కీశక్తి హెచ్చుగానుండును. నేల నదుముటవలన నందలి రేణువులు పైని చెప్పినట్లు సర్దుకొనుటచే, దాని జలధారణశక్తి హెచ్చును. ఇసుక నేలల జలధారణశక్తిని హెచ్చు చేయుటకు దానిపై బండ * (Roller) నీళ్లుట యొకయుపాయము. సున్నము మొదలగు జిగటస్వభావము నణచు పదార్థములను జేర్చుటచేతను దుక్కివలనను బంకనేలల జలధారణశక్తిని తగ్గించినట్లును. హ్యూమను చేర్చబడుటచే బంకనేలలో కొన్ని కొన్ని చిన్న రేణువు లొక్కొకటిగా జేరి పెద్దరేణువులుగా నేర్పడుటచే వాని జలధారణశక్తి కొంతవఱకు తగ్గును. ఇసుకనేలకు హ్యూమను చేర్చబడుటచే నందలి రేణువుల యాశ్లేషము వృద్ధి నొంది వాని జలధారణశక్తి హెచ్చుగును. కావున బంకనేలల జలధారణశక్తిని తగ్గించు స్వభావమును ఇసుకనేలల జలధారణశక్తిని హెచ్చించు స్వభావమునుగూడ హ్యూమను గలిగియున్నది. హ్యూమనుయొక్క ఆశ్లేషశక్తి బంధకమృత్తికయొక్క ఆశ్లేషశక్తికంటె 11 రెట్లని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి.

* బాటలపై కంకరనణగగొట్టుట వుపయోగింపబడు పనిముట్టువంటిది. నేలపై నీడ్వబడ బండ బాటలపై నీడ్వబడు దానికంటె మిగుల తేలికగ నుండవలయును. సామాన్యముగా కర్రతో జేయబడును.

ఇసుక నేలలకు జలగ్రహణశక్తియు జలధారణశక్తియు బంక నేలలకంటె దక్కువయినను, ఉన్న తేమలో నెక్కువపాలును అందు పెరుగుచున్న యుద్భిజ్జముల కిచ్చు స్వభావ మిసుక నేలలకు గలదు. బంక నేలలలో నాంతరతలమును బంధనపదార్థములును హెచ్చుగ నుండుటచేత నందలి మంటి రేణువులకును జలమునకును ఆశ్లేష మెక్కువగా నుండును. ఇందుచేత బంక నేలలలోని తేమ గొంతభాగ ముద్భిజ్జములు తీసికొనలేనంతగట్టిగా అందలి రేణువుల నంటికొనియుండును. ఇసుక నేలలో నాంతరతలము తక్కువగ నుండుటచే ప్రతిరేణువుచుట్టు నుండు నీటిపొర దళముగ నుండును. రేణువునకును జలమునకును ఆశ్లేషమంతగా నుండదు. కావున నందలి తేమలో స్వల్పభాగమే రేణువుల నంటి పట్టుకొనియుండి తక్కినది యుద్భిజ్జములు తీసికొనుటకు వీలుగా నుండును.

ఒకానొక ఇసుక నేలలో ఖానిక చొప్పున 100 కి 18 పాళ్ల తేమయుండెను. బంక నేలలో నూటికి 26 పాళ్లుండెను. వీనిలో మొక్కజొన్నపైరుచేసినపు డిసుక నేల ఆ సస్యమునకు 13. 83 పౌనుల నీటినిచ్చెననియు బంక నేల 12. 5 పౌనులనీటినిచ్చెననియు బ్రయోగమువలన నిశ్చయింపబడెను. బంక నేలలో నీరెక్కువపాళ్లున్న ను సస్యమున కిసుక నేలయిచ్చినంత నీటినియ్యలేకపోయెను. కావున ఇసుక నేలల జలధారణశక్తి తక్కువగ నుండుటవలని లోపమును, ఉన్న తేమలో నెక్కువపాలును సస్యముల కిచ్చుశక్తి కొంతవరకు కమ్ముచున్నది.

ఇదిగాక ఇసుక నేలలో తూనిక ప్రకారము తేమ తక్కువ పాలేయున్నను కొలత ప్రకార మంతకంటె నెక్కువగానుండును. ఒక ఘనపుటడుగు బంక నేలను 1 ఘ. అ. ఇసుక నేలను దీసికొందము. రెండు నేలలలోను తూనిక చొప్పున నూటికి 20 పాళ్లు తేమయున్న యెడల 1 ఘ. అ. బంక నేలకంటె 1 ఘ. అ. యిసుక నేల బరువుగానుంటుచేత 1 ఘ. అ. ఇసుక నేలలోనే యెక్కువ తేమయుండును. ఇదియుగాక యిసుక నేలలలో మొక్కల వేళ్లు బాగుగా పారును. కావున నీ నేలలు ఉద్భిజ్జములకు నీటినిచ్చు విషయములో మనము సాధారణముగా నూహించు నంత చెడ్డవిగావు.

జలస్రవణము

PERCOLATION

నేలపైబడు నీటిలో కొంతభాగము లోని కింకునని యెల్ల రకు దెలిసినయంతమే. ఇట్లొంకుటకు జలస్రవణ మనిపేరు. నేల యొక్క జలధారణశక్తి యెంత తక్కువగా నున్న నందంతశీఘ్రముగ నీరింకును. అనగా నేలయొక్క ఆంతరతలమును, అందలి బంధనపదార్థములును ఎంత తక్కువగానున్న నీరు అంతత్వరగా నింకును. పైని రెండంగుళములలోతు నీరుంపబడినపుడు, 24 గంటలలో ఆయా నేలలలో నీరు 198 పుటలో వ్రాసినంతలోతు దిగెనని యొకా నొక ప్రయోగములో 'కింగ్' అను అమెరికా దేశపు శాస్త్రజ్ఞుడు నిర్ణయించెను.

ఇనుక (అంగుళమునకు 60-80 చిల్లులుగల జల్లెడలోనుండి దిగినది)	160 అం.
ఇనుక (100చిల్లులకు పైనిగలజల్లెడలోనుండి దిగినది)	89 అం.
బంకగరుము	1.6 అం.
నల్లబంకమన్న	0.7 అం.

దీనివలన నేలలోని రేణువులెంత చిన్నవిగనున్న నందు నీ రంత యాలస్యముగా దిగుననితెలియును. వాయువీడనమును, ఉష్ణమును ఎక్కువగా నున్నయెడల నీరుత్వరలో నింకునని ప్రయోగములవలన గనుగొనబడెను. నీరుత్వరలో నింకుటకు నేల యందదివఱకుండు వాయువుపైకి పోవలెను. బంక నేలలో రేణువులమధ్యసందులు మిగుల సన్ననివగుటచే నీరుపైని పడినపుడు అందలి వాయువు తప్పించుకొని పోవుటకు వీలుండదు. కావున నే యందు నీరాలస్యముగా నింకును. మనమేదేని సన్ననిమూతి గల గాజుబుడ్డిని తటాలున నీటిలోముంచినపుడు లోపలిగాలి పైకిని నీరు లోపలికిని బాహాటముగాపోవుటకు దగినంత సందు లేకపోవుటచేతనే బుడ్డి త్వరలో నిండదు.

బాష్పీభవనము

(EVAPORATION)

జలాశయములనుండి సూర్యనివేడిమిచేత గొంతసే రావిరియై పైకిపోవు నని మన మందఱమెఱిగినదే. ఈవిధముననే నేలలోని నీరుకూడ గొంతయూవిరియై పోవుచుండును. ఇట్లావిరియై పోవుటకు బాష్పీభవనమనిపేరు. నేలయొక్క తారతమ్యోష్ణత జలముయొక్క తారతమ్యోష్ణతకంటె దక్కువగుటచే నేల జల

ముకంటె నెక్కువత్వరలో వేడియెక్కును. నేల నీటియొక్క యుపరితలమువలె చదునుగానుండక ఎక్కువ యుపరితలమును నూర్చుకొరణములకు వెలిపరచును. ఈరెండు కారణములచేతను నేలనుండి, జలాశయములనుండి కంటె నొకే కాలములో నెక్కువ నీరావిరియైపోవును. నేల జలపూరితమై యున్నపుడు బాష్పీభవన మెక్కుడు చురుకుగానుండును. జలపూరితమైయున్నపుడు నీలనుండియు బాష్పీభవన మొకేవిధముగ నుండును. అట్లుగా కున్నపుడు బాష్పీభవనము వానివాని భౌతికస్వభావముల ననుసరించియుండును. నేల గుల్లగానున్నయెడల నందలి తేమ త్వరలో నారిపోవును. నల్లగానున్న నేలలందు శీతర నేలలందుకంటె బాష్పీభవన మధికము. చదునుగాలేని దానియందు చదునుగా నున్నదానియందుకంటె నెక్కువ. నేలపై వాయువు ప్రవహించుచున్నయెడల బాష్పీభవనము చురుకుగానుండు. ఎప్పుడేర్పడిన నీటియావిరి యప్పుడే వాయుప్రవాహముచే గొనిపోబడుచుండుటయే యందుకు గారణము. ఆరగట్టిన తడిబట్టలు గాలితేనప్పటికంటె గాలివీచుచున్నపుడు త్వరలో నారుచుండుట యెల్లరకుం దెలిసినదే.

కేశికర్షణశక్తి

(CAPILLARITY.)

కేశికర్షణశక్తియననేమో రెండవ యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. పై నేలలోని తేమ యారిపోయిన కొలదిని క్రింది నేలలోని నీరు దీపపువత్తిగుండ చమురులేచునట్లు ఈశక్తిచేత

పైకిలేచుచుండును. నేలయందలి రేణువులెంత చిన్నవిగానున్న కేశాకర్షణశక్తియంత హెచ్చుగానుండును. అవి యొకదాని నొకటియంటు స్థలములు హెచ్చుగానున్నయెడల (అనగా కె3-వ పటములో 2 - వ భాగములో జూపబడిన ట్లమర్పబడినయెడల) గూడ నీశక్తి హెచ్చుగానుండును. జగురుపదార్థము లుండుటయు ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుగా నుండుటయు దీనికి ప్రతికూలములు. సేంద్రియ లవణములు (organic salts) దీనిని తగ్గించును. నిండియ లవణములు (inorganic salts) హెచ్చించును.

కేశాకర్షణశక్తివలన పైనేలలోని తేమయూరిపోయినకొలది క్రిందినేలలోని నీరు పైకివచ్చుచుండుట చేతనే నీరుపెట్టకపోయినను కొన్ని కాలములందు సస్యములకువలయు తేమయంతయు లభించుచున్నది. కావున నేలకీధర్మముండుట సస్యముల కనుకూలమే. కాని యీస్వభావము విస్తారముగల నేలలలో బాష్పీభవనమెక్కువగుటచే నేల త్వరలో నెండిపోవుట తటస్థించును. నేలయందలి తేమ సాధ్యమైనంతవఱకు బోకుండ జేయుట వ్యవసాయదారుని ముఖ్యోద్దేశమయి యుండును. కావున నీవిషయములో కేశాకర్షణశక్తి కృషీవలునకు ప్రతికూలతను గలిగించుచున్నదని చెప్పవచ్చును.

బాష్పీభవనమును తగ్గించుటకు గొన్నియుపాయములు నిచట వివరించెదము. నూర్యరశ్మి సోకకుండ, నేపదార్థముచేత నైన గవ్వుట యొకయుపాయము. ఇది యెల్లప్పుడును సులభ

సాధ్యముకాదు. కంచెలు మొదలగువానివలన గాలి విస్తారము తగులకుండచేయుట యొకటి. నేలయొక్క యుపరిభాగము నందలి తేమ కొంతవర కారిపోయినవెంటనే $1\frac{1}{2}$, 2 అంగుళముల లోతువరకు గుల్లగా నుండునట్లు కదిపి వదలివేయుట మరియొకటి. ఇదియే సామాన్యముగ జేయదగినపని. దీనివలన పై $1\frac{1}{2}$, 2 అంగుళముల మన్నను గుల్లగానుండుటచే ముందెండిపోయి, యడుగుమంటికి కప్పుగానేర్పడి యందలి తేమ పోకుండ గాపాడును. అది యెట్లన, $1\frac{1}{2}$ -2, అంగుళముల మంటిని ద్రవ్వి గుల్లగ జేయుటచే నందలి కేశనాళికలు విభంజనము * సెందుటవలన క్రిందినుండి తేమపైకంతగా రాదు. గుల్లగనున్న పైమంటిలోని తేమమాత్ర మారిపోయి యటుపిమ్మట బాష్పీభవనము కొంచె మించుమించుగా గట్టువడును.

అంతర్భూమజలము


UNDERGROUND WATER.

నేలలోని కింకు నీరు క్రిందికింకి యింకి యేదేని గట్టిమంటి పొరగాని రాతిపొరగాని యడ్డమువచ్చినపుడు దానిపై మంటి పొరలో గూడుకొనును. ఇట్లు కూడుకొనుజలమునకు 'అంతర్భూమజలము' అని పేరు. గట్టిపొరమొది మంటిపొర యెంత యెత్తు

* కేశకాగ్నణశక్తిచే మంటియందు తేమ క్రిందినుండి పైకివచ్చు మార్గములను మిగుల జిన్నరంధ్రములుగల గొట్టములతో బోల్పవచ్చును. వైమంటిని ద్రవ్వి గుల్లగాజేయుటచే నీనాళికలు (గొట్టములు) విచ్ఛేదము సెందును. కేశనాళికల విభంజన మన నిదియే.

వరకు జలపూరితమయి యుండునో ఆ మట్టమునకు 'అంతర్భామ జలముయొక్క మట్టము' అని పేరు. అంతర్భామజలము దాని క్రింది గట్టిపొరయొక్క మిట్టపల్లములను బట్టి యొకచోటినుండి మరియొకచోటికి ప్రవహించును.

36-వ పటము.



- | | |
|-----------|--|
| A మంటిపొర | E. మిగుల పల్లపుప్రదేశము. ఇచట సంతర్భామజలము నేల నై మట్టమునకు వచ్చినది. |
| B ఇసుకపొర | F. ఇది E కంటె కొంచెము మెరకప్రదేశము. ఇచట సంతర్భామ జలముయొక్క మట్టము నేలమట్టమునకు మిగులసమీపము గనున్నది. కావున నేలయివకనేల యనిపించు కొనును. |
| C రాతిపొర | XX. అంతర్భామ జలముయొక్క మట్టము. నూతిలోని నీటి మట్ట మదియే. |
| D నూయి | |

మనము నూతులు త్రవ్వనపుడు వానిలోనికి వచ్చునది యీ ప్రవాహముల నీరే. నూతులలోని నీటిపైమట్టిమే ఆయా ప్రదేశము లందలి యంతర్భామజలముయొక్క మట్టమును తెలి

యజ్ఞేయును. అంతర్భాషామజలముయొక్క మట్టము నేలయొక్క ఉపరిభాగమునకు వచ్చిన యెడల నట్టినేల యివకనేల యనబడును. నేలయందలి యంతరవకాశ మంతయు నీటితో నిండియుండుటచే నట్టినేలలు సస్యముల కనుకూలములుగావు. అంతర్భాషామజలముయొక్క మట్టము 4-6 అడుగులకంటె నెక్కువ లోతుననున్న యెడల నానీరు కేశాకర్షణశక్తివలన పైకి రాలేకపోవుటచే నది సస్యములకు అనుపయోగము. అయినను నూతులను ద్రవ్యి యందలి నీటిని పైకితోడుటచే నిది సస్యముల కుపయోగపడుచున్నది. సామాన్యముగా వరి మొదలగు నీటిపారుదలగల సస్యములు సాగు చేయబడు ప్రదేశములలో నంతర్భాషామజలముయొక్క మట్టము నేలపై మట్టమునకు దగ్గరనే యుండును. మెట్టభూములయందు సామాన్యముగా లోతున నుండును.

నేలయందలి తేమ మిగుల నెక్కువగ నున్నయెడల నందు వాయుప్రచారము సరిగానుండదని 193వ పుటలో వ్రాయబడెను. ఇదిగాక నేలలు తేమగానుండుటవలన సస్యముల కదిప్రతికూలమనుటకు మరికొన్ని కారణముల నిచట వివరించెదము.

1. తేమ యెక్కువగా నుండుటవలన బాష్పీభవనము హెచ్చును. బాష్పీభవనము హెచ్చుటచే నేలయొక్క

ఉష్ణోగ్రతతగ్గును. * నేల తగినంత యుష్ణోగ్రతను గలిగి యుండని యెడల నందు సస్యములు పెరుగవు. ఈవిషయమయి ముందు మరికొంత వ్రాయబడును.

2. నేలయందలి కొన్ని సూక్ష్మజీవులు నశించును. ఈ సూక్ష్మజీవులు నేలలోజరుగు కొన్ని యుపయోగకరములగు మాన్యుల కావశ్యకము.

3. నేలయందలి యాహారద్రవ్యములలో గొన్ని క్రిందికి వడిసి పోవునీటిలో గరగి నష్టమయిపోవును.

4. ఆహారద్రవ్య ద్రవములు మిగుల పలుచనగును.

5. తేమ అధికమగుటవలన నేలలో గొన్ని సస్యములకు వ్యతిరేకము లగు పదార్థములు జనించును.

6. దుక్కి మొదలగు పనులకు వీలుగనుండదు.

నేలయందలి యుష్ణత

(SOIL HEAT)

నేలయందు జల్లబడిన విత్తనముల మొలకయు ఉద్భిజ్జములవృద్ధియు, నేలయందలి సూక్ష్మజీవుల వ్యాపారములును,

* నీటిని గాచినపుడు దానియుష్ణోగ్రత $^{\circ}\text{C}$. 100° లవరకు హెచ్చును. అటుపిమ్మట ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుక కాచినకొలదిని నీరావిరియై నైకిపోవును. ఉష్ణోగ్రత $^{\circ}\text{C}$. 100° లయినపిమ్మట గలుగజేసిన వేడిమియంతయు నీటివావిరిగా జేయుటకు వ్యయమగును. ఇట్లు వ్యయమగు ఉష్ణమునకే యావిరియొక్క యంతర్గతోష్ణమని (Latent heat) పేరు. నేలయందలి తేమయావిరి యగునపుడును కొంత యుష్ణతవ్యయపడును. అనగా నేలయందలి యుష్ణత కొంత అవిరియొక్క అంతర్గతోష్ణముగా మారును. కావుననే నేలయొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గును.

అందలి వివిధభౌతిక రసాయనవికారములును, గొంతవరకు నేలయొక్క యష్టోగ్రత ననుసరించి యుండును.

గోధుమలు మొలచుటకు ఫ. 77 అంశముల యష్టోగ్రత మిగుల యనుకూలము. ఫ. 32-40° లకు తగ్గినయెడలగాని ఫ. 88-100° లకు హెచ్చినగాని గోధుమలు మొలవనేరవు. ఇట్లే ప్రతి జాతివిత్తనముల మొలకకు ననుకూలతమోష్టోగ్రత (Optimum temperature) యు, అల్పతమోష్టోగ్రత (Minimum Temperature) యు, అధికతమోష్టోగ్రత (Maximum Temperature) యు నాయాజాతుల స్వభావము ననుసరించి యుండును. మొక్కజొన్నకు 'అనుకూల తమోష్టోగ్రత' ఫ. 88-100° అల్పతమోష్టోగ్రత ఫ. 40—50° లు. అధికతమోష్టోగ్రత ఫ. 111—122° లు.

నేలయొక్క యష్టోగ్రత యనుకూలముగ నున్నయెడల అందు చల్లబడువిత్తులు క్రమముగ మొలచును. అనుకూలముగ లేనియెడల మొలక లాలస్యమగును. ఒకానొక ప్రయోగములో నేలయొక్క యష్టోగ్రత ఫ. 40 ఉన్నప్పుడు గోధుమలు 6 రోజులలో మొలచెను. ఫ. 50 లు ఉన్నప్పుడు 3 రోజులలో మొలచెను. ఫ. 60 లు ఉన్నప్పుడు 2 రోజులలో మొలచెను. ఫ. 65 లు ఉన్నప్పుడు 1½ రోజులలో మొలచెను.

ఉద్భిజము లెదుగుటకుగూడ నేలయొక్క యష్టోగ్రత ఆయాజాతుల కనుకూలముగ నుండవలెను. కొన్ని జాతులకు

ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుగానుండవలయును. కొన్నిటికి తక్కువగా నుండవలెను. యవలు (Barley) ఫ 68°లు ఉన్నపుడు బాగుగ పెరుగును. ఒకానొక ప్రయోగములో విత్తనములు చల్లినప్పటి నుండి యుష్ణోగ్రత

ఫ50°. లు ఉన్నపుడు 7.64 గ్రెయిసులు * శుష్కపదార్థము † గల యవల పంటపండెను.

ఫ68°.లు ,, 8.22 ,, ,,

ఫ86°.లు ,, 3.85 ,, ,,

ఫ104°.లు ,, 0.93 ,, ,,

అనుకూలోష్ణోగ్రతగల నేలలో 2 మాసములు పెరిగిన తరువాత నానేలకు

50ఫ.లు ఉష్ణోగ్రతగలగజేయబడినపుడు 7.88 గ్రే.లు శుష్కపదార్థముగల పంటపండెను.

ఫ68°.లు ,, 9.15 ,,

ఫ86°.లు ,, 5.33 ,,

ఫ104°.లు ,, 3.47 ,,

ఉష్ణోగ్రత ఫ. 68° ల కంటె నెక్కువయిన కొలదిని వృద్ధి తక్కువయ్యెను. ఫ.68°లకు దక్కువయినపుడును వృద్ధియంత బాగుగ లేదు. కావున ఫ.68°ల యవలు పెరుగుట కనుకూలోష్ణోగ్రత. అనుకూలోష్ణోగ్రతగలనేలలో రెండుమాసములు పెరిగిన తరు

* గ్రెయిసు అనగా రమారమి 1 వడ్లగింజయెత్తు.

† శుష్కపదార్థమునగా పండినపంటను తేమయంతయు పోవునట్లు 100శ.ల ఉష్ణముగలవాయువునం దారబెట్టగా మిగులుభాగము.

వాత నానేలయొక్క యుష్ణోగ్రతను మార్పుటవలన మొ 2 లు పెరుగుటకు మొదటిప్రయోగములో గలిగినంత యవరోధము గలుగలేదు. కాని ఉష్ణోగ్రత యనుకూలముగ లేకుండుటవలని నష్టము కనుపించకపోలేదు.

విత్తులు మొలచుటకును మొక్కలు పెరుగుటకును నేల యొక్క యుష్ణోగ్రత సామాన్యముగా దానిపై వాయువుయొక్క యుష్ణోగ్రతకంటె కొంచెము హెచ్చుగా నుండవలయు నని ప్రైవ్ర యోగములవంటి ప్రయోగములవలన గనిపెట్టబడెను.

నేలయందలి నూత్నజీవులకు ఫ. 77-65°లుల యుష్ణోగ్రత యనుకూలము ఫ. 32° లకు తక్కువయినను, ఫ. 122-131°ల ఎక్కువయినను వాని వ్యాపారము కట్టువడును.

నేలయొక్క భౌతిక రాసాయనిక ధర్మములుగూడ యుష్ణోగ్రతనుబట్టి మారుచుండును. ఉష్ణోగ్రత హెచ్చినయెడల నేల యొక్క జలధారణశక్తితగ్గును. జలస్రవణము హెచ్చును. 'అప్లజనీకరణము' * (oxydation) మొదలగు రాసాయనిక మార్పులును చురుకుగా నడచును.

నేల కుష్ణత ముఖ్యముగా సూర్యనివలననే కలుగుచున్నది. భూగర్భమునందలి వేడిమి పైకి వచ్చుటవలనగూడ నేలకు కొంతయుష్ణత గలుగుచున్నది. కాని యిది మిగుల స్వల్పము. నేల యందు ఆళ్ళు లలములు, ఎరువులులోనుగాగల పదార్థములు

* అప్లజని యితరద్రవములతో గలియుట.

చీకుట మొదలగు రాసాయనిక మార్పులవలనగూడ కొంత యుష్ణత వుట్టును. పేడకుప్పయొక్క మధ్యభాగము మిగుల నుష్ణముగ నుండుట వ్యవసాయదారు లెఱిగియె యుందురు. అందు జరుగుచున్న రాసాయనిక మార్పుల వలననే ఈయుష్ణత వుట్టుచున్నది.

నేలకు పైనిచెప్పినట్లు గలుగు ఉష్ణత ఉష్ణవాహనత (conduction)చే పైవాయువునకును, క్రింది నేలకును ఉష్ణప్రచారత (Radiation) వలన పైవాయువునకును పోవుచుండును. నేలయందలి తేమ యావిరియై పోవునపుడు కొంతయుష్ణత ఆవిరియొక్క అంతర్గతోష్ణతగా మారును.

సస్యమేమియు లేని నేల పగలు త్వరలో వేడియెక్కును. రాత్రి లందు శీఘ్రముగ జల్లబడును. కావున నట్టి నేలలందు, సస్యముచే గప్పబడిన నేలలందు కంటె ఉష్ణోగ్రతా సంచారము (Range of temperature) హెచ్చుగా నుండును.

తారతమ్యోష్ణత (specific heat) ను బట్టి కొన్ని నేలలు మరికొన్నిటికంటె త్వరలో వేడియెక్కును. తక్కువ తారతమ్యోష్ణతగల నేలలు శీఘ్రముగ వేడియెక్కును. నేలల తారతమ్యోష్ణతను వాని తూనికనుబట్టియే గాక ఆయతనమును బట్టి గూడనిర్ణయింపవచ్చును. ఈరెండు విధములుగ నిర్ణయింపబడు తారతమ్యోష్ణతకును గొన్ని టివిషయములో భేదముండును.

1 పౌనుజలము శ 10. వేడియెక్కుటకు వలయునుష్ణత 1 త్రీసుకొనినయెడల

1 పౌనుస్ఫటికము శ 10

„

.18 మాత్రమే అయియుండును.

దీనినిబట్టి తూనికచొప్పున స్ఫటికముయొక్క తారతమ్యోష్ణత. 18 అని చెప్పబడును.

ఆయతనమునుబట్టి చూచినయెడల

1 ఘనపుటడుగునీరు 1°శ. వేడియొక్కటకు వలయునుష్ణము 1 అనుకొనుడు.
1 ,, స్ఫటికము 10శ. ,, .5 మాత్రమే అయియుండును.

కావున ఆయతనము చొప్పున స్ఫటికముయొక్క తారతమ్యోష్ణత .5 అని చెప్పబడును.

ఇట్లు తూనికనుబట్టియు, ఆయతనమునుబట్టియు నిర్ణయింపబడిన నేలల యందలి కొన్ని పదార్థముల తారతమ్యోష్ణతను ఈ క్రింద వివరించెదము.

	తూనికచొప్పున	ఆయతనముచొప్పున
నీరు	1.00	1.00
హ్యూమన్	0.47	0.58
బంక మన్ను	0.25	0.56
సీమసున్నము	0.20	0.56
స్ఫటికము	0.18	0.50

పైపట్టివలన తూనికప్రకారము ఆయాపదార్థముల తారతమ్యోష్ణతయందు విశేష భేదము లున్నను ఆయతనమును పట్టి చూచినయెడల వాని తారతమ్యోష్ణతయం దంతగా భేదము లేదని తెలియును.

నేల పొడిగా నున్నప్పుడు తడిగా నున్నప్పటికంటె శీఘ్రముగా వేడియెక్కును. నేలకంటె నీరు తక్కువ తారతమ్యోష్ణత గల దగుటయే దీనికి కారణము. పొడిగానున్నప్పుడు అన్ని నేలలలోను నల్లనేలలు మిగుల త్వరితముగ వేడియెక్కును. నేల జలపూరితమై యున్నప్పు డన్ని నేలలును ఈ నీ విషయమునందు సమానమే.

ఉష్ణప్రచారతయందు గొంచె మించు మించుగా నన్ని నేలలును సమానములే. నున్నని నేలలనుండి కంటె నున్నగాలేని నేలలనుండి యుష్ణత శీఘ్రముగ ప్రసరించును. తడినేలలనుండి కంటె పొడినేలలనుండి శీఘ్రముగ ప్రసరించును.

క్రింది నేలయొక్క యుష్ణోగ్రత.

ఉష్ణప్రదేశములలో క్రింది నేలకంటె పై నేల యుష్ణతరముగ నుండును. శీతలప్రదేశములందు పై నేలకంటె క్రింది నేలయే యుష్ణతరముగా నుండును. కాలభేదములవలనను, రేయింబవళ్ల వలనను గలుగు నుష్ణతాభేదములు నేలలలోగొంత లోతు వరకే గలుగును. అక్రింద వానివలనిభేదములు గానరావు. బొంబాయిలో¹¹ అడుగులలోతున నేల యెల్లప్పుడును ౪.830 ల యుష్ణోగ్రత గలిగియుండు నని నిర్ణయింపబడెను. క్రింద నేలలోనికి వేళ్లు దిగునస్యములకు దాని యుష్ణోగ్రతకూడ ననుకూలముగ నుండవలెను.

నేలయందలి లవణములు.

(SALT IN THE SOIL)

సామాన్యముగా నేలయందు ఉద్భిజ్జముల యాహారద్రవ్యములు, పలువిధము లగు లవణములుగా నుండునని వెచుకటి యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. ఈ లవణములలో గొన్ని నేలయందలి తేమలో గరగియుండును. ఇట్లు కరగియుండు వానిలో కొంతభాగము నుద్భిజ్జములవేళ్లు తీసికొనును. కొంత నేలలోని కింకునీటితో వర్ష కాలములో గ్రిందికి పోవును. ఇట్లుపోవు దానిలో గొంతభాగము మరల వేసవికాలములో గ్రిందినీరు పైకి కేశాకర్షణశక్తి వలన లేచునప్పుడు దానితో పైకివచ్చి నీ రావిరియై గాలిలోనికి పోవునపుడు నేలయొక్క యుపరిభాగమున నిలుచును. ఇట్లు నేలయందలి లవణములు క్రిందికిని పైకిని తిరుగుటయేగాక ప్రక్కలకు గూడ వ్యాపించుచుండును. ఈ వ్యాపకశక్తి ఉష్ణత హెచ్చుగా నున్నపుడు హెచ్చుగానుండును. ఉద్భిజ్జములవేళ్లచే దీసికొనబడుటచే గాని మరి యే కారణముచే గాని యే లవణ మెచట లోటుపడునో యచటి కా లవణము చుట్టుపట్టులనుండి విశేషముగ బోవుచుండును.

నేలల లవణ నిగ్రహశక్తి

(ABSORPTION OF SALTS BY SOILS.)

నేలలకు తమగుండ నింకుద్రావణమునుండి కొన్ని కొన్ని పదార్థములను మరికొన్నిటికంటె నెక్కువగా బట్టియుంచు శక్తి గలదు. అమ్మోనియా, విడిగ (Free) నున్నను, రిసాయన సమ్మే

శనము నుండియున్నను (Combined) నేలచే బూర్తిగా బట్టు వడును. స్ఫురితములును, పొటాసియ లవణములును గూడ నించుమించుగా బూర్తిగనే పట్టువడును. నత్రితములును, గంధ కితములును, హరిదములును సోడియ ఖటిక లవణములును అతి స్వల్పముగ మాత్రమే పట్టువడును. కావున నేయాటకాల్వలలోని నీటిని పరీక్షించిన యెడల వానిలో నమ్మోనియాగాని అమ్మోనియా లవణములుగాని, స్ఫురితములుగాని, పొటాసియ లవణములుగాని యతిస్వల్పముగానుండును. నేలయందుండు హ్యూమసు నులోహముయొక్కయు స్ఫుటముయొక్కయు ఉదజనితములును మిశ్రమ ఉదజనితకై లితములును అందలిలవణములను పట్టియుంచుటకు సాధనములు (agents). ఇవి కొన్ని పదార్థములను వానితో రసాయన సమ్మేళనము నుండకయు మరికొన్నిటితో రసాయనసంయోగము నుండియు, వానిని పట్టియుంచును.

పై విషయములను దెలిసికొనుట వలన వ్యవసాయదారుడు ఈ క్రిందియంశములను గ్రహించగలడు. అమ్మోనియాలవణములును స్ఫురితములును పొటాసియలవణములును యెరువులుగా నేలకెక్కువగా జేర్చినను అవి యందు నిలిచియుండు నేగాని క్రింది కింకునీటితో నష్టమైపోవు. నత్రితముల జేర్చినపుడు అప్పటికప్పుడు మొక్కలచే దీసికొనబడునవిగాక మిగిలినవి క్రిందికి దిగిపోవును. కావున సోడియనత్రితము మొదలగు నత్రితములు చేర్చునపుడు సస్యము అప్పటి కప్పుడు తీసికొనదగినంత మాత్రమే జేర్చుచుండవలెను.

నేలయందలి వాయుపదార్థములు.

(SOIL GASES)

నేలయందలి సూక్ష్మజీవుల వృద్ధికిని, కొన్ని రాసాయనిక వికారములకును, చెట్లవేళ్లయొద్దనున్న శ్వాసము (Respiration) నకును, కొంత అప్లజని (Oxygen) నేలలోనుండుట యావశ్యకము. నేలలోని యంతరవకాశము నాక్రమించియుండు వాయువునందలి యప్లజనియే యిందు కుపయోగపడుచున్నది. నేల జలపూరిత మయి యున్నపుడు వాయువు ప్రసరింపక పోవుటచే పై జెప్పిన వ్యాపారములు గట్టువడును. నేలలో దగినంత యంతరవకాశము లేనియెడల నందు వాయుసంచారము క్రమముగా జరుగదు. కావున నిట్టి నేల సస్యముల కనుకూలముగ నుండదు. నేలలోని వాయువునుండి యప్లజని యుపయోగపడిన కొలదిని అది పైనున్న వాయువునుండి క్రిందికి వ్యాపించును. అప్లజని యుపయోగపడుటవలన గొంత కర్బన ద్వ్యప్లజనిదము జనించును. నేలలోని వాయువునందు సామాన్యముగా నూటికి 1 మొదలు 10 వరకును కర్బనద్వ్యప్లజనిదమును 10 మొదలు 20 వర కప్లజనియు నుండును * సేంద్రియపదార్థములు క్రుళ్లుచున్న నేలలో సప్లజని తక్కువగను కర్బనద్వ్యప్లజని దము ఎక్కువగను ఉండును. నేలలోని కర్బనద్వ్యప్లజనిదము నుద్భిజ్జములు దీసికొనజాలవు.

* వాయువులో కర్బన ద్వ్యప్లజనిదము నూటికి రహగమి 4 పాళ్లును అప్లజని నూటికి 20.96 పాళ్లును ఉండును.



ఏడవ యధ్యాయము.



ఫలదత్త, వంధ్యత

(FERTILITY AND BARRENNESS)

నేలయొక్క కొన్ని బాహ్యలక్షణములనుబట్టి, యేనేల సస్యముల కనుకూలముగ నుండునో ఏది యట్లుండదో కొంతవరకు నిర్ణయింపవచ్చును. రాత్రిప్రదేశమై చెట్లుచేమి లంతగాలేక నిర్జలమయి గడ్డియైనను పట్టని నేల ఫలవంతముగ నుండ దని నిశ్చయింపవచ్చును. చదునుగానుండి జలప్రదమయి వృక్షములు మెండుగాగలిగి పచ్చిక దట్టముగ పెరుగు స్థలము సారవంతమైనదని వెంటనే గ్రహింపవచ్చును. జీవరాసులు నేలయందు మెండుగానుండుటయు, పశువులును యితరమృగములును దార్ధ్యముగనుండుటయు మంచిజాతిమొక్కలు అనగా వెంపలి కళింద మొదలగులెగుమినములు (Legumenousweeds) విస్తారముగా బెరుగుటయు, గరిక, చెంగలి మొదలగు మంచిజాతులగడ్డి పట్టుటయు మంచి నేలల లక్షణములుగా నెన్నబడుచున్నవి. జీవరాసులు తక్కువగా నుండుటయు, జంతువులు కృశించి యుండుటయు, పూచిక మొదలగు జాతుల గడ్డిమాత్రమేపట్టుటయు నేలయొక్క న్యూనతను సూచించు లక్షణములు. ఔరములు పై కుబికి తెల్లగాగాని, యొక విధమగు నల్లని రంగుగలిగి

గాని యుండి, మొక్కమోటికలు లేక బట్టబయలుగానుండు చవటి నేలలు బొత్తుగా వ్యవసాయమున కన్నము లని చూచిన వెంటనే తెలియును.

పై బాహ్యలక్షణములను బట్టి నేలయొక్క స్వభావమును గొంతవరకు గ్రహింపగలిగినను, ఆవిషయమును పూర్తిగా గ్రహించుటకు వాని నూచన చాలదు. నేలయొక్క స్వభావమును గ్రహించి యదంతవరకు వ్యవసాయార్హమో నిశ్చయముగా దెలిసికొనుటకు దాని నీక్రింది విషయములలో బాగుగ బరీక్షింప వలయును.

1. రసాయనస్థితి:—అనగా ఉద్భిజ్జములకు వలయు నేల యందలి ద్రవ్యముల వివరమును, పరిమితియు, ఆ ద్రవ్యములలో నుద్భిజ్జములు వెంటనే యుపయోగ పరచుకొనదగిన స్థితిలో నున్న భాగము యొక్క పరిమితియు.

2 నేలయొక్క లోతు.

3 భౌతిక ధర్మములు

4 క్రింది నేలయొక్క స్వభావము

5 ఉద్భిజ్జములకు హానికరము లగు ద్రవ్యముల యునికియు లేమియు, వాని స్వభావమును పరిమితియు.

1. రసాయనస్థితి

నేలనుండి యుద్భిజ్జములు తీసికొను నాహారద్రవ్యములు మూడవయధ్యాయమునందు పేర్కొనబడెను. చెన్నపురి రాజధాని యందలి ముఖ్యజాతుల నేలలలో నేది యెంతగలదో గూడ

నైడ్రజన్ ధ్యాయమున దెలుపబడెను. సాధారణముగా నేలలో నత్రజని (Nitrogen) స్ఫురత్పంచాష్టజనిదము, (Phosphoric acid P_2O_5) (పొటాష్ Potash K_2O) అను మూటి సంబంధమయిన యాహారద్రవ్యములు మాత్రమే లోటుగా నుండునని యనేక చోట్ల నేలలను రసాయనపృథక్కరణము (Chemical Analysis) చేయుటవలన దెలిసెను. రసాయనపృథక్కరణము సులభసాధ్యముకాదు. కాని యీక్రింది యుపాయమువలన పై మూడింటి సంబంధమయిన ద్రవ్యములలో నేదినేలలో లోటుగ నున్నదో కొంతవరకు నిర్ణయింపవచ్చును.

శృషీవలుడు తనపొలమునం దిదివరలో నంతటను సమానముగా నారవంతమని యనుభవమువలన నెరిగిన యొకసాధ్యమైనంత పెద్దమడినిజూచి దానిని 5 సమానభాగములుగా జేయవలెను. అందు 217వ పుటలోని షెట్టిలో జూపబడిన ప్రకారము ఒకభాగమునందేమియు యెరువువేయకయు, యొకదానిలో బైని చెప్పిన 3 ముఖ్యద్రవ్యములలో నత్రజనిగాక తక్కిన రెండును గల యెరువులను మాత్రమే వేసియు, నింకొకదానిలో స్ఫురత్పంచాష్టజనిదము గాక తక్కినవి రెండును గల యెరువులు మాత్రమే వేసియు, మరియొకదానిలో పొటాష్ గాక తక్కిన రెండునుగల యెరువులుమాత్రమే వేసియు నయిదవదానిలో నన్నియు గల యెరువులువేసియు, నేదేనిసస్యము నన్ని భాగములలోను పైరు చేయవలెను. సస్యము ఫలించువర కన్ని భాగములకును యితర

చోహదక్రియలను సమానముగానే చేయవలెను. తుద కాయా భాగములలోని సస్యముయొక్క ఫలసాయమును వేరువేరుగా దీసి తూచవలెను. ఫలసాయముయొక్క పరిమితియందలి తారతమ్యములనుబట్టి యానేలలోనే పదార్థము మిగుల లోటుగా నున్నదో గ్రహింపవచ్చును.

1. వభాగము ఏయెరువును వేయనక్కరలేదు
2. భా. $1\frac{1}{2}$ హం: † శల్యాధిస్ఫురితము (Superphosphate of bones)*
 $\frac{1}{2}$ హం. పొటాసియహరిదము (Potassium Chloride)
3. భా. 2 హం. సోడియనత్రితము (Sodium Nitrate)
 $\frac{1}{2}$ హం. పొటాసియహరిదము (Potassium Chloride)
4. భా. 2 హం. సోడియనత్రితము (Sodium Nitrate)
 $1\frac{1}{2}$ హం. శల్యాధిస్ఫురితము (Superphosphate of bones)
5. భా. 2 హం. సోడియనత్రితము (Sodium Nitrate)
 $1\frac{1}{2}$ హం. శల్యాధిస్ఫురితము (Superphosphate of bones)
 $\frac{1}{2}$ హం. పొటాసియహరిదము. (Potassium Chloride)

ఒకయుదాహరణము దీసికొందము. మొదటిభాగములో జొన్నలు 300 పౌనులును, రెండవదానిలో 350 పౌనులును, 3 వదానిలో 500 పౌనులును. నాల్గవదానిలో 550 పౌనులును, అయిదవదానిలో 600 పౌనులును, పండె ననుకొనుడు. దీనిని

† హం=హంద్రడు=. 112 పౌనులు లేక రమారమి $4\frac{1}{2}$ మణుగులు.

* ఇది యెముకలను గంధకికాస్తుమునకును రసాయనసంయోగముగలుగుట వలన నేర్పడిన పదార్థము. ఇందు ఏక ఖటికస్ఫురితము విశేషముగ నుండును. ఇది ద్విఖటికస్ఫురితము కన్నను, త్రిఖటికస్ఫురితము కన్నను మిగులద్రావణీయము.

బట్టి నేలయందు సత్రజనిసంబంధమయిన యాహారద్రవ్యములు మిగుల లోటుగనున్నవనియు, స్ఫురసంబంధమయినవియు పొటాసియ సంబంధమయినవి అంతలోటుగా లేవనియు తెలియును. దీనిని బట్టియే యెరువు పదార్థ మెంత వేయవలెనో గూడ నూహింపవచ్చును. ఈవిషయమయి ముందు సవిస్తరముగ చర్చింపబడును.

ఒక యినుపగొలుసు నందలి లంకెలలో మధ్యనొకటి మాత్ర మరిగిపోయి తక్కిన వన్నియుమిగుల బలముగానున్నను ఆ గొలుసు నే దేని పని కుపయోగించినపు డది యాలంకెవద్ద తెగకమానదు. కావున గొలుసులో నొక్కటితప్ప తక్కిన లంకె లన్నియు నెంతబలముగానున్నను దానియుపయోగ మా బల హీనముగ నున్న లంకె ననుసరించియే యుండును. ఇట్లే నేలలో నుద్భిజ్జములకు పలయు నాహారద్రవ్యములలో నొకటిమాత్రమే తక్కువగనుండి తక్కినవన్నియు విశేషముగా నున్నను పంట యొక్కపరిమితి తక్కువగానున్న ద్రవ్యముయొక్క పరిమితినిబట్టియే యుండును. కావున కృషివలుడు నేలలో నే ద్రవ్యములు లోటుగనున్నవో కనుగొని వానినిమాత్రమే యెరువులరూప మునజేర్చినయెడల దక్కిన పదార్థము లన్నియుగూడ నుపయోగపడి తగినంత ఫలము వచ్చును.

సాగుబడియం దున్న నేలయందలి యాహారద్రవ్యముల పరిమితి యెరువులువేయుట మొదలగు నుపాయములవలన

వృద్ధిపొందింపబడనియెడల నవి క్రమముగా తగ్గును. ఇట్లు తగ్గుటకు కారణములు ముఖ్యముగా మూడయియున్నవి.

1. వ్యవసాయదారులు యేటేట సస్యములను పైరుచేసి వానిఫలమును పొలమునుండి దూరముగా గొనిపోవుట మొదటిది. 26'6 పౌనుల (382 కుం) వడ్లును అంతే బరువుగల గడ్డియు పండిన యెకరముభూమిచుండి 26. 2 పౌనుల సత్రజనియు, 16. 3 పౌనుల స్ఫురత్పంచాష్టజనిదమును 28.1 పౌనుల పొటాష్ను పోవు నని లెక్కవేయబడెను. ఇట్లే తక్కిన సస్యములును వాని వాని స్వభావమునుబట్టియు పంటయొక్క పరిమితినిబట్టియు. గొంతకొంత సారమును దీసివేయుచుండును (రెండవభాగములోని 3 వ యధ్యాయము చూడుడు.)

2. వర్షపునీటిలో నేలయందలి యాహారద్రవ్యములందు గొంతకొంతకరగి సస్యముయొక్క వేళ్లకందకుండు నంత లోతునకు బోవుట రెండవకారణము. ఇట్లు పోవుదానిలో గొంత మరల క్రిందినీరు కేశాకర్షణశక్తిచే పైకివచ్చునపుడు దానితో బైకివచ్చును. అమ్మోనియాను, దానిలవణములను, స్ఫురతములను, పొటాసియ లవణములను పట్టియుంచుశక్తి నేలకుగలదని వెనుకటియధ్యాయమున వ్రాయబడెను. కావున స్ఫురత్పంచాష్టజనిదమును పొటాష్ను, అమ్మోనియాహపకముగగాని దానిలవణములుగ గాని యుండునత్రజనియు, నేలనుండి యంతగా క్రిందికిపోవు. సత్రజనియుగనున్న సత్రజనిలో చాలభాగమిట్లు

నష్టముగును. ఇదిగాక కొంతసారము విస్తారమువర్షము గురిసి నపుడు ప్రవాహముగా నేళ్లలోనికిని నదులలోనికిని పోవు నీటితోపోవును. ఇట్టినష్ట మేటవాలుగానుండు కొండప్రదేశముల లో నెక్కువగానుండును.

3. నేలలయందు తేమయెక్కువయి వాయుసంచారము లేనిచో నందలి ద్రవ్యములు కొన్ని నిరుపయోగముగాని హానికరముగాని యగు ద్రవ్యములుగా మారును. ఇందుకు నేల యందలి కొన్ని సూక్ష్మజీవులు గారణములయియున్నవి. నత్రజని సంబంధమయిన పదార్థములే యిట్లు విశేషముగ నష్టముగు నవి. ఇది నేలయొక్క సారముతగ్గుటకు మూడవకారణము.

నేలకు కొన్ని సారపదార్థములు యెరువులు వేయుటవల ననేగాక మఱి కొన్నివిధముల స్వభావసిద్ధముగనే కొంతవరకు జేరుచుండును.

ఊరుములు మెరుములతో వర్షముగురియనపుడు వాయువు నందలి నత్రజని విద్యుచ్ఛక్తిచే జలముతో రసాయనసంయోగమునొందుటవలన నత్రికామ్లమేర్పడి వర్షపునీటితో నేలపై బడును. ఇట్లు వర్షపునీటితో నేలకు జేరిన నత్రజని 1888 వ సంవత్సరములో సుమారు యెకరమునకు 4 పౌను లుండునని యు 1889 వ సం. లో 2.1 పౌనులుండు ననియు చెన్నపురిలో శాస్త్రజ్ఞులచే నిర్ణయింపబడెను. వాయువునందలి అమ్మోనియా యును, అందు దేలుచుండు మరికొన్ని పదార్థములును గూడ వర్షపునీటితో నేలకు జేరును.

నేలయందలి కొన్ని నూత్నజీవులు వాయువునుండి సత్రజనిని దీసికొని జనుము, ఉలవ మొదలగు లెగూమినజాతుల మొక్కలవేళ్లయందుజేర్చును. వీనివేళ్లు నేలలో జీకుటవలన నందలి సత్రజని వృద్ధియగును. ఈవిషయమయి ముందు మరి కొంత వ్రాయబడును.

నీటిపారుదల వలన గూడ నేలకు కొంతసారము జేరును. వర్షకాలపు ప్రారంభమున ప్రవాహజలములో కొన్ని సారపదార్థములు వండలిరూపమున నుండును. కొన్ని పదార్థములు ఆనీటిలో కరగియుండును. ఇవియన్నియు సస్యములకు పెట్టబడు. నీటితో నేలకుజేరి దానిని కొంతవరకు సారవంతముగ జేయును. నూతినీటిలో గూడ కొన్ని సారపదార్థములు గలవు. వానియందలి నీరు సస్యముల కుపయోగింప బడునపుడు ఈ పదార్థములు నేలయందు జేరును. రెండవభాగము, 6 వ యధ్యాయమున నీవిషయమయి మరికొంత వ్రాయబడును.

నేలయందు సస్యములకు వలయు నాహారద్రవ్యము లన్నియు నున్నను అవి ఉద్భిజ్జములు తీసికొన దగినస్థితిలో నుండని యెడల వానిప్రయోజన ముండదు. సాధారణముగా నేలలలో సస్యముల కనేకసంవత్సరముల వరకు సరిపోవు నాహారద్రవ్యములుండిను. కాని యందు స్వల్పభాగమే యుద్భిజ్జములు దీసికొన దగిన స్థితిలోనుండును. దీనికి సిద్ధాహార మని

(Available plant food) పేరు. ఉద్భిజ్జములు దీసికొనలేని స్థితియందున్న ద్రవ్యములు గుప్తాహారములేక సాధ్యాహారము (Dormant plant food) అనబడును. ఇది క్రమ క్రమముగా వాయువు, శేమ, ఉష్ణత మొదలగువాని శక్తిచే మొక్కలుతీసికొనగల స్థితిలోనికి మారుచుండును. ఇట్లు గుప్తాహారద్రవ్యములు విశేషముగానుండి క్రమక్రమముగా సిద్ధాహారము గాకున్న యెడల యెరువువేయని నేలలు 2, కిసంవత్సరములలో నే పనికి మాలినవి కావలసియుండును. అనేక సంవత్సరములనుండి యెరువు లేక పోయినను కొలదియొ గొప్పయో పంటలు పండుచున్న నేల లనేకములుగలవు.

దుక్కి మొదలగుపను లీమార్పునకు సహాయకారులు. నేలయొక్క రసాయనస్థితిని బాగుపరచుటకు, అనగా ఆహార ద్రవ్యముల లోటులేకుండను, వానిలో తగినంతభాగము సిద్ధాహారముగా నుండునట్లును చేయుటకు యెరువులువేయుటయు, దుక్కి మొదలగుపనులను బాగుగ నెరవేర్చుటయు ముఖ్యసాధనములు. ఆహారద్రవ్యముల నిట్లు వృద్ధిచేయుటయే గాక యవి పైని వివరింపబడిన విధమున నష్టముగాకుండ సాధ్యమయినంతవరకు జాగ్రత్తపెట్టవలెను.

2. లోతు

నేల తగినంతలోతుగా నుండనియెడల నందలి యుద్భిజ్జము లవేళ్లు క్రిందికిదిగి యాహారమును స్వేచ్ఛగా సంపాదించుకొను

టకుదగినయవకాశముండదు. మూమిడి, కొబ్బెర మొదలగు పెద్ద వృక్షములు లోతుగావేళ్లనుపాతుకొని నిలుచుటకు వీలుండదు. కావున చిన్న మొక్కలేగాని పెద్ద చెట్లు పెరుగజాలవు. నేల తగినంతలోతు లేనియెడల దానిభౌతికధర్మములును అనుకూలముగ నుండవు. లోతు లేని నేలలు త్వరలో వేడియెక్కును. త్వరలో జల్లబడును. వానికి జలధారణశక్తి తక్కువగనుండును. ఇందువలన తేమత్వరలోనే యిగిరిపోవును.

సామాన్యముగా జన్మస్థానికము లగు నేలలలోతు తక్కువగనుండును. ఇందుకు గారణమునవ యధ్యాయమున నూచింపబడెను. పొలమునకు దగిన గట్లువేసి నేలసాధ్యమునంత సమముగానుండునట్లు చేయుటవలన నందలిమన్ను వర్షముచే గొట్టుకొని పోకుండజేయుటయు, సమీపమున చెరువులుగాని కాల్వలుగాని, యున్న యెడల వానినుండి వండలి మన్ను తోలుటయు నేలయొక్కలోతును హెచ్చించుటకును లోతు కృమ కృమముగా తగ్గకుండగ చేయుటకును ముఖ్యోపాయములు. బాగు చేయదలచిన పొలము ప్రక్కనేదేని ప్రవాహమున్న యెడల వర్షకాలము మొదట దానికడ్డముగా గట్టువేసి బురదతోగూడిన నీటిని నేలపైకిమరలించి బురద నేలపైబడునట్లు చేయుటలోతు తక్కువ నేలలను బాగుపరచుటకు మరియొక యుపాయము.

3. భౌతికధర్మములు.

నేలయొక్క భౌతికధర్మములు దానియందలి మంటిరేణు

పుల పరిమాణమును వాని యిమిడికను అనుసరించియుండు నని
6- వ యధ్యాయమున వ్రాయబడెను. బంక నేలలయొక్కయు
ఇసుక నేలలయొక్కయు ముఖ్య భౌతికధర్మములును వానియను
కూలతాప్రతికూలతలును గూడ నక్కడ సూచింపబడెను. ఆ
రెండు తరగతుల నేలల మంచి చెడ్డలును దెలుపుట కావిషయ
ముల నన్నిటినిజేర్చి యిచట సంగ్రహముగా వ్రాయనగును.

బంక నేలలు :— జలధారణశక్తిహెచ్చుగానుండుటయు,
నందుబెరిగెడి యుద్భిజ్జముల కుపయోగించునట్లు కొంతలోతున
నున్న తేమ సయితము కేశాకర్షణశక్తివలన బైకిరా గలుగుట
యు, వాయువునుండి తేమ నాకర్షించు శక్తిని హెచ్చుగాగలిగి
యుండుటయు నందు వేయబడు యెరువులలోని సారమును
క్రిందికి వడిసిపోకుండ బట్టియుంచుశక్తిని విస్తారముగ గలిగి
యుండుటయు బంక నేలల ముఖ్యానుకూలధర్మములు. ప్రతికూల
ధర్మములలో నీక్రిందివి ముఖ్యములు, జలనిర్గమనము *
(Drainage) బాగుగనుండకపోవుటవలన నేల వర్షముగురిసిన
వెనుక చాలకాలమువరకు జలపూరితమయి యుండి వాయు
ప్రచారము గ్రమముగా నుండదు. వాయుప్రచారము సరిగా
నుండనియెడల నేలయండలికొన్ని యావశ్యకములగు వ్యాపా
రముల గట్టుపడుననివెనుక వ్రాయబడెను. దుక్కి మొదలగుపనులు
బంక నేలలందు సులభముగా జరుగవు. కొంచెముతేఘ్న యెక్కు
వగానున్న యెడల నున్న పనిముట్ల కంటుకొనును. కొంచె మారి

* నీరు వడిసి పోవుట.

పోయినయెడల పెద్దపెద్ద గడ్డలుగా పగులును. బంక నేలకు జన్న చిన్న నానజడులవలని యుపయోగ మంతగా నుండదు. వర్షము విస్తారము గురిసినయెడల చాలరోజులవరకు దుక్కి మొదలగు పనులకు వీలుకాదు. ఇందుచే విత్తనములు చల్లుట యాలస్యమగును. తడిసి యెండినపుడు బీటలుదీయుట యీ నేలలకు మరియొక లక్షణము. ఇట్లు పగులుటచే నందు బెరుగు చుండు మొక్కలవేళ్లు తెగును. కేశాకర్షణశక్తి హెచ్చుగ నుండుటచే గొన్ని బంక నేలలలో గ్రిందనుండు హానికరములగు ద్రవ్యములు నీటితో బైకివచ్చి యీ నీ రావిరియై గాలి లోనికి బోగా నవిమాత్రము పైనినిలుచుటచేనట్టి నేలలు ఊసర క్షేత్రము లగును. బంక నేలలలో బాష్పీభవన మెక్కువగుటచే వాని యుష్ణోగ్రత తక్కువగ నుండును.

ఇసుక నేలలు:—ఇసుక నేలలు కొద్దివర్షమువలననే నాని దుక్కికి త్వరలో ననుకూల మగును. వర్ష మెక్కువైనను త్వరలో నారి దుక్కికి త్వరలో నదునగును. ఇందుచే నీ నేలలలో ముం దుగా విత్తనములు చల్లుటకు సాధ్యమగును. ఇసుక నేలలలో జల నిర్గమనము (drainage) బాగుగ నుండుటచే వాయుప్రసారమున కవరోధముండదు. స్నిగ్ధత దక్కువగుటచే మొక్కలవేళ్లు నేల లోనికి నుభువుగా దిగును. దుక్కి మొదలగు పను లిసుక నేల లందు నులభముగా జరుగును. ఇందుచేతనే బంకమంటికంటె నిసుకయే బరువయినదైనను, ఇసుక నేలలు దేలిక నేలలు (Light

soils) అనియు, బంక నేలలు బరువు నేలలు (Heavy soils) అనియు బిలువబడుచున్నవి. ఇసుకనేలలోని తేమలో, బంక నేలలోని తేమలోకంటె నెక్కువ భాగము దానిపై బెరుగు నుడ్చిజ్జములు దీసికొనదగిన స్థితిలోనుండును. పైని చెప్పిన విసుకనేలల మంచి లక్షణములు. ఇక వానిలోపములను పేర్కొనెదము. ఇసుకనేలలకు జలధారణశక్తి దక్కువగుటచే నందలి సస్యములు బాగుగ పెరుగుటకు తరుచు వర్ష మయినను గురియవలెను. లేక తగినంత నీరుపెట్టనైనను పెట్టవలయును. కేశాకర్షణశక్తి తక్కువగుటచే గ్రిందినీరు పై కంత గారాదు. ఈనేలలకు వాయువునుండి తేమ నాకర్షించుశక్తియు దక్కువయే. ఎరువులు మొదలగువాని మూలముగ నేలకు జేర్చబడు సారపదార్థములను గ్రిందికి వడిసిపోకుండ బట్టియుంచు శక్తి యిసుకనేలలకు దక్కువ. కావున తరుచు యెరువు వేయనియెడల నీనేలలు బాగుగ ఫలింపవు. కావుననే యీనేలలకు 'ఆకలి' నేలలు (Hungry soils) అను పేరుగూడ వచ్చెను.

గరువనేలలు అన్నిధర్మములందును యిసుకనేలలకును బంకనేలలకును మధ్యస్థముగా నుండును. కావున నవి వ్యవసాయమునకు మిగుల ననుకూలములు.

బంకనేలల భౌతికధర్మముల సీక్రిందియుపాయములచే గొంతవరకు బాగుపరచవచ్చును.

1. తగినంత యిసుక కలుపుట:—ఇందువలన నేలయొక్క

స్నిగ్ధత (జిగట) తగ్గును. విస్తార మిసుకపోసినగాని ప్రయోజనము లేదు. పొలము సమీపమున నిసుక విస్తారముగా దొరకు చోటు వదైన నున్న యెడల దానినుండి యిసుకతోలి సులభముగా నట్టి నేలను బాగుపరచవచ్చును. క్రింద సమీపమున నిసుకపొరగల నేలలలో లోతుగా దున్నినయెడల పై బంకమన్నును క్రింది యిసుకయు గలిసి నేల గుల్లబారును.

2. సున్నము వేయుట:—సున్నము వేయుటవలన బంక నేలల స్నిగ్ధతకు మూలకారణమగు బంధకమృత్తిక మొదలగు బంధనపదార్థముల శక్తితగ్గి మిగులమృదువుగనుండు కొన్ని కొన్ని మంటిరేణువు లొక్కొక్క మిశ్రమరేణువుగా నేర్పడుటవలన నేల గుల్లబారి దాని భౌతికధర్మములు బాగుపడును. సామాన్యముగా నెకరమునకు 1 - 2 టన్నుల సున్నము వేయవలసియుండును. మిగుల జిగటగ నుండు నేలలలో 5 - 6 టన్నులవరకు వేయవచ్చును. ఈసున్న మంతయు నెక్కేసారి వేయుట మంచిది కాదు. 4-5 సంవత్సరములవరకు ప్రతిసంవత్సరమును గొంతకొంత వేయుచు రావలెను. మొదట నేలనుడున్ని దానిపై 16 లేక 20 గజముల దూరమున కాల్చినసున్నము చిన్నచిన్న పోగులుగాబెట్టి కొంచెము మన్ను చేగప్పవలెను. తరువాత నీపోగులమీద నీరు చల్లినయెడల నాకాల్చినసున్నము ముగ్గును. ఈముగ్గును పొల

మంతటను సరిగాచల్లి తేలికయైన పండ్లచట్టము * (Harrow) నీడ్చినయెడల మంటితో గలసిపోవును. సున్నము చల్లినతర్వాత లోతుగాదున్నగూడదు. సున్నమునకు బైనివేసినప్పటికి క్రిందికి దిగు స్వభావముగలదు. కాన లోతుగా దున్నినయెడల మరింత లోతునకుబోయి నిరుపయోగ మగును.

సున్నము వేసిన నేలలలో గొన్ని రసాయన వికారములుగలిగి యందలి సాధ్యాహారద్రవ్యములలో నెక్కువభాగము సిద్ధాహార మగును. కావున సున్నము వేసిననేలలలో బంటలు గొన్ని సంవత్సరములవరకు బాగుగపడును. కానియాహారద్రవ్యములందు యిట్లు గొన్ని త్వరలోనస్యములచే దీసికొనబడుటచేతను, కొన్ని క్రిందికింకునీటిలో గరగి నస్యముల వేళ్ల కందనంత లోతునకు బోవుటచేతను కేల కొన్ని సంవత్సరము లగునప్పటికి సారహీనమగును. కావుననే యింగ్లీషున “సున్నము తండ్రిని ధనవంతునిగను కొడుకును దరిదుర్నిగను జేయు”నని యర్థమిచ్చు సామెత యొకటిగలదు. సున్నము చేర్చబడుటచే నేలనుండి త్వరలోనప్తమయిపోవు ముఖ్యద్రవ్యము నత్రజని. కావున తగినంత నత్రజనితోగూడిన నేంద్రియపదార్థములు నేలయందులేనిదే సున్నము వేయగూడదు. విస్తారము నేంద్రియపదార్థముగల ‘పీటి’ నేలలలో సున్నము వేయుట వలన నందలి కొన్ని నేంద్రియామ్లముల (organic acids.)

* రెండవభాగపు 2 వ. యధ్యాయముచూడుడు.

యష్టుత్వముపోయి నేల సస్యములకు మిగుల ననుకూలమగును. ఈరాజధానిలో నీలగిరిమొదలగు శీతలప్రదేశములలో దక్కమరెండును సేంద్రియపదార్థము సున్నమువేయ దగినంతలేదు. కావున సామాన్యముగా సున్నముచువాడుట మంచిదికాదు.

3. మంటినికాల్చుట:— బంక నేలను బాగుగదాన్ని లేక శ్రవ్వి మంటిని పోగులుపోగులుగాచేసి, యేదైనకంప, ఆకులలములువేసి కాల్చి, తిరుగ నామన్నును నేలపై జిమ్మినయెడల దాని భౌతికధర్మములు గొంతవరకు బాగుపడును. ఇదియెగాక యందలి యాహారద్రవ్యముల ద్రావణీయత హెచ్చును. కాని సేంద్రియపదార్థము నశించుటచే నత్రజని నష్టమయిపోవును. కాల్చిననేలలోని నత్రజని నష్టమయినప్పటికిని అందు సస్యములు వెనుకటికంటె బాగుగ బెరుగుట చాలచోట్ల చూచుచున్నాము. దీని కీమధ్య నొకకారణము గనిపెట్టబడెను. నేలయందలి సూక్ష్మజీవులలో గొన్ని సస్యముల కనుకూలమగువ్యాపారములను నెరవేర్చును. మరికొన్ని వీనినివిస్తారము వృద్ధికొండకుండ జేయును. నేలను కాల్చుటచే సస్యముల కనుకూలమగు సూక్ష్మజీవులు నశించినను వానిసిద్ధబీజములు (Spores) అన్నియు నశింపవు. కాని తక్కినసూక్ష్మజీవులును వానిసిద్ధబీజములునుగూడ నశించును. తగినస్థితిగతులు సమకూరునపుడు సస్యముల కనుకూలమగు సూక్ష్మజీవుల సిద్ధబీజములు మొలచి సూక్ష్మజీవులయి విరోధులులేమిచే ముచుపటికంటె నతివేగ

ముతో వృద్ధిబొంది, సస్యముల కనుకూలము లగు మార్పులను నేలయందు గలుగ జేయును. కావున కాల్చుటవలన బంక నేలల భౌతికధర్మములు బాగుపడుటయేగాక సస్యముల కనుకూలమగు మార్పులను గలిగించు నూత్నజీవులు వృద్ధిబొందును.

మంటిని కాల్చుటకు దగినంతకంప సామాన్యముగా లభించుట దుర్లభము. నేలయందలి నత్రజనికూడ నష్టమయిపోవును. కావున సామాన్యముగా విస్తారము యెరువు వేయుటకు పీలగు చిన్న చిన్న తోటమట్ల నారుమట్ల మొదలగువానియందలిమన్ను మాత్రమే అప్పుడప్పుడు కాల్చుబడుచుండును. మంటినికాల్చుట వలన నందలి గడ్డిమొదలగువాని విత్తనములును, గొన్ని హానికరములగు పురుగులునుకూడ నశించును.

నేలచుదున్ని కొంత లోతువరకుగల మంటినంతను కాల్చు లేకపోయినను పైమంటినైన దగినపనిముట్లతోగోకి పోగుచేసి పైజెప్పినట్లు కాల్చి మరల సర్దినయెడలగూడ గొంతవర కుపయోగముగా నుండును.

4. సేంద్రియపదార్థముజేర్చుట:—హ్యూమసు జేర్చుటవలన బంక నేలయొక్క స్నిగ్ధత తగ్గునని వెనుకటి యధ్యాయమునందు వ్రాయబడెను. బంక నేలకు సేంద్రియపదార్థము జేర్చుటచే నందు హ్యూమసుజనించి దానిని గుల్లపరచును. నేలకు సేంద్రియపదార్థము జేర్చుటవలన మరెకొన్ని లాభములుగూడ గలవు.

హ్యూమనునకు తేమ నాకర్షించుశక్తి విశేషముగా గలదు. కావున సేంద్రియపదార్థముజేర్చిననేలలో హ్యూమను వృద్ధియయి అందువలన వాయువునుండి తేమనాకర్షించుశక్తి హెచ్చును. సేంద్రియపదార్థము నేలలో జీకునపుడు జనించు కర్బనద్వ్యమజనిదము నేలయందు గొన్నియుపయోగములగు రసాయన వికారములను గలిగించి సిద్ధాహారమును వృద్ధిజేయును. సేంద్రియపదార్థము జీకునపుడు పుట్టు ఉష్ణతచేతను, హ్యూమను యొక్క తారతమ్యోష్ణత హెచ్చుగ నుండుటచేతను నేల అంతగా నుష్ణోగ్రతా భేదములనొందక తగిన యుష్ణోగ్రతను గలిగి యుండును. సేంద్రియపదార్థము జేర్చుటవలన నేలకు గొన్ని యాహారద్రవ్యములుగూడ జేరుటచే దాని రసాయనస్థితి గూడ గొంతవరకు బాగుపడును.

నేలకు సేంద్రియపదార్థమును జేర్చుటకు నాకు లలములు మొదలగు నేచెత్తనైన బోగుచేసి వేయవచ్చును. బంక నేలలకు జీకని చెత్తయే వేయవలెను. చెత్త నేలలోనే చీకుటచే గలుగు లాభములు పైని బేర్కొనబడెను.

జనుము మొదలగు విశేషముగా రొట్టపెరుగునట్టియు 'లెగుమినము' లలో జేరినట్టియు, పైరులను సాగుచేసి పైరు బాగుగ నెదిగి పూతకొమ్మమీద నున్నపుడు నేలలో

గలియదున్నుట నేలకు సేంద్రియపదార్థము జేర్చుటకు మరి యొకయుపాయము. ఇట్లు చేయుటకు, 'పచ్చియెరువువేయుట' (Green manuring) యనిపేరు. నేలలోనికి దున్ని వేయబడు రొట్టకు 'పచ్చియెరువు' (Green manure) అనిపేరు.

కొన్ని సంవత్సరములు నేలను బీడుగా వదలివేయుట మరి యొకపద్ధతి. ఇందువలన గడ్డిపెరిగి పశువులుతినగా మిగులుగడ్డియు, దానివేళ్లను నేలలోజీకును. మేయు పశువుల మల మూత్రములుగూడ నందు జేరుచుండును.

నేలపై దగినవృక్షములను బెంచి రాలినయాకులను దీసి వేయక యందే క్రుళ్లనిచ్చుట యింకొకపద్ధతి.

విలువగలనేలలను నేలతక్కువగానున్నచోట్లను బీళ్లుగా గాని యేవైనెఫలితమురాని చెట్లనుబాతిగాని వదలుటచే ప్రస్తుతలాభములేకుండుటచే కృషివలుల కట్టుచేయుటకు గొంతకష్టముగా నుండవచ్చును. అట్టివిషయములో మొదటిరెండుపద్ధతులే యనుకూలములు.

5. జలనిర్గమనము బాగుగజరుగునట్లు చేయుట:—వెనుకటి యధ్యాయములో బంకనేలలందు జలనిర్గమనము క్రమముగా జరుగనియెడల దానిన్నిగ్ధత హెచ్చుగానుండుననియు నుష్ణత తగ్గిపోవుననియు వాయుసంచారము జరుగదనియు నాహార పదార్థద్రవములు మిగుల బలుచ నగుననియు దుక్కి మొదలగు పనులకు వీలుగ నుండదనియు వ్రాయబడెను. నేలయం దుద్భి

జములకు వలయుదానికంటె నిక్కువ తేమ లేకుండ జేయుటవలన నీ యనర్థములు మానును.

నేలపైని వర్షము గురిసినపుడు నీరు నిలువకుండ జేయుటకు “ఉపరిజల నిర్గమన” (Surface Drainage) మనిపేరు నేలలోని కింకునీరు క్రిందికి శీఘ్రముగ వడిసిపోయి నేలయందు సస్యములకు దగినంత తేమమాత్రమే యుండునట్లు చేయుటకు ‘అధోజలనిర్గమనము’ (Under-drainage) అనిపేరు.


ఉపరిజల నిర్గమనమునకు నేల చదునుగాను, ఒకవైపునకు గొంచెము వాలుగను ఉండవలెను. ప్రక్కనేదైన పల్లముగ నున్నయేరు గాని మరుగుకాల్వగాని యున్నయెడల దానిలోనికి పైసీరు ప్రవహించునట్లు బోదులుత్రవ్వట మంచిది. ఇట్టి కాల్వలు దూరముగానుండునపుడు రైతు లందరును జేరి యుమ్మడికాల్వలనుగూడ ద్రవ్వించుకొనవలసియుండును. ఇందుకుతగిన యొకమత్యము రైతులలో లేనియెడల నందరును నష్టమును బొందవలసియుండును.

సామాన్యముగా మంచి నేల లనిపించుకొను నేలలన్నిటి యందును అధోజలనిర్గమనము బాగుగ నేయుండును. ఏ నేల యందుగాని అధోజలనిర్గమనము బాగుగ లేకపోవుటకు గారణమీ దిగువ నాలుగింట నేదేని కావచ్చును.

1. పైనేలకు గొంచెము క్రిందుగా నేదైన రాతిపొరగాని బంకమంటిపొరగాని యుండి నీటిని క్రింది కింకనీయకపోవుట.

2. క్రిందినేల మిక్కిలి బంకనేలయగుట.
3. క్రిందినేల చట్టుకొనిపోవుట.
4. రాతిపొరగాని బంకమంటిపొరగాని కొంతలోతుగనే యున్నను క్రిందికింకునీరు మరింత పల్లవుప్రదేశమునకు ప్రవహింప వీలులేకుండ నాగట్టిపొర క్రిందిపటములో జూపబడిన ప్రకారము తొట్టెవలెనుండుట.

87-వ పటము.




A నేలపైమట్టము

B రాతిపొర

C అంతర్భూమిజలముయొక్క మట్టము.

ఇందు నాల్గవకారణముచే జలనిర్గమనమునకు నిరోధము గలిగినయెడల జేయవలసిన పనిలేదు. కొంచెము లోతుననే రాతిపొరగాని చట్టుగాని యుండియది మిగుల దళముగా లేని యెడల దానిలో గుల్లగానుండు క్రిందిపొరలోనికి నీరుదిగునట్లక్కడక్కడ సూతులవంటి కన్నములు చేయుటవలన జలనిర్గమనము గొంతవరకు బాగుపడును.

38-వ పటము.



A మంటిపొర

B బంకమంటిపొర (చట్టు)


C ఇసుకపొర

X X త్రవ్వినకన్నములు.

క్రింది నేల మిగుల బంకగా నుండుటచే జలనిర్గమనమున కవరోధముగలిగినయెడల నా నేలలో నక్కడక్కడ 3-4 అడుగులలోతు ను అంతే వెడల్పును గల యూటకాల్వలను ద్రవ్వవలెను. అట్లుత్రవ్వటచే నా నేలయొ దధికముగా నుండు తేమ యీ కాల్వలలోని కూరును. ఈ యూటకాల్వలన్నిటియందలి నీరు నేడేని పల్లముగనున్న మురుగుకాల్వలోనికి బోవునట్లు జేయునెడల నేలయొక్క జలనిర్గమనము బాగుపడును.

పొలమునందక్కడక్కడ నూటకాల్వలుండుట చుక్కమొదలగుపనుల కడ్డుగానుండును. ఇట్టియడ్డు గలుగకుండ నొకపని చేయవచ్చును. ఊటకాల్వలలో నేవైన పెద్ద పెద్ద రాళ్లుగాని కర్రముక్కలుగాని గుల్లగానమర్చి పైని మన్నుగప్పినయెడల నారాళ్లయొక్కగాని కర్రలయొక్కగాని సందలలోనికి నీరూరి మురుగు కాల్వలోనికి పోవును. పై నేల చదునుగానుండుటచే వ్యవసా

89. వ పటము.



1. తెరచియున్న యూటకాలవ.
2. రాళ్లు వేసికప్పిన యూటకాలువ.
3. కర్రలు వేసికప్పిన యూటకాలువ.

యవుపనుల కడ్డుడను. అయినను ఈవద్దతిలో గొంత కాలమునకు రాళ్లయొక్కగాని, కర్రలయొక్కగాని మధ్యసందులు మృదువగు మన్ను కూడుకొనుటచే బూడి వెనుకటివలెనే జలనిర్గమమునకు నవరోధము గలుగును.

ఇట్లుగాకుండ నైరోపాఖండమున మరియొకయుపాయము గనిపెట్టబడి వాడుకలోనున్నది. పైచెప్పిన కాలువలలోనే కాల్చబడిన మంటిగొట్టముల నమర్చి దానిపై మన్ను వేసికప్పినయెడల నాకాల్వల మధ్యప్రదేశమందలి యూటసి రీగొట్టములలోని కూరి వానిగుండ మురుగుకాల్వలలోనికి బోవును. గొట్టములు మంటితో జేయబడుటచే నవి సచ్చిద్రము (Porous) గా నుండును. కావుననే చుట్టుప్రక్కలనుండి నీరు వానిలోని కూర గలుగును.

గొట్టములను నేలయందమర్చువిధానము 40-వ పటమువలన తెలియును. సామాన్యముగా పెద్దకాలువలు, చిన్న కాలువలు

చిన్న గొట్టములలోని నీరు పెద్దగొట్టములలోనికి వ్రస
హించి తుదకు మురుగుకాల్వలోనికి పారును. చిన్న గొట్టముల
వాలు నూరు అడుగులకు 3 మొదలు 6 అంగుళముల వరకుండ
వచ్చును. ఒక యెకరములో నిట్లు గొట్టములు వేయుటకు సైదాపే
టలో నడున తట్టుబడి యాకీర్ంది విధముగ నుండెను.

రు. అ. పై.

చిన్న కాల్వలు త్రవ్వట (30 అడుగుల కొ క్కటి, 4 అడుగుల లోతు)	7 4 0
పెద్ద గొట్టపు కాల్వలు త్రవ్వట	1 8 0
కాల్వలను చదును చేయుట	1 0 0
2 అంగుళముల గొట్టములు 1400	12 8 0
4 అంగుళములు 225	3 10 0
గొట్టములు పొలముమీదికి జేర్చుట	1 6 0
గొట్టములమర్చి కప్పట	1 8 0
ఇతర తట్టుబడులు	1 12 0
మొత్తము	<u>30 8 0</u>

ఇది రమారమి 25 సం. క్రిందటి లెక్క. ఇప్పుడు యెకరము
నకు 40, 45 రూపాయలు కావచ్చును.

నేలయందు తేమ యెక్కువగ నుండుటనలని స్వముల
నారవయథ్యామమున వ్రాసియుంటిమి. ఇచట జలనిర్గమనము
బాగుపరచుటచే గలుగులాభములను పేర్కొనెదము.

జలనిర్గమనము క్రమముగనున్న నేలయందలి యంతరవకాశములో తేమ తగునూత్రమే యుండుటచే వాయుప్రచారము సరిగానుండును. ఉష్ణోగ్రత హెచ్చును. త్వరలోదున్ని విత్తనములు చల్లుట కనుకూలస్థితియందుండును. అందు పెరుగు మొక్కల వేళ్లు లోతుగా పోవుటచే నీటిలేమి గలిగినపుడు కొంతవర కోర్చి యుండును. ఎరువులు వేసినపుడు వానియందు జరుగవలసిన మార్పులు క్రమముగా జరుగుటచే వానియుపయోగము హెచ్చును. హానికరము లగు లవణములు క్రిందికిపోవును.

పైని వివరింపబడినట్లు నేలయందు కాల్యలుత్రవ్వ గొట్టములమధ్యవద్దతి పైదాపేటలో 4, 5 సంవత్సరములు పరిశోధింపబడెను. కాని గొట్టములు వేయుటయందలి లోపముచే గాబోలు నవి శీఘ్రకాలములోనే పూడిపోయి నేల కంతగా ప్రయోజనము గలుగలేదు. కావున నీవద్దతి యీదేశమున నింకను బాగుగ పరీక్షింపబడి యుపయోగముగ నుండునని నిశ్చయింపబడువరకును రైతులు దాని నవలంబించుట మంచిది కాదు. ఇప్పుడు పూసా వ్యవసాయాన్వేషణాస్థానమందు ఈవిషయమయి పరిశోధనలు జరుగుచున్నవి.

7. లోతుగా త్రవ్వట లేక దున్నుట:—బంక నేలలను లోతుగా దున్నుటవలనగాని త్రవ్వటవలనగాని వాయువును ఉష్ణమును బాగుగ ప్రసరింపజేయుటచే కొన్నికొన్ని రాసాయనికమార్పులు గలిగి మిశ్రిమయణపు లేర్పడుటవలన

స్నిగ్ధత తగ్గును. స్నిగ్ధత తగ్గినయెడల నితర ప్రతికూల ధర్మములును మారును.

పైని బంక నేలలను బాగుపరచుటకు కొన్నియుపాయములు వ్రాయబడెను. ఇక నిసుక నేలల భౌతికధర్మములను బాగుపరచుటకు గొన్నియుపాయములను జెప్పెదము.

1. బంకమన్ను జేర్చుట:—కాల్వలలోను చెరువులలోను దొరకు బంకగా నుండు వండలిమంటిని ఇసుక నేలలో పోయుటవలన దాని స్నిగ్ధతహెచ్చి యితర భౌతికధర్మములును మారును. మొదటి సంవత్సరము యొకరమునకు 400 బండ్లు తోలినయెడల నేల చాలవరకు బాగుపడును. రెండవసంవత్సరము 200 బండ్లును మూడవసంవత్సరము 100 బండ్లునుగూడ తోలినయెడల శాశ్వతముగ బాగుపడును. వండలిమంటిలోసార మెక్కువయుండుటచే సామాన్యమైనబంకమన్ను పోయుటకంటె నది పోయుటవలన నెక్కువ ప్రయోజన ముండును.

2. పచ్చియెరువు వేయుట:—పచ్చియెరువు వేయుటవలన నేలయందు హ్యూమసు (Humus) వృద్ధియగును. హ్యూమసుకు బంధనశక్తి బంధకమృత్తికకంటె 11 రెట్లుకలదని వెనుకటియధ్యాయమున వ్రాయబడెను. కావున హ్యూమసు వృద్ధియగుటవలన నిసుకరేణువుల కాణ్లేష మెక్కువై స్నిగ్ధత వృద్ధియగును.

3. బాగుగ చీకెనయెరువు వేయుట:— ఇందువలనను హ్యూమసు వృద్ధియయి పైవిధముననే నేల బాగుపడును.

4. ఇసుక నేలలో బాగుగ పెరుగు సరుగుడు (Casuarina) మొదలగు వృక్షములను పెంచుట:— ఇట్లు చెట్లను పెంచి వాని క్రింద రాలిన యాకులను ఎవరును తీసికొనిపోకుండ చేయుట వలన నవియందే కృత్రిమ నేలయందలి హ్యూమసును వృద్ధిచేయును. ఇందువలన నేల క్రమముగ బాగుపడును. కొన్ని సంవత్సరము లయిన తర్వాత చెట్లను నరకీవేసి భూమిని సాగులోనికి దీసికొని రావచ్చును. చెట్లను పెంచుటవలన మొదట నేమియు ఫలితము రాకున్నను, వానిని నరకీవేసి కలపను వంటసరకుగా గాని దూలములుగాగాని, యమ్ముటవలన ఎకరమునకు చెట్లువేసినది మొదలు సంవత్సరమునకు 15 మొదలు 25 రూపాయలవరకు గిట్టును.

5. నేలపై బురదనీటిని నిలగట్టుట:— ప్రక్క నేదైన ప్రవాహమున్నయెడల దానికడ్డముగ గట్టువేసి తొలకరిని బురదతోనుండు నీటిని నేలపైకి ప్రవహించు నట్లు జేయవచ్చును. నీటిలోని బురద నేలపై వదలివేయబడువరకు నీరు నిలుచు నట్లు పొలముచుట్టును తగిన గట్టు వేయవలెను. ఇట్లు చేయుట వలన వండలిజేర్చినట్లు కొంతవరకు నేల బాగుపడును.

6. వర్షముచే నేలయందలి మృదు వగు మంటిరేణువులు కొన్నియుకూడ కొట్టుకొని పోకుండ నేలను సమము చేసి

అక్కడక్కడ గట్లువేయుటవలన కూడ కొంత యుపయోగముండును.

7. బొత్తిగా బొండుఇసుక నేల లయినయెడల వానియందలి మన్ను గాలి కెగిరిపోకుండ చుట్టును తగినకంచెలవేయుట వలన గొంతవరకట్టినేలల సాగుచేయుటకు వీలుగా నుండును. ఎరువులు మొదలగునవి వేయుచు, నీరుకట్టుచు నేలను సాగు చేసినకొలదిని అందు హ్యూమసుచేరి నేలయొక్క భౌతికధర్మములు బాగుపడును. కంచెలకుబదులుగా నవసరమైనయెడల గాలి విస్తారముగా వీచు దిశ కడ్డముగా కొంచె మెత్తయిన గట్లను వేసి వానిచాటున వ్యవసాయ మారంభింపవచ్చును. నేలను 100, 150 అడుగుల వెడల్పు గలచెక్కలుగా భాగించి యొకటివిడిచి యొకచెక్క సాగుచేయుచు మధ్య చెక్కలలో నిసుకలో పెరుగు తీగెలను పెంచుటవలన నిసుక గాలి కంతగా నెగురక మధ్య చెక్కలు వ్యవసాయమునకు గొంతవరకర్హమగును. చిరుగడము (Sweet potato) గణము (Genus) లోనిదేయగు బాల బందుకాడ (Goats foot Ipomoea - Pes-caprae) అను తీగ యీ పనికి మిగుల నుపయోగముగ నుండును. ఈ తీగ మేక పాదమువలె 2 భాగములుగ చీలియుండు దళసరియైన ఆకులు గలిగి గులాబీరంగుగల పూవులను ఉష్ణకాలములో బూయును. సముద్ర పొంతము లందు విశేషముగా గాననగును.

4. క్రిందినేలయొక్క స్వభావము.

పైనేలయొక్క భౌతికధర్మము లనుకూలముగ నున్నను క్రిందినేలయొక్క భౌతికధర్మములుగూడ ననుకూలముగ లేని యెడల నందు సస్యములు అభివృద్ధి నొందవు. సామాన్యముగా పైనేల యెట్టిదైన సస్యముల కనుకూలమో క్రిందినేలగూడ నట్టిదే యగుట మంచిది. పైనేల యిసుకనేల యయినయెడల క్రింది నేల యింతకంటె జగురుగా నుండుట మంచిది. ఇట్లున్నయెడల పైనేలకు జలధారణశక్తియు, లవణధారణశక్తియు లేని లోపము కొంతివరకు కూడివచ్చును. పైనేల బంకనేలగా నున్నయెడల క్రిందినేల యిసుకనేలగా నుండుట మంచిది. అధోజలనిర్గమము క్రమముగ జరుగుచుండుటచే ఇట్లున్నయెడల పైనేలయొక్క జలధారణశక్తి ఎక్కువనుండుటవలని లోపము అంతగా కనబడదు. క్రిందినేలయొక్క రసాయనస్థితిగూడ బాగుగ నుండుట సస్యముల వృద్ధి కావశ్యకము. ఏలయన సస్యములలో ననేకజాతులవేళ్లు 8 అంగుళములకంటె లోతునకు పోవును. అచటగూడ నాహార ద్రవ్యములు తగినట్లున్నయెడల నట్టినేలలందు సస్యములు బాగుగ నెదిగి ఫలించును. అధోజలనిర్గమమునకు అవరోధములలో క్రిందినేల చట్టుకొనుట యొకటి యని వెనుక వ్రాయబడెను. అధోజలనిర్గమము క్రమముగ జరుగనియెడల కలుగు నష్టములును వెనుక వ్రాయబడెను. క్రిందినేల చట్టుకొనినయెడల చెల్లవేళ్లు క్రిందికి దిగనేరవు. కావున క్రిందినేల చట్టుకొని యుండుట సస్యములకు పలువిధముల ప్రతికూలము.

చట్టులలో నవి యేర్పడు విధమునుబట్టి కొన్ని భేదములు గలవు. నేలయందు లోహికామ్లజనిదము విస్తారముగానుండి యది క్రిందికి దిగి యచటి మంటి రేణువులను బంధించి రాతివలె జేయుటవలన నేర్పడు చట్టు ' ఇరుపచట్టు ' (Ferruginous pan) అనబడును. సున్నము విస్తారముగగల నేలలలోగాని, యెరువుగ నైనను భౌతికధర్మములను బాగుపరచుటకై నను విస్తారముగా వేయబడిన నేలలోగాని అది పైవిధముననే మంటిని గట్టిగా బంధించుటచే నేర్పడుచట్టు, ' సున్నపుచట్టు ' (Calcareous pan) అనబడును. ఎల్లపుడును ఒకేలోతువరకు దున్నుచువచ్చుటచే నాగలి యడుగుభాగముయొక్క యొత్తుడుచే క్రిందినేల చట్టుకొనవచ్చును. ఇట్లేర్పడినచట్టు ' దుక్కిచట్టు ' (Plough pan) అనబడును.

క్రిందినేల యేవిధమునగాని చట్టుగొనినపుడు జలనిర్గమమును బాగుపరచు మార్గములు ఇదివరలోనే వ్రాయబడెను.

5. హానికరములగు పదార్థములు నేలయందుండుట.

నేలయందు వృక్షముల కావశ్యకము లగు నాహారద్రవ్యములు సత్రితములు, మొదలగు కొన్ని లవణము లని యిదివరలో వ్రాయబడెను. కొన్ని నేలలందు వృక్షముల కావశ్యకములగు లవణములే గాక, అనావశ్యకములును, కొన్ని యెడల హానికరములును నగునవిగూడ నుండును. ఒకానొక పరిమితి కంటె నెక్కువగ నున్నయెడల నావశ్యకములగు లవణములే

యొనను హానికరములుగ నుండును. ఏ లవణము లయినను నేల యందలి నీటిలో కరగిపోయినట్లయితే నూటికి రెండుపాళ్లకంటె నెక్కువగ నున్న యెడల నందు సస్యములు పెరుగవు. హానికరము లగు లవణము లంతకంటె మిగుల స్వల్పముగ నున్నను సస్యముకు చెరువు కలుగును. హానికరము లగు లవణములలో సోడియం కార్బొనేట్ మును, (Na_2CO_3) సోడియం హైడ్రేట్ మును (NaOH) సోడియం గంధకీతమును (Na_2SO_4) ముఖ్య మయినవి.

నీటిలో సోడియం కార్బొనేట్ ము మిగుల హానికరమైనది. చాకలివాండ్రు బట్టలను శుభ్రపరుచుట కుపయోగించుటకుగాను పోగుచేయు చవటిమంటిలో నిది విశేషముగా నుండును. దీనికి ఉద్భిజ్జముల వేళ్లను మాడ్చి వేయు గుణము గలదు. బాగుగ పెరుగుచున్న మొక్క మొదట నీ లవణమును కొంచెము పోసినచో నది మొదలు చీకి చచ్చును. ఈ లవణముగల నేలలో విత్తనము మొలవక క్రుల్లిపోవును. నేలయొక్క స్నిగ్ధత యీ లవణమువలన హెచ్చి జలనిర్గమనము నూగిపోయి భౌతిక స్వభావము చెడిపోవును. సోడియం హైడ్రేట్ ము హానిని కలుగజేయు విషయములో సోడియం కార్బొనేట్ ము తరువాతిది. ఇది నేలయొక్క భౌతిక ధర్మములను పాడుచేయదు.

సోడియం గంధకీదము నూటిలోను తక్కువ హానికరమైనది. 1895-96 సంవత్సరములలో డాక్టరు వోయెల్కర్ (Dr. Voelker) అను శాస్త్రజ్ఞుడు చేసిన ప్రయోగముల వలన సోడియం కార్బొనేట్ ము

నితము నేలయందు నూటికి .2 పాలుకంటె నెక్కువగ నున్న యెడల నందు సస్యములు బాగుగ పెరుగ వనియు .4 పాలుకంటె నెక్కువగ నున్న యెడల నం దేసస్యమును పెరుగనే పెరుగదనియు నిర్ణయింపబడినను. సోడియహారిదము కొన్ని సస్యముల విషయములో నూటికి .2 పాలువరకున్నను హాని కనుపడలేదు. కాని కొన్నిటిలో .1 పాలున్నను హానిగలిగెను. సోడియగంధకిదము నూటికి .5 పాలువరకున్నను హాని కలుగలేదు. విత్తనముల మొలకను గూర్చినప్రయోగములో నూటికి .7 పాలు కర్బనితముగాని, గంధకితముగాని హానికరముగ నుండెను. హారిదము .4 పాలేయున్నను హానికరముగ దోచెను. విత్తనముల మొలకయం దైనను తగు వాత పెరుగుటయం దైనను, పై లవణములవలన పైరు డిలవ, పెసర, మొదలగు పైరపంటలకు, జొన్న వరి మొదలగు తృణ సాస్యములకంటె నెక్కువహాని కలిగెను. కావుననే కొంతవఱకు నరిపంట పండినను, కొన్ని నేల లందు పైరపంటలు బొత్తిగా పండవు. సోడియకర్బనితము నేలలో నుండు హ్యూమసుతో సమ్మేళనమయి యొకనల్లని పదార్థముగ నేర్పడునుగాన సామాన్యముగా సోడియ కర్బనితము విస్తారముగల చొటి నేలలపై దేలు చొడు కొంచెము నల్లగ నుండును. ఈ చొటికినల్లచొడు (Black alkali) అనియు, తక్కినదానికి తెల్లచొడు (White Alkali) అనియు పేర్లు.

నేలయందలి లవణములకు వ్యాప్తశక్తి (Diffusibility) అనగా అందలి నీటిలో గరిగి అన్నిప్రక్కలకును వ్యాపించుశక్తి.

గలదని 211-వ పుటలో వ్రాయబడెను. ఈవ్యాపకశక్తి సోడియ కర్బనితమునకు మిగుల తక్కువ. తక్కినరెంటికి ఈశక్తి యెక్కువగాగలదు. కావున సోడియగంధకీతముగాని హరిదముగాని మాత్రమేగల చౌటినేలలో నొకప్పుడు సస్యములు పెరుగకపోయినను, మరియొకప్పుడు వర్షము బాగుగా కురియుటవలనగాని, నీరు తగినంత పెట్టబడుటచేగాని నీలవణములు చుట్టుప్రక్కల నుండు భూములకు వ్యాపించుటచేతను క్రింది కింకు నీటితో పోవుట చేతను చౌడుతగ్గి సస్యములు కొంతవరకు పెరుగవచ్చును. నల్ల చౌటిలో నట్లుగాదు. అందలి సోడియకర్బనితమునకు వ్యాపకశక్తి లేకపోవుటచే నొకప్పుడు సస్యములు పెరుగకపోయినచో నేదేని యుపాయమువలన నా లవణము యొక్కపరిమితిని తగ్గించనియెడల నం దెప్పటికీని సస్యములు పెరుగవు.

చౌటినేలలను బాగుపరచుటకు యత్నించువారు ముందు అందలి ద్రావణీయలవణములు హానికరములగునంతవరకు కూడు కొనుటకు కారణములెవ్వయో తెలిసికొనవలెను. కావున నీవిషయమయి యిచటగొంత వ్రాయసగును. సామాన్యముగా, నేలయందలి ద్రావణీయలవణములు కొంతభాగము సస్యముచే దీసికొనబడుటచేతను, కొంతభాగము క్రింది కింకు నీటితో పోయి మరల పైకిరాకుండుటచేతను తరుగుచుండును. వాయువు ఉష్ణత మొదలగుపానిశక్తిచే అద్రావణీయము లగు లవణములు క్రమక్రమముగా ద్రావణీయము లగుటచే నీకొరత దీరు

చుండును. అధోజలనిర్గమము బాగుగ లేని నేలలలో లవణములు క్రిందికి పోనేరవు. కావున మొక్కలుదీసికొను లవణములు మాత్రము కొంతవరకు తరిగి తక్కినవి క్రమక్రమముగా వృద్ధి పొందును. కావున అధోజలనిర్గమము బాగుగ లేకపోవుట నేల చౌటినేల యగుట కొకకారణము. కొన్ని పల్లవునేలలలోనికి లవణములు ఎత్తుప్రదేశములనుండి ప్రవహించు సీటితో కొట్టుకొనివచ్చుటచే కూడుకొనును. కావుననే చౌటినేలలను సామాన్యముగా పల్లవుప్రదేశములందే గండుము. అధోజలనిర్గమమునకు వీలున్నను తగినంత వర్షము కురియనియెడల లవణములు వృద్ధిచెందవచ్చును. ఇట్టిచోట్ల సధోజలనిర్గమముగూడ బాగుగ లేకపోయినయెడల వేరుగ జెప్పనక్కరలేదు. సంయుక్తరాష్ట్రములలోని చౌటినేలలు చాలవర కిత్తేర్పడినవే యని శాస్త్రజ్ఞులయభిప్రాయము. నేలలు చౌటినేల లగుటకు వాని పుట్టుకకు కారణము లగు శిలల రసాయన సంఘటనమునందే హానికరములగు లవణములు విశేషముగానుండుట కారణమై యుండవచ్చును. వర్షము విస్తారముగా కురియుచోట్లగల చౌటి నేలల కిదియే కారణమని యూహింపబడెను. కొన్ని నేలలలో పైనేలయందు హానికరములగు లవణములు విశేషముగా లేకున్నను క్రిందినేలలో నివి విశేషముగా నుండవచ్చును. ఇట్టినేలలు నీరుపెట్టిన: పిమ్మట మరల నెండినయెడల కేశాకర్షణశక్తి వలన క్రిందితేమ పైకి వచ్చి తనతో క్రిందినేలలో కూడుకొని యున్న హానికరము లగు లవణములనుగూడ పైకి దీసికొనవచ్చు

ను. నీరావిరియై పోవుటచే నీలవణములుమాత్రము నేల పైభాగమున దిగబడును. కావున నిట్టి నేలలకు నీరుకట్టుటయందు జాగ్రత్తగ నుండవలయును. కడప కర్నూలుకాల్వ ప్రియోజనకారి కాకపోవుటకు దానివలన సాగుబడిచేయదలచిన నేలలో కొన్ని పైని చెప్పినట్టి వగుటయే కారణ మని నిశ్చయింపబడెను.

చౌటి నేలలను బాగుపరచుటకు తగిన పద్ధతిని గనిపెట్టుటకు నిదివరలో ననేక ప్రయత్నములు చేయబడెను. కాని యనుకూలమైన సాధన మింకను లభింపలేదు. అయినను ఈ క్రిందవివరింపబడిన పద్ధతులలో నాయా స్థితిగతుల కనుకూలమయినవాని నవలంబించుటచే వానిని కొంతవరకు బాగుపరచవచ్చును.

1. నేలయొక్క యుపరిజల నిర్గమమును అధోజలనిర్గమమును బాగుపరచుట:—ఇందుకు దగినసాధనములు వెనుక వ్రాయబడెను.

2. కేశకర్షణశక్తిచే పైకి నీరు విశేషముగా వచ్చి క్రింది నేలలోని లవణములను పైకితేకుండ నీక్రిందివనుల జేయుట:—

(a) నేలను 8 అంగుళములలోతువరకు వర్ష కాళాంతమున దున్నిగాని, త్రవ్విగాని గుల్లగాచేయుటచే కేశనాళికలవిభంజనమువలన క్రిందినీరు పైకంతగా రాదు. పైనేల యెండి క్రింది వానికి కప్పుగా నేర్పడును.

(b) ఉష్ణత కేశాకర్షణశక్తిని హెచ్చించును. కాన నేల కుష్ణము తగులకుండ నేదైన యాకులములతో గప్పటయు లేక చాటినేలలలో పెరుగునట్టియు నేలను కప్పియుండు సస్యము లేవేనియు వేసవిలోపైరుచేయుటమంచిదిలూసర్న (Lucerne) అను గుర్రములకు మేతగా నుపయోగించు సస్యమిందు కనుకూల మని అమెరికామున్నగు దేశములలో కనుగొన బడెను. మనదేశమునకేది యనుకూలమో కనుగొనవలెను.

3. పరిగడ్డి తాటియాకులు మొదలగు మోటుగనుండు స్థూలపదార్థములు నేలలోవేసి దున్నుట:—ఇందువలన నేల గుల్లయి యధోజలనిర్గమము బాగుపడుటచేతను, కేశాకర్షణశక్తి తగ్గుటచేతను ఉపరిభాగమునందలి లవణముల పరిమితి తగ్గును.

4. క్రుళ్లుటవలన యష్టముల నిచ్చుచినుసులను నేలయందు వేయుట:— చింతరొట్ట కాడజెముడు వేపపిండి, ఊక, మిరప గింజలు, కాయధాన్యములపొట్టు మొదలగువాని కిట్టిస్వభావముగలదు. ఇవి నేలయందు జీకునపు డేర్పడునష్టములు అందలి హానికరము లగు లవణములతో సంయోగమునొంది వానిని కొంతవరకు నాశనముచేయును.


5. తోళ్లుబాగుచేయుశాలలలోనీ తుక్కువేయుట:—తోళ్లును బాగుచేయబడుట కుపయోగింపబడి త్రోసివేయబడు తంకే

దుచెక్క మొదలగువానిలో 'తానినము' (Tannin) అనబడు నొకవిధ మగు సేంద్రియపదార్థముండును. దీనికి నేలయందలి హానికరము లగు లవణములతో రసాయనసంయోగమునొంది వాని వినాశనముచేయు శక్తి గలదు.

6. విస్తారమునీటితో చౌటిని కడగి వేయుట:—సామాన్యముగా చౌటి నేలలను సాగుజేయువారు దాళువాసాగు చేయుటవలన చౌటి నేలలు కొంత బాగుపడు నని యెరుగుదురు. నేలనుండి చౌడు వేసవి కాలములోనే విస్తారముగ పొక్కును. ఆకాలములో నేలకు నీరుపెట్టి తేమ యారిపోకుండచేయుటచే క్రింది నేలయందు లవణములు పైకి రాకుండుటయేగాక కొంత వరకు పైవికూడ క్రిందికి దిగును. దాళువా సాగుచేయుటవలన నీ పనియే జరుగుచున్నది. కావున దాళువా సాగుచేయుటచేగాని ఊరక విస్తారము నీరుపెట్టి అనీటిని గొట్టివేయుచు నేల యారి పోకుండ చేయుటచేగాని చౌటి నేలలను గొంతవరకు బాగు పరుచవచ్చును. తగినంతనీరు లభించునెడల నిదియే మంచి యుపాయము.

7. చౌడు స్వల్పముగాగలనేలలో చోడి, మొదలగు కొన్ని సస్యములు కొంత వరకు ఫలించును. కావున నట్టి నేలలను 4-వ పటములోజూపిన విధమున నొరకట్టి చౌటి నేలలో పెరుగు సస్యములను సాగుచేసినయెడల చౌడు క్రమముగా

41-వ పటము.



తగ్గవచ్చును. కాలువల త్రవ్వ ప్రదేశముల శిఖరములందు కొబ్బరిచెట్లను వరుసగా పాతవచ్చును. రెండు ప్రక్కలను అంతరములుగా మల్లకట్టి చోడియూడ్చవచ్చును. మళ్లపైగురియు వర్షమును వానిలోని లవణములును కాల్యలలోనికి వడియించుండును. ఈకాల్యలలోని నీరేదైన మరింతఁజల్లపుప్రదేశములోనికి పో వీలున్నయెడల నేల శీఘ్రముగనే బాగుపడును.

8. నేలను బీడుగావదలి యందు పెరుగు గడ్డిని పశువులు మేయకుండ జాగ్రత్తపెట్టుటవలన నీ గడ్డి యందే చీకుచు. మరల పెరుగుచుండుటవలన కొన్ని సేంద్రియామ్లములు జనించి. లవణములతో రసాయనసంయోగము నొందుటచే వానిని కొంతవరకు నశింపజేయును. ఇట్లు నశించిన కొలదిని గడ్డియు విస్తారముగా పట్టును. అక్కడక్కడ తుమ్మ మొదలగు చౌటి నేలలలో పెరుగు చెట్లను పెంచుటవలన వాని యాకులు రాలుట వలనగూడ కొంత సేంద్రియపదార్థముజేరును.

9. నేలకు ఇసుక విస్తారముచేర్చుట : ఇందువలన నేలయందు జలనిర్గమము బాగుపడి లవణములు క్రిందికి వడిసిపోవును. నేలయొక్క యితరభౌతికధర్మముగూడ బాగుపడును. ఇసుక సమీపమున విస్తారముగ లభించు నెడల నిదియొక మంచిపద్ధతి.

10. సోడియకర్బనితము విస్తారముగల నేలలకు ఖటిక Xంధకీతము (Calcium Sulphate or Gypsum) చేర్చుటచే

సోడియగంధకీతమును, ఖటిక కర్బనితమును ఏర్పడును. సోడియ కర్బనితముకంటె సోడియ గంధకీతము తక్కువహానికర మగుటచే దీనివలన కొంతలాభము గలుగును. ఖటిక గంధకీతము 1, 2 టన్నులవరకు వేయవచ్చును. కాని యిందుకు తట్టుబడి యెక్కువగును. సామాన్యముగ లాభించదు.

11. ఖటికనత్రితమువేయుట:— ఖటికనత్రితము జేర్చిన యెడల నది నేలయందలి హానికరములగు లవణములతో గలియుటవలన ఖటికకర్బనితము, ఖటికగంధకీతము ఖటికహరిదమును, సోడియ నత్రితమును ఏర్పడును. ఇంచేదియు హానికరముగా కుండుటయేగాక సోడియనత్రితము సస్యములకు మిగుల ననుకూల మగు నాహారద్రవ్యము. కావున ఖటికనత్రితము నేలకు తగినంత జేర్చుటవలన నేలయందలి చౌడు పూర్తిగా నశించును. కాని నేటివరకు ఖటికనత్రితమును వ్యవసాయదారులకు సులభవెలకు లభింపజేయుటకు తగిన యుపాయ మేమియు కనిపెట్టబడలేదు. ఈవిషయమయి యింకను ప్రయత్నములు జరుగుచున్నవి. ఈప్రయత్నము కొనసాగుట చౌటినేలలు గలవారి యదృష్టము.

చౌటినేలలను బాగుపరుచుటకు తగిన యుపాయములను గనిపెట్టుట దొరతనమువా రింకను చాలకృషి చేయుచున్నారు. కొద్దికాలములోనే ఏదైన మంచిసాధనము దొరక్కవచ్చును.

ఆయా ప్రదేశములందలి చౌటినేలలలోని హానికరములగు లవణముల పరిమితి యాక్రిందిపట్టివలన దెలియును.

	బల్లారి		తిర్న త్వేలి	శివగంగ	ఉత్తరహిందూస్థానమునందలి ముజఫరుపూరు
	1	2			
ఫోషియర్బనితము.007	.143	.132	3 .071
,, గంధకీతము.	.312	.219	.100	.061	1 .407
,, హరిదము	.364	.277	.010	.261	.076

దీనినిబట్టి చెన్న పురి రాజధానిలోని చౌటి నేలలు ఉత్తర హిందూస్థానమునందలి వానియంత చెడ్డవికావని తెలియును. పై యంకెలనుబట్టి ఖిటికనత్రితము మొదలగు పదార్థములు నేల కెంతెంత చేర్చవలయునో గూడ లెక్క వేయవచ్చును.



ఎనిమిదవ యధ్యాయము

—•—•—•—

వ్యవసాయ ప్రారంభము.


‘చెట్టులేనిచేను చుట్టములేని ఊరు.’

‘చెనికి గట్టు ఊరికి కట్టు.’

‘కంచెవేసిన నే పొలము.’

‘చెడ్డనేల అయినా ఏకఖండముగా నుండవలెను.’

బంజరునేలను సాగుచేయుటకు మొదటనందుండు చెట్లను పొదలను నరికివేసి, పుట్టలను త్రవ్వి, దానిని సాధ్యమయినంత వరకు చదును చేయవలెను.



A-A నేలయొక్క స్వభావసిద్ధమైనవాలు

B-B

C-C

D-D

E-E

చదునుగా చేయబడిన అంతస్తులు.

ఇట్లు చదును * చేసినపొలమును పిమ్మట తగినంత పరిమాణముగల చేలుగావిభాగించి గట్లు వేయవలెను. అక్కడక్కడ చేనికిని చేనికిని మధ్యడపరిజలనిర్గమమునకు బోడ్డులుకు బోదులను త్రవ్వవలెను. ఇందున కనుకూలముగ నుండునట్లు నేలయొక్కవైపునకు కొంచెము వాలుగ నుండుట మంచిది.

నేల కొండప్రదేశములందువలె నెక్కువ వాలుగా నున్న యెడల దాని నీప్రక్కపటములో చూపినట్లు అంతస్తులుగా (Terraces) జేయవలెను. (42-వ పటము చూడుడు.)

నేలయందు పెద్దపెద్దవృక్షము లున్న యెడల వానిలో నేవి నరకుట తప్పదో వానినిమాత్రమే నరకవలెను. తక్కినవి సాధ్యమయినంతవరకు చేలమండల (Borders) లోనికివచ్చినట్లు పొలమును విభాగింపవలెను. పొలమునం దక్కడక్కడ వృక్షము లుండుటవలన వ్యవసాయదారునికి కొంతకలపయు, వంట నరకును లభించుటయేగాక పశువులకును పనివాండ్రకును నీడ దొరకును. వానియాకులు రాలుటచే నేలకు కొంత సేంద్రియపదార్థము చేరును. కొన్నికొన్ని జాతుల చెట్లయాకులును కాయలును పశువులకును మనుష్యులకును నాహారముగ

* సామాన్యముగా నేలనిట్లు శుభ్రపరుచుట కందలి పొదలదట్టమును బట్టియు, నేలయొక్క యెత్తుపల్లములను బట్టియు పనివాండు సులభముగ దొరకుటను దొడ్లకపోవుటను బట్టియు ఎకరమునకు 10 మొదలు 25 రూపాయలవరకగును. సామాన్యముగా నిందు చాలభాగము కొట్టివేయబడు కలప నమ్ముటవలన వచ్చును.

నువయోగపడును. చెట్లు మెండుగాఁగల ప్రదేశములందు వర్షములు మెండని శాస్త్రజ్ఞుల యభిప్రాయము. చెట్లుచేమలు విస్తారముగ గల ప్రదేశముల సమశీతోష్ణముగ నుండును.

కృషీవలుడు నేలను మొదట నిట్లు శుభ్రపరచినపిమ్మట నందు పశువులకును పనివాండ్రకును తనకును నివాసమునకుతగిన సాలలును ఇండ్లును కట్టవలెను. పండిన పంటదినుసులను జాగ్రత్త పెట్టుటకు తగిన కట్టడములనుగూడ కట్టవలెను. తగిన చెరువులను నూతులను త్రవ్వించి సస్యములకును పశువులకును మనుష్యులకును వలయు నీటివసతుల నేర్పరచవలయును. *

వ్యవసాయదారుడు తన పొలముమీదనే నివసించియుండి తనపశువులను పనివాండ్రను అచటనే యుంచుట యనేకవిధముల మంచిది. ఊరిలోనివసించుచు దూరముననున్న పొలమునందు వ్యవసాయము జరుపుచున్న యెడల రాకపోకలందు కొంతకాలము వృధాయగును. పనివాండ్రు సరిగా పనిచేసిరా లేదా

* నూతులు చెరువులు మొదలగు వాని నిర్మాణమును గూర్చి రెండవ భాగమున వ్రాయబడును. వ్యవసాయదారుడు నివసించుటకు కాల్చిన యిటుకతోను, మంటి బెండడితోను కట్టబడి నున్న పుగచ్చు చేయబడిన గోడలుగలిగి కప్పునకు తాటి కలప ఉపయోగింపబడిన పెంకుటింటి కది యాక్రమించుకొను స్థలమును బట్టి చతురపు టడుగునకు రమారమి 1 రూపాయి చొప్పున నగును. తాటియాకు పశువులసాల కొది యాక్రమించుకొను ప్రతిచ అడుగునకు 1 మొ. 1½ అణా చొప్పునను పెంకుటి పశువులసాలప 6 మొదలు 8 అణాల చొప్పునను అగును.

యని శ్రద్ధగా కనుగొనుట కంత వీలుగా నుండదు. పశువులను పోలమునుండి యింటికిని యింటినుండి పోలమునకును తోలు కొని వచ్చుచుండుటయందు కొంతకాలము వృథా యగుటయే గాక వాని మలమూత్రములలో కొంతభాగము పోలమునకు జేరక నష్టముపొవును. ఇంటివద్ద పశువుల మలమూత్రములను జాగ్రత్తపెట్టినను, ఎరువు నచటినుండి పోలములోనికి తోలుటకు విశేష శ్రమ పడవలెను. పంటదనుసులును, గడ్డియు పోలమునుండి యింటికి త్రోలుటయందును విశేషప్రయత్నయాసలు గలుగును. వ్యవసాయదారుడును, తనపశువులును, పనివాండ్రిను పోలమునందే నివసించునెడల నీ పను లన్నియు సులభముగ నెరవేరును. ఇదియుగాక ఊళ్లనువదలి బయట నివసించుటచేత మంచివాయువును జలమును లభించి వ్యవసాయదారుడును పనివాండ్రిను ఆరోగ్యముగ నుండురు. మనదేశమునందు గోదావరిజిల్లాలో నగరం అమలాపురం తాలూకాలవంటి ప్రదేశములలోని తోలుట విశేషముగ గల కొన్ని కొన్ని గ్రామములలో కొందరు కొందరు దక్ష సామాన్యముగా కృషీవలులు తమపోలములమీద నివసించి అందువలని లాభమును సౌఖ్యమును పొందుచుండు టరుదు. అమెరికా ఇంగ్లాండు మొదలగు వ్యవసాయ మభివృద్ధిగనున్న దేశములలో కృషీవలులు పోలములందే నివసించువాడుక విశేషముగా గలదు. ఈదేశములో రైతులభూము లేకఖండములుగ నుండకపోవుటయు చొంగ

భయము మొడగుటయు వారల్గు నివసింపకపోవుటకు ముఖ్య కారణములయి యుండవచ్చును. వ్యవసాయ మభివృద్ధియయిన కొలదిని రైతుల కృషివలనను షకమత్యమువలనను, దొరత నపువారి సహాయముచేతను పై యాటంకములు తగ్గి పొలము లందే నివసింప వీలగును గాక. *


ఆవరణలు (FENCES).

పశువులనుండియు, ఇతరమృగములనుండియు దొంగల నుండియు తన సస్యములకు సప్తముగలుగకుండ కాపాడుకొనుటకు వ్యవసాయదారుడు తన పొలము చుట్టును ఆవరణ(Fence) నేర్పరుచుట మంచిది. ఆవరణలు (Fences) రెండువిధములు. ఇటుక రాయి మొదలగువానిచే కట్టబడు గోడలును, యెండు కంప, కర్రలు వీనిచే నేర్పరుపబడిన కంచెలును, రైలుస్టేషన్ (Railway Stations)ల వద్దను, కచ్చేరీల (Offices) వద్దను మనముచూచు ఇనుపకమ్మలతోను, తీగలతోను ఏర్పరు పబడు ఆవరణలును ఒకవిధముననువి. వీనిని నిర్జీవావరణలు (Dead fences) అనవచ్చును. సీమచింత, † గోరింట,

* రైతులపొల మంతయు నొకచోటనుండక ననేక చీలికలుగా నక్కడక్కడ యుండుటవలని ప్రతికూలతను గనిపెట్టి జపాన్ జర్మనీ మున్నగు కొన్నిదేశముల పరిపాలకులు పొలముయొక్క విలువను గమనించి యొకరి పొలము నొకరికి మార్చుటవలన సాధ్యమయినంతవరకు ప్రతిరైతుపొలమును ఏకఖండముగ నుండునట్లేర్పరుచుచున్నారు.

† సీమచింతకట్టవను పెంచుటకు మొదట కట్టవన్నేయవలసినచోట 1½ అడుగు లోతును, అంతే వెడల్పునుగల కాల్యత్రవ్వి కొన్నాళ్లుంచి పిమ్మట దానిలోనుండి తీసిన మంటితోనేదేని యెరువుగలిపి మరల కాల్యలో

43-వ పటము.



వేయవలెను. ఇట్లు పూడ్చిన చోట నీమచింతగింజలను తొలకరిలో 2, 3, అం గుళముల కొక్కటివోపున రెండువరుసలుగ వేయవలెను. 43-వ పటము (2, 4). చూడుము. ఆ సంవత్సరపు వేసవిలోను మరుచటి సంవత్సరపు వేసవిలోను అప్పుడప్పుడు నీరుపోయియు వచ్చినయెడల కట్టవ యేర్పడిపోవును. అట్లుపై నీరుపోయి నక్కరలేదు. వచ్చిన సంవత్సరము మొదలు ప్రతియేడును చెట్లను గజమెత్తున నరకి కలపను నుటసరకుగాని యితరపనులకుగాని ఉపయోగిం

కిత్తనార, † బొమ్మజెముడు మొదలగు ముండ్లచెట్లను పొలము చుట్టును వరుసగా పాతుటవలన నేర్పడు నావరణాలు మరియొక విధమయినవి. వీనిని సజీవావరణాలు (Live fences) అనవచ్చును. పొలముచుట్టును గోడపెట్టుటగాని యినుపతీగ వేయుటగాని మిగులవ్యయముతో గూడిన వగుటచే సామాన్యముగా సాధ్యము కాని పనులు. ఇదియుగాక యినుపతీగ పశువులకును దొంగలకును దుర్లంభ్యముగాక పోవుటచే నంత యుపయోగకరముగాదు. ముండ్లతీగ వేసినయెడల నప్పుడప్పుడు పశువులకపాయకరముగ గూడ నుండును. విలువగల తోటలచుట్టును, పొలములలో పశువులును, ధాన్యపుకొల్లును ఉండునదేశము చుట్టును ఇటుకతోగాని మంటితోగాని వీలు చొప్పిన గోడలను పెట్టుట మంచిది. పొలముచుట్టును ఏర్పరుపబడు నావరణాలు శాశ్వతముగ నుండు సజీవావరణాలయి యుండుట మంచిది. ఇందుకు వీలులేనిచో నేదైన క్రరకంపలతో కంచెలు వేయు

చుకొనవచ్చును. ఒక మైలుపొడవు కట్టవ వేయుటకు 1 కుంచము సీమచింత గింజలు పట్టును. బాగుగ సెడిగిన పిమ్మట 1 మైలుపొడవు కట్టవనుండి 20 మొదలు 30 వంటసరకు లభించును. గోరింటతుమ్మ మొదలగువానిని కట్టవలుగ పెంచుటకును నిట్లే చేయవలసి యుండును.

† కిత్తనార కట్టవను పెంచుట కదిపెంచదలచినంతపొడవునను మధ్య మూడడుగుల ప్రదేశము వదలి యిరుప్రక్కలను $1\frac{1}{2}$ అడుగులలోతును అంతే పొడవున గల కొలిమి త్రవ్వి అమంటితో మధ్యనున్న 3 అడుగుల స్థలమందును 48-వ పటము 1-3 లో జూపబడినట్లు గట్టువేయవలెను ఈగట్టుమీద అడుగు అడుగున్నర కొక్కకిత్తనారపిలక పాతి కొన్నాళ్లు నీరుపోసినయెడల నవి నాటుకొని కట్టవయేర్పడును. (48 - పటము చూడుడు.)

వచ్చును. కాని యవి శాశ్వతములుగావు. ఏటేట మరల వేయు చుండవలసి యుండును. కావున సజీవావరణ లిట్టి నిర్జీవా వరణల కంటె మిగుల ననుకూలమయినవి. సజీవావరణలవలన నవి శాశ్వతముగ నుండుటయేగాక యితరలాభములు గూడ గలవు.

సీమచింత (Inga Dulcis) గోరింట (Lowsonia Alba) మొదలగు చెట్లచే నేర్పరుపబడిన కంచెలనుండి యవి బాగుగ నెదిగినప్పిమ్మట వ్యవసాయదారునికి కొంత వంటనరకు (కట్టెలు) లభించును. కిత్తనారవేసిన యెడల దానిమట్టలనుండి నార లభించును. తుమ్మ, వెదురు మొదలగునవి వేసిన యెడల వ్యవసాయదారునికి నలయు కలప కొంత కొన సక్కరలేకయే దొరకును. తుమ్మకాయలు పశువులకు మంచి యాహారమగును కొన్నికొన్ని జాతుల చెట్లయొక్క పశువులకును గొర్రెలకును మేతగా నుపయోగించును. పొలముచుట్టును నెత్తైన సజీవావరణ యున్నయెడల తుపానులయొక్కయు, వేడి గాడ్పులయొక్కయు నష్టము కొంతవరకు తగ్గును. నేల కిట్టి యావరణ లున్న యెడల నెక చేనినుండి మరియొక చేని లోనికి తెగుళ్లును, చీడ లును గూడ సంతగా వ్యాపింపజాలవు.

సజీవావరణలవలన గొన్ని నష్టములుగూడ గలవు. ఆవరణగా వేసినచెట్ల వేళ్లు పొలములోని కొంతదూరమునకు పారి యందలి సారమును లాగికొనుటచేతను, చెట్లనీడవలనను కంచె కు రెండుప్రక్కలను కొంతప్రదేశమున సస్యములు బాగుగ

పెరుగవు. అయినను కంచె కిరుప్రక్కలను, గజముదూరములో 2, 3, అడుగులలోను కాల్యవ్రేల్చినయెడల చెట్లవేళ్లుపొలము లోనికి వ్యాపింపక క్రిందికి పోవును. సస్యములు పెరుగుకాల ములో కంచెలోని చెట్లు విస్తారము యెత్తుగనుండి నీడగలుగ జేయ కుండునట్లు వానికొమ్మలను నరకివేయవచ్చును. సజీవా వరణాలు చీడపురుగులను, పక్షులను ఆకర్షించి వాని కాకరము గుటచే వానివలన సస్యముకు కొంతనష్టముప్రత్యక్షముగ గలు గుచుండును. కంచెలలో సాధ్యమైనంతవరకు తృణాదికములు (weeds) పెరుగకుండ శుభ్రముచేయుటవలన సీ నష్టము చాల వరకు తగ్గును.

సజీవావరణాల వలన పైని చెప్పినకొన్ని యవర్థములున్న ను, ఆ యవర్థములకంటె వానివలన లాభమే యెక్కువ. కావున రైతులు తమపొలముల చుట్టును సాధ్యమయినంతవరకు సజీవావరణాల నేర్పరుపవలెను.


దంపనేలలో నీరు విస్తార ముండుటచే వాని చుట్టును ఆవ రణాలుగ నుపయోగించు వృక్షములు బాగుగ పెరుగవు. ఇది గాక దంపభూములలో వలెననేక యెకరము లొకేదోట మెకే సస్యముతో నొకేసారి సాగుజేయబడి, యితరకాలములందు సస్యములేయియు లేకుండుచోట్ల బాటల ప్రక్కలనేగానిచిక్కిన ప్రక్కలను ఆవరణ యావశ్యకమై యుండదు. కావున, వరిపొల ములకు బాటలప్రక్కల మాత్రము మెరకగాగట్లను వేసి వాని

మీద కిత్తనార మొదలగువానిని పెంచవలెను. తక్కినచోట్ల నావరణలు వేసి కొంతస్థలము వానిచేనాక్రమింపజేయుటచుంచిది కాదు. మెట్టనేలలలోను, తోటభూములలోను, పొలమం దెల్ల వును పలువిధములగు సస్యములు పెరుగుచుండుటచే ఆవరణలు మిగుల నుపయోగకరము. వానిని పెంచుటయు సులభము. కావున మెట్టనేలలోను తోటభూములలోను ప్రతివ్యవసాయ దారుడును ఆవరణ నేర్పరుపవలెను. మనరాజధానిలో నొక కోయఁబుత్తూరు జిల్లాయందు తప్ప సామాన్యముగా నావరణలనేర్పరుచువాడుక లేదు. ఆజిల్లాలో కొన్నిచోట్ల సామాన్యముగా ప్రతిరైతును తనపొలముచుట్టును కంచె (నజీవావరణ) వేయకమానడు. తక్కినజిల్లాలో మిగుల విలువగలవి యగు, అరటి, మామిడి, నారింజ మొదలగుతోటలకుమాత్రమే కంచెలు వేయుచున్నారు.

బాటలు (ROADS)

విస్తీర్ణ మెక్కువగానుండి సర్వకాలములందును పని పాటలు జరుగుచు తరుచు ఎరువును పంటదనుసులును ఒకచోటి నుండి మరియొకచోటికి గొనిపోవలసియుండు పొలములలో బండ్లను, పశువులును, అన్నికాలము లందును నడచుటకు తగిన బాటలుండుట గూడ యావశ్యకము. ఈ బాటల వలన నాక్రమింపబడిన ప్రదేశము నిష్ప్రయోజనము గాకుండ నిరు


ప్రక్కలను కొబ్బెర, మొదలగు పైకెదుగు ఫలవృక్షములను పెంచుట మంచిది. ఇట్టివృక్షములు బాటయందునడచు మనుష్యులకును, పశువులకును కొంతనీడనుగూడ గలుగజేయును. సామాన్యముగా బాట నేల మట్టముకంటె $\frac{1}{2}$ గజమెత్తును 10 మొదలు 12 అడుగులవరకు వెడల్పును ఉండినచాలును. పొలములో నొకమైలు బాట యున్న యెడల దానిచేతను, దానికిరుప్రక్కలను వేయబడు చెట్లచేతను ఆక్రమింపబడు స్థలము 24 అడుగుల వెడల్పుండు ననుకొనినయెడల దానిచే నాక్రమింపబడు మొత్తపు విస్తీర్ణము రమారమి 3 యెకరములు మాత్రమే యుండును. ఇరుప్రక్కలను కొబ్బెరచెట్లను పాతినయెడల 10 సంవత్సరములలో చెట్టు 1 కి 1 రూపాయి చొప్పున ఫలితమునిచ్చు 400 వందల చెట్లకుపైగా పట్టును. అనగా బాటచేతను చెట్లచేతను ఆక్రమింపబడు ప్రతి యెకరమునకును 100 రూపాయలకు పైగా ఆదాయమువచ్చును. ప్రక్కలనేమియు వృక్షములు పెంచక వదలినయెడల బాటలచే నాక్రమింపబడిన స్థలము నిష్ప్రయోజనమగునుగాని ఇరుప్రక్కలను తగిన ఫలవృక్షములను పెంచినయెడల నెన్నడును నష్టములేదు. కావున వీలయినంతవరకు పొలములో బాటలనేర్పరచి వానివలని లాభమునుపొందుట మంచివ్యవసాయద్వారాని లక్షణము. చైతులలో తగినంత యైకమత్యమున్న యెడల నిట్టిబాటలనేర్పరచి యొకరిపొలములోని బాటను మరియొకరి పొలములోని బాట



తో కలుపుటవలన తమతమ పౌలములనుండి గ్రామములలో
నికి బండ్లునులభముగా నడచునట్లు చేసికొనుటచే, బండలలో
బరువు బండ్లులాగలేక హింసనొందు నోరులేనిపశువుల సంఖ్య
భము తగ్గును. పౌలములు చిన్నచిన్నతునకలుగా నక్కడక్కడ
చెదరియుండుటయే దీనికిని ఆటంకము. $\frac{1}{2}$ గజముఎత్తును 4 గజ
ముల వెడల్పునుగల 1 మైలు పొడవు బాటను వేయుటకు 200
మొదలు 300 రూపాయలు వరకు తట్టుబడి యగును.

సాధ్యమయినంత వరకు పైనిచెప్పినట్లన్ని హంగులును.
గలిగిన యొకపౌలము 44 పటములో చూపబడెను. అందు
పశువుల పాలలును, వ్యవసాయదారుడును పనివాల్చుడును కాపుర
ముండు ఇండ్లును ఇంచుమించుగా మధ్యనున్నవి. చుట్టును
సజీవా పరణయేర్పరుప బడినది. పశువులమేతకు బీళ్లున్నవి. వాని
చుట్టును కంచెలున్నవి. తగినబాటలున్నవి. వానిప్రక్క వీలై
నచోట్ల కొబ్బెర చెట్లు పాతబడియున్నవి. ఖోటభూములు రైతు
నివాసమునకు సమీపమున నున్నవి. మురుగుకాల్వ పౌలము
మండలలోనే యుండుటచేజలనిర్దమున కనుకూలముగ నుండును.
నీటిపారుదలకును తగిన పంటకాల్వలును బోదులును ఉన్నవి.
వ్యవసాయదారునియిల్లు పశువులసాలలు మొదలగునవి గల
దొడ్డియొక్క వివరము 45 వ పటములో చూపబడెను.

45-పటము.



వ్యవసాయవారుని యిల్లు పశువుల సాలలు మొదలగునవి గల దొడ్డి.
స్కేలు అంగుళమునకు 125 లింకులు.

ఇ. వ్యవసాయవారుని యిల్లు. కొ. కొట్టు. వం. వంటయిల్లు. నూ
నూయి. ప. సా. పశువులసాల. గ. మే. గడ్డిమేటికిప్పులము. ప. పనివాండ్ర
యిల్లు. చు. గో. చుట్టుగోడ. లొ. గో. లొపలిదొడ్డిగోడ.

తొమ్మిదవ యధ్యాయము.

—ॐ—

వ్యవసాయప్రారంభము.

సస్యములవర్గీకరణము

పరివర్తనము, మిశ్రసేవ్యము.

‘పైరుహర్చినగదా పంటపెంపు?’

‘అయితే ఆరిక కాకుంటే కంది.’

మూడవ యధ్యాయాంతమున ముఖ్య సస్యములు వాని యనులోమములను బట్టి విభజింపబడెను. ఆయా సస్యములను పైరుచేయు విధానములను గురించి చదువరులకు తేటపరచుటకు ఫలసాయముయొక్క స్వభావము ననుసరించి కూడ వానిని విభాగించుట యావశ్యకము. కావున నీక్రింద సస్యముల నట్లు తరగతులుగా విభజించి ప్రతితరగతికిని రెండుమూడు ఉదాహరణల నిచ్చెదము.

(1) తృణధాన్యములు (Cereals):—అనగా గడ్డిజాతి సస్యములు. వరి, జొన్న, గోధుమ మొదలగునవి యీ తరగతి లోనివి.

2. కాయధాన్యములు (Pulses):—ఉలవ, పెసర, కంది మొదలగునవి యీతరగతి కుదాహరణములు. వీనికి పయరలు అపరాలు అని గూడపేళ్లు.

3. చమురుగింజలు (OilSeeds):—నువ్వులు కుసుంబా, వేరుసెనగ మొదలగునవి యీతరగతిలోనివి.

4. నారపంటలు (FibreCrops):—ప్రత్తి, గోగు, జనుము, కిత్తనార మొదలగునవిందు ముఖ్యములు.

5. రంగుపంటలు (DyeCrops):—నీలి, జాబురా చిట్ట వేరు మొదలగునవి యీతరగతిలోనివి.

6. ఓషధులు, మత్తుద్రవ్యములు (Drugs and Narcotics) పొగాకు, నల్లమందు, గంజాయి, మొదలగునవి యీతరగతి కుదాహరణములు.

7. మసాలా దినుసులు, పరిమళ ద్రవ్యములు (Condi-ments and spices):—మిర్చి, మిరియాలు, వలకులు మొదలగు నవి యీతరగతిలోనివి.

8. ఇతరపంటలు (Other crops):—పైతరగతులలో చేరని చెరకు తమలపాకులు పోకచెక్కలు కట్టపెండలు అరోయాటు మొదలగు సామాన్యకృషిలో చేరిన సస్యము లన్నియు నీతరగతిలో చేరును.

9. పశుగ్రాసములు (Fodder crops):—పశువుల మేత కొరకు పైరుచేయబడు గరిక, జొన్న, గిసీగడ్డి (Guinea grass) జనుము మొదలగు సస్యము లీతరగతిలోనివి. ఈతరగతి సస్యములు ముఖ్యముగా పశుపాలనముతో సంబంధించిన వయినను

సామాన్యకృషిలోకూడ దుక్కి నుండగట్టుట మొదలగు పనులకుపశువు లవసరమేయగుటచేత నీతరగతి సామాన్యకృషితో కూడ సంబంధించినదే యని చెప్పవచ్చును.

ఉద్యానకృషిలో సంబంధించిన యుద్భిజ్జములు కూరగాయలు, ఫలవృక్షములు, పుష్పజాతులు అని మూడు తరగతులు. ఇందు మూడువతరగతిలో బంతి చామంతి గులాబి మొదలగు మిగుల నుందరముగ నుండునట్టిగాని, సువాసనగలిగినట్టి గాని పూవులబూయు జాతులే గాక నాకులు మొదలగు నితరభాగముల మనోహరతను బట్టి పెంచబడు క్రోటనులు, ఘెరనులు మొదలగునవి కూడ జేర్పబడు చున్నవి. ఇట్లేపట్టు పురుగుల కాహారముగా నుపయోగించు మొక్కలు, తేనెటీగలు మకరందమును గ్రోలు పుష్పజాతులు మొదలగు నితర వ్యవసాయ శాఖలతో సంబంధించిన యుద్భిజ్జజాతులు కూడ వేరు వేరు తరగతులుగా వ్యవహరింపబడును. *

* సస్యములు వానిని సాగుచేయు విధానమునుబట్టి మెట్టసస్యములు, (Dry crops) నీటిపారుదల సస్యములు (Irrigated crops) అని రెండువిధములు. నీరు పెట్టకయే వస్తాధారమున సాగుచేయునవి మెట్టసస్యములు. నీరుకట్టి సాగుచేయు నవి నీటిపారుదల సస్యములు. విస్తారమునీరు పెట్టెదన్ని (అనగా దమ్మచేసి) సాగుచేయునవి దంపసస్యములు. (wet crops) అనబడును. ఇట్లే నేలలకును పెట్టభూములు (Dry lands) నీటిపారుదల భూములు (Irrigated lands) దంపభూములు (Wetlands) అని పేర్లు గలుగు చున్నవి.

సస్యపరివర్తనము.

(Rotation of crops)

ఏప్రదేశము నందుగాని యొకే సస్యమును మరల మరల సాగుచేయుచువచ్చిన యెడల నచట నా సస్యము గొంతకాల మయిన పిమ్మట బాగుగపెరిగి ఫలింపదు. కావున వ్యవసాయ దారుడు ఏప్రదేశమున గాని సాధ్యమైనంతవగ కొకసారి సాగుచేసిన సస్యమును తిరిగి యచట మరొకొంత కాలమువరకు సాగుచేయకయితర పైరులను పెట్టుట మంచిది. ఇట్లు సస్యముల ను మార్చుటయే సస్యపరివర్తనము (Rotation of crops) అనబడును. వేసిన సస్యమునే తిరిగితిరిగి వేయుటవలన సస్యములచట వృద్ధినొండకపోవుటకు కారణములను, సస్యపరివర్తనమువలని లాభములను ఈ క్రింద వివరించెదము.

నేలనుండి కొన్ని సస్యములు మరికొన్నిటికంటె కొన్ని కొన్ని యాహారద్రవ్యముల నెక్కువగా తీసికొనును. మొక్కజొన్నకు పొగాకునకంటె స్ఫురత్పంచామ్లజనిత మెక్కువ గావలయును. పొగాకు మొక్కజొన్నకంటె నెక్కువ నత్రజనిని పొటాష్ ను గోరును. ఇట్లాయా సస్యముల కాయాయాహారద్రవ్యము లెక్కువగా కావలసియుండును. ఏ నేలయందుగాని యెల్లప్పుడును ఒకేసస్యమును పైగుచేయుచువచ్చినయెడల నందలీయాహారద్రవ్యములలో నా సస్యమునకేది యెక్కువగా గావలయునో యవి ముందుగా తఱిగిపోవును. ఏడవ యధ్యాయము

నందు నేలయం దేదేని యొక యాహారద్రవ్యము లోటుగానున్న యెడల తక్కిన వన్నియు నెంతవిస్తారముగా నున్నను ప్రయోజనములే దని వ్రాయబడెను. కావున నేనేలయందుగాని యొకే సస్యము నేటేట పైరుచేయుచు వచ్చినయెడల నానేల శీఘ్ర) కాలములోనే సస్యములు పైరుచేయుట కనర్హమగును. సామాన్యముగా నొకే యనులోమము (Natural order) లోని సస్యజాతు లన్నియు నొకేవిధ మగు నాహారపదార్థములను దీసికొనును. కాన వేరువేరు అనులోమములలోని సస్యముల నొకదాని తర్వాత నొకదానిని పెట్టుచుండవలయును.

కొన్ని జాతుల మొక్కలవేళ్లు నేలలో పైపైనేయుండు స్వభావమును గలిగియుండును. కొన్నిటివేళ్లు లోతుగాదిగుస్వభావము గలిగియుండును. ఒకేసస్యమును ఏటేట పైరుచేయుటవలన నాజాతి మొక్కల వేళ్లు పైపైనేయుండున వగునెడల నేలయొక్క పైభాగమునందలి యాహారద్రవ్యములు మాత్రము త్వరలో తరిగిపోయి క్రిందిభాగము నందలి యాహారద్రవ్యము లుపయోగింపబడకయే యుండును. ఆ సస్యముయొక్క వేళ్లు లోతుగా పోవున వగునెడల యుపరిభాగమునందలి యాహారద్రవ్యములు నిరర్థకములై క్రిందివిమాత్ర ముపయోగపడును. ఈరెండు స్వభావములుగల సస్యములను ఒకదాని తర్వాత నొకదానిని పైరుచేయుచువచ్చినయెడల నేలయందలి యాహారద్రవ్యములు సమముగా తరిగి నేల చాలకాలమువరకు సస్యానుకూల

ముగా నుండును. ఇదిగాక సస్యముల వేళ్లు నేలయందు క్రుళ్లుటచే నదికొంతవరకు గుల్లబారి దాని భౌతికధర్మములు బాగు పడును. లోతుగా వేళ్లుపారు సస్యములను పైపైనే వేళ్లుపారు సస్యములను కూడ మార్చి పైరుచేయుచు రానియెడల నేదో యొక భాగము మాత్రము బాగుపడి తక్కిన దట్లే యుండును. కాన నీ రెండు విధము లగు సస్యములను మార్పుచు రావలెను.

నేలయందు మొక్కలవేళ్లొకవిధ మగు ద్రవపదార్థమును విసర్జించును. జంతువులలోవలెనే యేజాతిమొక్కలు విసర్జించు పదార్థము లాజాతిమొక్కల వృద్ధికి కొంతవరకు నిర్బంధకములు. కాన నొకేజాతిమొక్క లొకేస్థలమున మరల మరల సాగుచేసిన యెడల నవి యభివృద్ధినొందవు.

కంది డలవ మొదలగు కొన్నిపైరులు తమ వేళ్లగుండ కొన్నిసూక్ష్మజీవుల సహాయముచేత వాయువునందలి నత్రజనిని సంపాదించగలవు. వీనిని పైరుచేయుటచే నేలయందలి నత్రజని యంతగా వ్యయపడకపోవుటయే గాక కొంతవరకు వృద్ధియగును. ఇట్టి శక్తిలేని సస్యములను వీనితో మార్చి పైరుచేయుచు వచ్చి నయెడల నేలయొక్కసార మంతత్వరలో తగ్గదు. లెగుమినములు (Leguminosae) అను ననులోమములోని మొక్కలకే వాయువునందలి నత్రజని నిట్లు సంపాదించు శక్తిగలదని యిదివరలో జదివియున్నారు.

వ్యవసాయదారులు ఎరువును నేలకు సామాన్యముగా 4, 5, సంవత్సరముల కొకసారి మాత్రమే వేయుదురు. జొన్న, చోడి మొదలగు కొన్నిసస్యములు యెరువు వేసినవెంట నే పైరు

చేసినయెడల బాగుగ ఫలించును. వేరుసెనగ, కర్రపెండలము, చిరుగడం మొదలగు మరికొన్నియెరువు వేసిన మరుసటిసంవత్సరము బాగుగ ఫలించునేగాని వెంటనే పైరు చేసినయెడల మంచి పంటల నీయవు. కావున నేలలో నెరువు వేసినవెంటనే యేసస్యములు పైరు చేయవలెనో, తరువాత నేవేవి పైరు చేయవలెనో తెలిసికొని యట్లుచేయక ఎప్పుడు నొకేపైరు పెట్టుచు వచ్చినయెడల నెరువువలని యుపయోగము పూర్తిగాలేక పోవుటయే గాక దానివలన కొంతచెడుగుకూడ కలుగవచ్చును.

సాధారణముగా నొక్కొక్కజాతి మొక్కలకు కొన్ని కొన్ని జాతుల చీడలును తెగుళ్లును పట్టును. ఒకజాతిని బాధించు నవి తక్కినవాని నంతగా బాధించవు. సాధారణముగా వేరువేరు అనులోమముల (Natural orders) లోనిజాతుల నొకేవిధ మగు తెగుళ్లును, చీడలును బాధించవు. ఒకేజాతిపైరులుగాని, ఒకే అనులోమములోనిజాతులపైరులుగాని పెట్టుచు వచ్చినయెడల వానికి పట్టు తెగుళ్లును బుట్టించుశిలీంధ్రము (Fungi) లకును చీడ పురుగులకును తగినయాహారపదార్థములు లోపములేక దొరకుచుండుటచే నవి క్రమక్రమముగా వృద్ధియయి కొంతకాలమున కా సస్యముల నడుగంటించును. వేరువేరు అనులోమముల లోని సస్యజాతులను మార్చి పైరుచేయుచు వచ్చినయెడల నొకజాతికి పట్టు తెగుళ్లును చీడలును మరియొకటి పెరుగుచున్నప్పుడు తగిన యాహారపదార్థములు దొరకమిచే జాలవరకు నశించును.

కావున నేటేట నొకేజాతిపైరు పెట్టుచుండుట తెగుళ్ళకును చీడలకును వృద్ధికరము.

వ్యవసాయదారు డే సస్యమును గాని యొకేస్థలమందు ప్రతి సంవత్సరమును సాగుచేయ గూడ దను సంశయమునుమాత్రమే గమనించి యొకసంవత్సర మొక సస్యమును మరియొక సంవత్సరము మరియొక సస్యమును, ఇట్లు తనపొలమం దంతటను నొకే సస్యమునుపైరుచేయుట మంచిదికాదు. ఒకసంవత్సరము పెట్టుపైరు మరల 4 సంవత్సరము లయిన వెనుక వేయునట్లు పరివర్తన మేర్పరుచుకొను నెడల వ్యవసాయదారుడు తనపొలమును 4భాగములుగాజేసి మొదటి సంవత్సరమున నొకభాగమున నొకపైరును రెండవదానిలో నొకటియు, మూడవ భాగమున మరియొకటియు, నాల్గవదానిలో నింకొకటియు పెట్టవలెను. మరుదటి సంవత్సరము మొదటిసంవత్సరమున రెండవభాగములోపెట్టినది మొదటిదానిలోను మూడవదానిలోపెట్టినది రెండవదానిలోను, నాల్గవదానిలో నిది మూడవభాగములోను, మొదటి భాగములోనిది నాల్గవదానిలోను పైరుచేయవలెను. ఇట్లే ప్రతిభాగమునందును ఒకసంవత్సరము, పైరుచేయు సస్యమును మరల 4 సంవత్సరముల వెనుక నందుపెట్టవలెను. ఇట్లుచేయుట వలన ఏభాగమునగాని ప్రతిసంవత్సరమును నొకేసస్య ముండక్షపోవుటయేగాక పొలమునం దెల్లపుడును నాలుగుసస్యము లుండును. ఇట్లు పొలమునందు పెక్కుసస్యము లుండుటవలని లాభము లీక్రింద వివరింపబడును.

1. సన్యములు వానివాని స్వభావములను బట్టి కొన్నియొక కాలమందును కొన్ని మరియొక కాలమందును పైరుచేయబడును. పొలమునం దంతటను నొకేసన్యమున్నయెడల దానికి దోహద మేకాలమున విస్తారముగా చేయబడునో యాకాలమునందు మాత్రము వ్యవసాయదారునకును పనివాండ్రకును పశువులకును పనియొత్తుడుగా నుండి తక్కిన కాలమందు పనిలేకయుండును. ఒక కాలమునందు విస్తారముగా పనిగలిగించునవి గొన్నియు మరియొక కాలమందు పనిగలిగించునవి కొన్నియు నెప్పుడును పొలమందున్నయెడల వ్యవసాయదారు డెప్పుడును సమముగ పనిగలిగి యుండును.

2. ఒకేపైరు పెట్టినయెడల నతివృష్టి యనావృష్టి మొదలగు దైవికములచే నది యొకటియు పాడయిన యెడల వ్యవసాయదారుని కాహారద్రవ్యములును పశువులకు మేతయు కరవగును. పెక్కుసన్యము లున్న యెడల నొకటి పోయిన మరి యొకటియైనను ఫలించును.

3. పెట్టిన పైరొకటియు నీరుగావలసిన దగు నెడల నూతుల వలనను చెరువులవలనను సాగగు నేలలలో పొల మంతటికిని నీరు సర్దుబాటు చేయుటకష్టము. అది నీరక్కరలేని దగు నెడల నూతులు కొంతకాల మూరకయుండవలసి యుండును. కావున కొన్ని నీరుకావలసిన పైరులును, కొన్ని మెట్టపైరులును పెట్టిన యెడలనీరు సులభముగ సర్దుబాటుగుటయే గాక నూతుల నీరెల్లప్పుడు నుపయోగపడుచుండును. ఒకేపైరు పెట్టినయెడల నెరువు విషయమునగూడ నిట్టి యిబ్బందియే కలుగవచ్చును.

4. వ్యవసాయదారుడు తన పొలమందంతటను ఒకే విధమగు పైరుపెట్టిన యెడల తనకును తన పశువులకును వలయు పదార్థములలో తాను పండించున దొక్కటియు గాక తక్కిన వానినన్నిటిని యంగడియం దెక్కువధరకు గొన వలసి యుండును. తనయొద్ద విశేషముగ నుండు నొకదానిని సామాన్యపుధర కమ్మివేయవలసి వచ్చును. వివిధము లగు సస్యములను పెట్టుచు వచ్చినయెడల తన యుపయోగమునకు వలయునవి పోను తక్కినవానినే యమ్మివేయవచ్చును.

వ్యవసాయదారుడు తన పొలమందెల్లపుడును పెక్కు సస్యము లుండుట మంచి దని, 3, 4 యెకరముల పొలమందే పదిపండ్లెండు సస్యముల పెట్టకూడదు. పైరుచేయతగిన సస్యములసంఖ్య పొలముయొక్క విస్తీర్ణమును బట్టి యుండును. కొద్ది విస్తీర్ణముగల నేలయందే యనేక సస్యములపైరు చేయు నెడల వానిని సాగుచేయుట కగు తట్టుబడి యెక్కువగును. 10 యెకరముల భూమిగలవాడు 5, 6 సస్యములను పెట్టవచ్చును. 100 యెకరములు గలవాడు 10, 12 సస్యములను పైరుచేయవచ్చును.

కృషీపలుడు పైయంశముల నన్నిటిని బాగుగ గ్రహించి తన పొలమందే సస్యము నెచట నెప్పుడు పైరుచేయవలెనో మొదట నిశ్చయించుకొని తరువాత క్రమప్రకారము వానిని సాగుచేయవలెను.

ఆ యానేలల కనుకూలము లగు కొన్ని ఫలివర్తనముల నిచట నుదాహరణములుగా నిచ్చెదము.

A. మెట్ట భూములు.

జన్మస్థానికము లగు నెర్రనేలలవంటి యిసుకగరుములకు 280 వ పుటలోని పరివర్తనము (I) అనుకూలముగ నుండును.

20 యెకరములభూమిగలరైతు తనపొలమును అయిదేసి, యెకరముల విస్తీర్ణముగల 4 భాగములుగవిభాగించి ప్రతి భాగమునందును ఆ యా సస్యములను పట్టీలో వ్రాయబడినట్లు మార్పుచు సాగుచేయవలెను.

కొంతవరకు నూతులపలన నీరుదొరకునెడల నొకసంవత్సరము బీడుగానుంచుటకు బదులుగా బాగుగ మండగట్టి చోడి మిర్చి పొగాకు కూరగాయలు మొదలగునవి సాగుచేయవచ్చును.

గరుపనేలలకు 281 పుటలోని పరివర్తనము (II) అనుకూలముగ నుండును. కొంతవరకు నీటివనః యున్నయెడల తొలకరి నువ్వుపెట్టు సంవత్సరము కూరగాయలు ఊడ్చుచోడి మిర్చి పసుపు కర్రపెండలం ఉల్లి మొదలగునవి పైరు చేయవచ్చును.

కృష్ణాగోదావరి డెల్టాలలోని మెట్టభూముల వంటి వండలి నేలలకు 282 వ పుటలోని పరివర్తనము (III) అనుకూలముగ నుండును.

ప్రత్తిరేవళ్లవంటి రేవడినేలలకు 283 వ పుటలోని పరివర్తనము (IV) అనుకూలముగ నుండును. నీరుపెట్టిన యెడల కొన్ని కృష్ణరేవడినేలలలో చొడుబుకును. కావున నిట్టినేలలన్నియు నీటిపారుదల క్షర్తములు గావు. చొడుబుకనిచోట్ల నీరు లభించునేని ఉల్ల, గోధుమ, జొన్న, జీలకర్ర మొదలగునవి పైరు చేయవచ్చును.

I

సంవత్సరము.	1-వ భాగము.	2-వ భాగము.	3-వ భాగము.	4-వ భాగము.
1-వ సంవత్సరము.	జొన్న + కాయధాన్యములు ¹ ; లేక గంటె ² ; లేక మొక్కజొన్న ²	తొలకరినువ్వు + కంది లేక ప్రత్తి; లేక అముదాలు + కంది లేక ప్రత్తి	ఉలవ	బీడు
2-వ సంవత్సరము.	తొలకరినువ్వు + కంది లేక ప్రత్తి; లేక అముదాలు + కంది లేక ప్రత్తి ²	ఉలవ	బీడు	జొన్న + కాయధాన్యములు; లేక గంటె; లేక మొక్కజొన్న
3-వ సంవత్సరము.	ఉలవ ¹	బీడు	జొన్న + కాయధాన్యములు; లేక గంటె; లేక మొక్కజొన్న	తొలకరినువ్వు + కంది లేక ప్రత్తి; లేక అముదాలు + కంది లేక ప్రత్తి
4-వ సంవత్సరము.	బీడు	జొన్న + కాయధాన్యములు; లేక గంటె; లేక మొక్కజొన్న	తొలకరినువ్వు + కంది లేక ప్రత్తి; లేక అముదాలు + కంది లేక ప్రత్తి	ఉలవ

1. చల్లిక పెట్టెయిదు (ఉత్తర కార్పిలో) 2. తొలకరిలో చల్లిక.

II

సంవత్సరము.	1-వ భాగము.	2-వ భాగము.	3-వ భాగము.	4-వ భాగము.
1-వ సం॥	1-వ పంట మొక్కజొన్న + కంది; లేక మెట్టవరి + కంది; 2-వ పంట.	గంటె; లేక నోడి కాయధాన్యములు జొన్న + కాయధాన్యము [స్వము]	జొన్న + కాయధాన్యము తొలకరినపు	తొలకరినపు అనుము లేక ఉలవ మొక్కజొన్న + కంది లేక మెట్టవరి + కంది
2-వ సం॥	1-వ పంట. 2-వ పంట.	గంటె లేక నోడి కాయధాన్యములు జొన్న + కాయధాన్యము [స్వము]	అనుము లేక ఉలవ మొక్కజొన్న + కంది లేక మెట్టవరి లేక కంది	గంటె లేక నోడి కాయధాన్యములు జొన్న + కాయధాన్యములు [స్వము]
3-వ సం॥	1-వ పంట. 2-వ పంట.	అనుము లేక ఉలవ మొక్కజొన్న కంది లేక మెట్టవరి కంది	కాయధాన్యములు గంటె లేక నోడి
4-వ సం॥	1-వ పంట. 2-వ పంట.	అనుము లేక ఉలవ మొక్కజొన్న కంది లేక మెట్టవరి కంది	కాయధాన్యములు గంటె లేక నోడి

1. భాన్, 2. మే, జూన్, 3. ఆగస్టు, 4. అక్టోబరు, నవెంబరు, 5. డిసెంబరు.

iii

సంకల్పరము.	1-వ భాగము.	2-వ భాగము.	3-వ భాగము.	4-వ భాగము.
1-సంకల్పరము.	జొన్న + నీలి ¹	సెనగ	తొలకరినువ్వు రెండవ పంటగా ఉలవ లేక ఆనుము; లేక బుడమ + కంది	మిర్చి లేక వంగ (మెట్ట పంటలు)
2-సంకల్పరము.	సెనగ ²	తొలకరినువ్వు; రెండవ పంటగా ఉలవ లేక ఆనుము; లేక బుడమ + కంది	మిర్చి లేక వంగ (మెట్ట పంటలు)	జొన్న + నీలి
3-సంకల్పరము.	తొలకరినువ్వు రెండవ పంటగా ఉలవ లేక ఆనుము; లేక బుడమ + కంది ³	మిర్చి లేక వంగ (మెట్ట పంటలు)	జొన్న + నీలి	సెనగ
4-సంకల్పరము.	మిర్చి లేక వంగ ⁴ (మెట్ట పంటలు)	జొన్న + నీలి	సెనగ	తొలకరినువ్వు; రెండవ పంటగా ఉలవ లేక ఆనుము; లేక బుడమ + కంది

1. సెనెంబరు, 2. నవెంబరు, 3. మే, జూన్, 4. సెనెంబరు, ఆక్టోబరు, 5. జూన్, 6. ఆగస్టు.

IV

సంవత్సరము	1-వ భాగము	2-వ భాగము	3-వ భాగము
1-వ సం॥	జొన్న + కాయ ధాన్యములు	కొర్ర + ప్రత్తి	ఆముదములు లేక సెనగలు
2-వ సం॥	కొర్ర + ప్రత్తి	ఆముదములు లేక సెనగలు	జొన్న + కాయ ధాన్యములు
3-వ సం॥	ఆముదము లేక సెనగలు	జొన్న + కాయ ధాన్యములు	కొర్ర + ప్రత్తి

B. దంపనేలలు (Wet lands):—

సంవత్సరము పొడుగునను నీరుదొరకుచు జలనిర్గమము (Drainage) బాగుగనున్న బంకనేలల కీ క్రింది పరివర్తన మనుకూలముగ నుండును. అట్టిభూమి 8 యెకరములున్నయెడల దానిని 8 భాగములుగాజేసి ప్రతిభాగమునను, V వ పట్టీలో వ్రాసిన ప్రకారము సస్యములను మార్చి పైరుచేయవలెను.

అట్లు చేసినయెడల రైతునకుగల యెనిమి డెకరముల భూమిలోను ప్రతిసంవత్సరమును 1 యెకరము తమలపాకుల తోటక్రిందను, 1కి యెకరము చెరుకుతోటక్రిందను తక్కినది వరిక్రిందను, కాయధాన్యములక్రిందను ఉండును. తమలపాకుల తోట వేసినచోటనే మూడుసంవత్సరము లుంచవచ్చును. కావున

V

సంకల్ప రము.	పంట్.	1వ భాగము	2వ భాగము	3వ భాగము	4వ భాగము	5వ భాగము	6వ భాగము	7వ భాగము	8వ భాగము
1-వ సం॥	మొదటిది	పరి	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	పరి	చెరుకు	పరి
	రెండవది	మినుము లే క జనుము	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	చెరుకు	పెనగ
	మొదటిది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	పరి	పరి
2-వ సం॥	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	పెనగ	మినుము లే క జనుము
	మొదటిది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	పరి	1వ. తమ పాకులు
	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	మినుము లేక జనుము	1వ. తమ పాకులు
3-వ సం॥	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు
	మొదటిది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు
	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు
4-వ సం॥	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు
	మొదటిది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు
	రెండవది	1వ. తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	తమల పాకులు	పరి	చెరుకు	జనుము లేక పాకులు	జనుము లేక పాకులు

ప్రతిసంవత్సరమును $\frac{1}{3}$ యెకరముమాత్రమే క్రొత్తతోట వేయుచుండవలెను. చెరకుతోటకును, తమలపాకులతోటకును మాత్రమే సర్వకాలములందును నీరు కావలసియుండుటచే, మంచి నూతు లొకటిరెండున్నయెడల, సామాన్యముగ నొక పంటకే నీరందు భూములందుగూడ నీపనివర్తన మవలంబింప దగియుండును. రెండవపంటకుగూడ నీరందునెడల పయరచేలకు బదులుగా నప్పుడప్పుడు దాళువావరి సాగుచేయవచ్చును.

నేల యంత జిగట స్వభావముగలదిగాక బంకగరుమయిన యెడలగాని గరుపనేలయయినయెడలగాని మినుమునకును సెనగకును బదులు పెసర, ఉలవ మొదలగు పయరలనుపెట్టవచ్చును. రెండవపంటకు నీరందునెడల పయరలకు బదులు పయరనువ్వుగాని, దాళువావరిగాని కూడ సాగు చేయవచ్చును. చెరకునకుబదులు మిర్చి పసుపు మొదలగునవి పెట్టవచ్చును. తమలపాకులకు బదులు నరటితోటవేయవచ్చును.

పోలమునందు గొంతభాగమున కయినను సంవత్సరము సొడుగునను నీరండనియెడలనందు వరియు కాయధాన్యములును దప్ప మరియేమియుపెట్టవీలుండదు. నేల చవటినేలయగు నెడల నందు కాయధాన్యములు సైతము పెరుగకపోవుటచే నేల బాగుపడు వరకును నేటేట వరిమాత్రమే సాగు చేయుచుండవలసియుండును.

పైపరివర్తనములు మాదిరి చూపుటకు వ్రాయబడినవి. వ్యవసాయదారులు పరివర్తనముల యుద్దేశ్యములను బాగుగ గ్రహించి, పైవానిలో మార్పులుజేయుటచేగాని క్రొత్తివానిని కల్పించుటచేగాని ఆయానేలలకును ఆయాస్థితిగతులకును దగిన పరివర్తనముల నేర్పరచుకొనవలెను.



మిశ్ర సేవ్యము

MIXED CROPPING.

పైపరివర్తనములలో కొన్నిచోట్ల మెట్టవరి+కంది, జొన్న +నీలి యని యిట్లు సస్యములుజంటలుగా వ్రాయబడెను. మెట్ట వరి+కందియనుదాని కారెండుసస్యములును కలిపి చల్లి సాగు చేయవలె నని యర్థము. ఇట్లు రెండుగాని రెంటికెక్కువగాని సస్యములనుగలిపి సాగుచేయుటకు 'మిశ్ర సేవ్యము' (Mixed cropping) అనిపేరు. మొదట కొన్ని మిశ్రణముల నీక్రింద యుదాహరణములుగా నిచ్చి పిమ్మట నట్లు సస్యములను గలిపి సాగుచేయుటవలని లాభములను వివరించెదము.

1 బుడమ+కంది+ప్రత్తి

2 మొక్కజొన్న+కంది

3 చోడి+వేగుసెనగ

4 చోడి+అనుము

5 ఆముదములు+పసుపు


6 మొక్కజొన్న+పసుపు+ఉల్లి+
ఆముదాలు

7 జొన్న+కాయధాన్యములు

8 కొర్ర+ప్రత్తి

క్రిందిపటములో 1 లో పసుపు ఉల్లి మొక్కజొన్న ఆముదములు వీని మిశ్ర సేవ్యమునకు గట్టబడిన మళ్లును చాళ్లును గట్లును జూపబడినవి. ఒకమూల మొక్కలుగూడ కనపరుపబడెను. 2, 3 గట్లమీద మొక్కల స్థానములను చూపుచున్నవి.

4గ వ పటము.



1. మళ్లు గట్లు చాళ్లుచూపుపటము

2. ఒకమడిలోని గట్లు చాళ్లు. (కొంచెము పెద్దరూదము)

3. అడ్డుకొత్త

మిశ్రసేవ్యమున సస్యపరివర్తనమందలి సుగుణము లన్నియు గొంతవరకు గలవు. అవియేగాక, దీనివలన నేకకాలమందే వేరువేరు స్వభావములుగల రెండుమూడుసస్యము లొకచోటనే పెరిగి నేలనంతగా సారహీనము జేయకయే యెక్కువ ఫలమునిచ్చును. పైని పేర్కొనబడిన మిశ్రణములలో మొదటిదాని నుదాహరణముగ దీసికొందము. అందలి మూడు సస్యములలో బుడమ (ఒకమెట్టజాతివరి) నాల్గుమాసములలోపలనే పండి కోసివేయబడును. తరువాత కందిమొక్కలు విజృంభించి మరి రెండున్నరమాసములకు గొట్టివేయబడును. అప్పటికి ప్రత్తి మొక్కలు బాగుగ నెదిగి కాయలు కాచి ప్రత్తివిడువ నారంభించును. ఈమూడుసస్యములును నొకటిపెరుగుట కొకటి యాటంకమును గలుగజేయునవి కాకపావుటచే నవి మూడును గూడ గొంచెమించుమించు వేరువేరుగా పైరుచేసినంత బాగుగ నెదిగి ఫలించును. ఇట్లు మిశ్రసేవ్యములో నేకకాలమందు రెండు మూడుపంటలు పండుటచే వానిని విడిగా వేయునప్పటికంటె నెక్కువ లాభముగలుగును. పరివర్తనములం దెట్టి సస్యము లొకదాని తరువాత నొకటి సాగుచేయుటయొక్కమో పాధ్యమైనంతవర కట్టివానినే కలిపిసాగుచేయవలెను.

అనుబంధము

ప్రత్తిరేవడి నేలల వర్ణము.

The colour of black cotton soils

190 వ పుట యడుగున ప్రత్తిరేవడి నేలల నలుపు రంగు అందలి తిత్తినయుతమైన స్కాంతాయితము (Titaniferous magnetite.) వలనను ద్రావణీయహ్యూమసువలనను గలుగుచున్నట్లు శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించి రని వ్రాయబడెను. ఇటీవల కోయంబత్తూరునందలి వ్యవసాయాన్నేషణశాలయందు కొన్ని పరీక్షలను జేసి, రసాయనశాస్త్రవేత్త లగు హరిసన్ దొర గారును, రామస్వామి సివన్ గారును, తిత్తినయుతమైన స్కాంతాయితము ఈరాజధానియందలి అన్ని ప్రత్తిరేవడి నేలలందును లేదనియు, నలుపు వర్ణమునకును, తక్కిన భౌతికధర్మములకును గారణము మిగుల జిగురు స్వభావముగలదియగు, లోహముయొక్కయు స్ఫటముయొక్కయు మిశ్రణదజ్జశైలితము (Colloidal hydrated double iron and aluminium silicate)ను ఆ రెండు లోహములయొక్కయు మరియొక సేంద్రియమిశ్రణమును గారణము లయి యుండవచ్చు నని నిశ్చయించిరి.

నేలయొక్క ఫలదత, సూక్ష్మజీవులు

(Soil fertility & bacteria)

నేలయొక్క మంచిచెడ్డలకు, దాని రసాయనస్థితి, లోతు, భౌతికధర్మములు, క్రింది నేలయొక్క స్వభావము, హానికర ద్రవ్య

ముల ఉనికియు లేమియు సూచన లని ఆరవయధ్యాయమున వ్రాయబడెను. ఇవిగాక నేలయందలి సూక్ష్మజీవులు (Bacteria) గూడ దాని మంచి చెడ్డల కొక ముఖ్యమైన కారణ మని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించిరి. క్రొత్తపరిశోధనలవలన ఈ విషయమున కిప్పుడిప్పుడు మునుపటికంటె ప్రాముఖ్యత గలుగుచున్నది.

204 వ పుటలో సూక్ష్మజీవులు నేలలోజరుగు కొన్నియుపయోగకర మగు మార్పుల కావశ్యక మని వ్రాయబడెను. ఈ మార్పులలో ముఖ్యమయినది, సేంద్రియపదార్థమునుండి మొక్కలకాహారద్రవ్యముగ నుపయోగించు నత్రితము లేర్పడుట. ఇట్టి మార్పులు సస్యమున కనుకూలముగ నుండేనేని యది బాగుగ బెరిగిఫలించును. తేమయొక్క యెక్కువతక్కువలచేగాని వాయుసంచారలోపముచే గాని, ఉష్ణముయొక్క తీక్షణతాభేదములచే గాని, నేలయందలి హానికర లవణములయునికిచేగాని యీ సూక్ష్మజీవులు నశించినను లేక అవి తమవ్యాపారమును క్రమముగా జరుపలేకపోయినను నేలయొక్క ఫలదత తగ్గిపోవును. కావున నీ సూక్ష్మజీవు లెట్టివో వాని కెట్టి స్థితిగతు లనుకూలమో గనుగొని, వానివృద్ధికి దగినప్రయత్నములు చేయవలెను. ఈ విషయమయి యనేకచోట్ల పరీక్షలు జరుగుచున్నవి. క్రమక్రమముగా ఉపయోగకరములగు విషయములు తేలవచ్చును. వరినేలలలో కొన్ని మెట్టదుక్కివలన చెడుటకును కొన్ని యెరువులు విస్తారముగ వేసినపుడు పంట హెచ్చుటకు బదులు తగ్గుటకును, సూక్ష్మజీవులకు అందువలన గలుగు హానియే గారణ మని యీమధ్య తెలియ వచ్చెను.

అనుక్రమణికాయుత

పర్యాయపదసూచిక

INDEX AND GLOSSARY

అ

అంగవిభాగము=Differenciatio	...	37, 38
అంగారము=Charcoal	...	29
అంజనము=Antimony	...	22
అంతరవకాశము=Interspace	...	181
అంతర్గతోష్ణత=Latent heat	...	204
అంతరిక్ష శాస్త్రము=Meteorology	...	7, 112
అంతరిక్ష విద్యాల=Meteorological station	...	119
అంతర్భూమజలము=Underground water	...	292
అంతశ్చర్మము=Endodermis	...	61, 64
అంబెలిఫరములు=Umbelliferae	...	106
అంశములు=Degrees	...	14
అక్షము=axis	...	48
అణువు=Molecule	...	11, 23
అదము=Iodine	...	68
అద్రావణీయపదార్థములు=Insoluble substances	...	12
అధికతామోష్ణతామాపకము=Maximum Thermometer	...	121

అధికతమోష్ణోగ్రత=Maximum temperature ...	120, 205
అధోజలనిర్గమము=Underdrainage ...	223
అనాకార్డి నములు=Anacardianae ...	107
అనులోమము=Natural order ...	98
అనుకూలతమోష్ణోగ్రత=Optimum temperature	205
అనుష్ణవాహకములు=Nonconductors of heat ...	14
అపవీతములు (నేలలు)=Transported soils ...	165
అబ్బురపు వేళ్లు=Adventitious roots ...	43
అభ్రకము=Mica ...	159
అమ్మోనియా=Ammonia	18, 28, 141
అమ్మోనియా ఉదజనితము=Ammonium Hydrate ...	29
అష్టజని=Oxygen	21, 22, 24, 26, 67, 68, 72, 74, 76, 151
అష్టజనిదము=Oxide ...	24
అష్టజనీకరణము=Oxidation ...	207
అమ్లము=Acid ...	25, 26, 29
అల్మికామ్లము=Ulmic acid ...	31
అలూమినియమ్=Aluminium ...	34
అల్పదళము=Scale leaf ...	51
అల్పతమోష్ణతామాపకము=Minimum thermometer ...	121
అల్పతమోష్ణోగ్రత=Minimum temperature ...	121, 205
అవిదారణఫలములు=Indehescent fruits ...	90
అసంయోగస్థితి=Ucombined state ...	24

అ

అంతరళము=Internal surface (of soil) ...	182
అంతరనిర్మాణము=Internal structure ...	58, 67

ఆకర్షణప్రమలు=Petals	...	82
ఆకర్షణక్రి=Attraction	...	11
ఆకలి నేలలు=Hungry soils	...	226
ఆకు=Leaf	... 37, 47, 52, 65, 67	
ఆకురాలుకాలము=Autumn	... 117	
ఆయతనము=Volume	...	17
ఆర్ద్రత=Humidity	... 112, 142, 145	
ఆర్ద్రతామాపకము=Hygrometer	...	144
ఆవరణలు=Fences	... 261, 262, 263	
అహారస్వీకరణము=Nutrition (of higher plants)	67, 78	

ఇ

ఇనుము=iron	... 34, 77	
ఇనుపచట్టె=Ferruginous pan	...	244
ఇనక నేలలు=Ildrained or Swampy soils	...	170
ఇసుక=Sand	...	167
ఇసుకగరుములు=Sandy loams	...	167
ఇసుక నేలలు=Sandy soils	... 163, 166	
ఇప్టకొళి=Laterite	... 163	

ఈ

ఈశాన్యవర్ష వాయువు=N. E. Monsoon	... 128, 130	
---------------------------------	--------------	--

ఉ

ఉచ్ఛ్వాసము=Exhalation	... 76	
ఉత్తరశీతలమండలము=N. Frigid Zone	... 115	

ఉత్తరసమశీతోష్ణమండలము=N. Temperate Zone	...	115
ఉత్తరధృవము=North pole	...	115
ఉత్సర్గము=Secretions	...	75
ఉదజని=Hydrogen	... 21, 22, 26, 27, 67, 72	
ఉదజనితములు=Hydrate	...	26
ఉదజహరికౌష్ఠము=Hydrochloric acid	...	21, 24
ఉపకౌండము=Branch	...	147
ఉద్యానకృషి=Horticulture	...	6
ఉపజాతి=Variety	...	98
ఉపదళము=Leaflet	...	48
ఉపధాతువులు=Nonmetals	...	21
ఉపరిజలనిర్గమము=Surface drainage	...	233
ఉపశ్వాసము=Transpiration	...	70
ఉప్పు=Common salt	...	27
ఉష్ణము=Heat	...	78
ఉష్ణకాలము=Summer	...	181
ఉష్ణత (నేలయందలి)=(Soil) heat	...	204
ఉష్ణమండలము=Torrid Zone	...	115
ఉష్ణతామాపకము=Thermometer	13, 14, 119, 121	
ఉష్ణవాహకములు=Conductors of heat	...	15
ఉష్ణవాహకత్వము=Conductivity (of heat)	... 15, 208	
ఉష్ణప్రచారత=Radiation (of heat)	...	15
ఉష్ణోగ్రత=Temperature	... 13, 14, 71, 72, 118, 124, 260	
ఉష్ణోగ్రతాసంచారము=Range of temperature	... 121, 208	

ఎ

ఎండుకాయలు=Dry fruits	90
ఎర్రనేలలు=Red soils	166
ఎర్ర లిట్మసు=Red litmus	27, 28
ఎసరుచుచ్చస్థలము=Boiling point	14

ఏ

ఏకఖటికస్ఫురితము=Monocalcic Phosphate	33
ఏకబీజదళము=Monocotyledon	...	39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 62, 79, 94, 98, 99, 101	

బి

బిడ్డాణము=Pericycle	62, 64
బిత్తుడు=Pressure	12, 18, 19

ఓ

ఓషధులు=Drugs	270
--------------	-----	-----	-----

క

కంకర=Gravel	167
కండకాయలు=Berries	90
కంపాజితములు=Compositae	104
కణములు=Cells	53, 56, 59
కణకవచము=Cell-wall	58
కణసంఘాతులు=Tissues	56
కణరసము=Cellsap	59, 72

కణశిల=Granite	161
కణుపులు=Nodes	45
కర్బనము=Carbon	...	22, 29, 30, 67, 68, 75	
కర్బనద్వ్యప్లజనిదము=Carbon dioxide	...	24, 29, 68, 69, 71, 72	
కర్బనికామ్లము=Carbonic acid	25, 29
కర్బనితములు=Carbonates	29
కర్బనోజ్జనితములు=Carbo-hydrates	...	30, 54, 72	
కర్బనసమీకరణము=Carbon assimilation	...	72, 78, 76, 110	
కపిలవర్ణపు నేలలు=Brown soils	166
కర్షకుడు=Agriculturist	2
కర్షకరసాయనశాస్త్రజ్ఞుడు=Agricultural Chemist	172
కొండము=Stem	...	37, 43to47, 60to62	
కాకిబుసుగ నేల= Micaceous soil	166
కొడ= Leaf stalk	48
కాయ=fruit	...	38, 89, 98	
కొటుక తేగులు=Smut	37
కాయధాన్యములు=Pulses	...	111, 269	
కింజల్కములు=Stamens	82
కుక్కుటపాలనము=Poultry-keeping	6
కుక్కగొడుగు=Mushroom	37
కృషి=Agriculture	5
కృషీవలుడు=Agriculturist	5
కేంద్రము=Centre	180
కేశకర్షణశక్తి=Capillarity	...	18, 199	
కేశనాళికలు=Capillary tubes	201
కేళిలు=Sports	96

కొనకాడ=Style	84
కొనదిమ్మ=Stigma	84
కోశము=Sheath (of a leaf)	99
కోశములు=glands	52
కోశస్పదీజములు=Angesperms	38, 98
క్రిందనేల=Subsoil	151
క్రొవ్వులు=fats	30
క్రూసిఫరములు=Cruciferae	105
క్యూకర్బిటములు=Cucurbitaceae	187
క్షారములు=Alkalis	27
క్షారధాతువులు=Alkali metals	35

ఫి

ఫిటికము=Calcium	21, 34, 67
ఫిటికాష్టజనిదము=Calicum oxide	25, 27, 34
ఫిటిక ఉదజనితము=Calcium Hydrate	27
ఫిటిక కర్బనితము=Calcium carbonate	29, 34
ఫిటిక గంధకితము=Calcium sulphate	26, 253
ఫిటిక నత్రితము=Calcium nitrate	25, 253
ఫిటికాయితము=Calcite	160, 163
ఫిటిక శిల=Lime stone	163
ఫిటిక భూములు=Calcareous soils	169
ఫినిజములు=Minerals	156

క

కంధకము=Sulphur	22, 32, 68, 74
కంధకదములు=Sulphides	32

గంధకితములు=Sulphates	32, 74
గంధకాయితములు=Sulphites	32
గంధకామ్లము=Sulphurous acid	32
గంధకామ్లము=Sulphuric acid	25, 32
గంధకధృతి=Do	25, 32
గంధకద్వైప్లుజనిదము=Sulphur Dioxide	32
గంధకత్రైప్లుజనిదము=Sulphur Trioxide	32
గంధకపు నేలలు=Sulphatie soils	169
గంధము (నేలల)=Odour of soils	191
గడ్డలు=Tubers	41, 106
గడ్డకట్టస్థలము=Freezing point	14
గణము=Genus	98
గరగ=Funnel	182
గరుపనేలలు=Loamy soils	166
గుంజకాయలు=Succulent fruits	90
గుగ్గిలము=Resir	75
గురుత్వాకర్షణము=Gravity	19
గుల్ల=Mesophyl	66, 70, 71
గుల=Bunch	101
గుడ=Palisade parenchyma of baves	66, 73
గ్రాము=Gram	15
గ్రాఫైతము=Graphite	29
గ్రామినములు=Graminae	99
గ్రీష్మకాలము=Summer	117

ఘ

ఘటకావయవములు=Constituents.	...	27, 168
ఘనపదార్థములు=Solids	...	10, 16
ఘర్షణ=Friction	...	19

చ

చక్కెర=Sugar	...	30
చమురు=Oil	...	55, 75
చమరుగింజలు=Oil seeds	...	270
చేవ=Strengthening	...	62
చాటి నేలలు=Saline Lone soils	...	244, 255

జ

జడత=Inertia	...	19
జలము (నేలయందలి)=Soil water	...	191
జలగ్రహణశక్తి (నేలయొక్క)=Capacity of soil for water	...	192, 193
జలపూరితము=Saturated with water	...	193
జలధారణశక్తి=Retentive power	...	194
జలస్పృహము=Percolation	...	197
జలనిర్గమనము=Drainage	...	224, 225
జలాపాతము=Water fall	...	153
జలాశ్శనీతములు=Alluvial soil	...	165
జన్మస్థానికములు=Sedentary soils	...	165
జలాకర్షకయంత్రము=Water pump	...	71
జల్లేడకాలువలు=Seive tubes	...	59, 61

జాలాకారవ్యాపకము=Reticulate Venation	...	50
జాతి=Species	98
జిగురు=Gum	75
జీవస్థానము=Nucleous	54

ఓ

ఔంకకాయలు=Drupes	90
-----------------	--------	----

త

తడిదినము=Wet day	188
తరుకృషి=Arboriculture	6
తవుడు=Bran	94
తామ్రము=Copper	22
తారతమ్యగ్రహము=Specific gravity	11, 186
తారతమ్యస్థిత=Specific heat	15, 208
తృణధాన్యములు=Cereals	269
తోర్రలు=Hollows	59
తేనెమంచు=Honey dew	146, 147
తేలిక నేలలు=Light soils	170
తేలికవర్ణపు నేలలు=Light coloured soils	166
త్రిఖటికస్ఫురితము=Tricalcic phosphate	33
త్రిపది=Tripod	126
త్వక్కు=Bast	61, 64
త్వక్కుసంఘాతము=Bast tissues	74
త్వక్కుగర్భాకము=Bast fibres	61

ద.

దక్షిణధృవము=South pole	115
దక్షిణశీతలమండలము=S. Frigid Zone	...		115
దక్షిణసమశీతోష్ణమండలము=S. Temperate Zone	...		115
దవ్వ=Pith	60, 62, 64
దవ్వకిరణములు=Medullary rays...	...		60
దారువు=Wood	61, 64
దారువాహికలు=Wood vessels	61, 70
దాహక పొటాష్=Caustic potash	...		35
దాహక సోడా=Caustic soda	35
దాశువావరి=Second crop paddy	...		111
దీర్ఘదృఢకణములు=Schlerenchymatous fibres	58, 61, 62
దుంపలు=Tubers	46
చుక్కచట్ట=Plough pan	244
దృఢత్వక్కు=Hard bast	...		61
దృఢకణములు=Schlerenchyma	58
దొంగకాయలు=Pseudocarps	...		92
ద్రవపదార్థములు=Liquid	10, 16, 17
ద్రావణీయత=Solubility	...		12
ద్రావణీయపదార్థములు=Soluble substances	...		12
ద్రావణశక్తి=Dissolving power	...		16, 69
ద్రావ్యత=Fusibility	13
ద్విఖటిక స్ఫులితము=Dicalcic phosphate	...	33 [61, 94, 98, 102, 107	
ద్విబీజదళములు=Dicolyledorns	...	39, 40, 41, 42, 44, 59, 60,	
ద్వివిధారణఫలము=bilocula	90

ధ

ధాతువులు=Metals	...	21, 34, 35
ధూమనాళిక=Chimney	...	154

న.

నగ్న బీజములు=Gymnospermes	...	38, 97
నత్రజని=Nitrogen	...	22, 27, 28, 68
నత్రజపంచాష్టజనిదమ=Nitrogen pentoxide	...	25, 28
నత్రికామ్లము=Nitric acid	...	25, 28
నత్రితములు=Nitrates	...	28, 73
నవాసారము=Sal-ammoniac	...	27
నల్ల నేలలు=Black soils	...	166
నల్ల చాడు=Black Alkali	...	246
నాచు=Moss	...	37
నారపంటలు=Fibre crops	...	270
నియతాకారము=Definite shape	...	11
నియతాయతనము=Definite volume	...	12
నిరక్షర రేఖ=Equator	...	114, 115
నిర్మాణజీవనవ్యాపారము=Anabolisem	...	74
నిర్జీవావరణము=Dead fences	...	261, 262
నిరింద్రయపదార్థము=Inorganic matter	...	26
నిశ్వాసము=Inhalation	...	76
నీటిపాచి=Spiregyra	...	37
నీలవర్ణపులిట్ మసు=Blue litmus	...	26
నీరు=Water	...	68, 72

నులితీగలు=Tendrils	...	43, 47, 52
నోళ్లు=Stomata	...	70
నేల=Soil	...	148, 150, 178
నైఋతివర్ష వాయువు=S. W. Monsoon	...	123, 180
నైసళిల=Gniness	...	162

ప

పంగ=Axil	...	44
పగులుకాయలు=Dehiscent fruits	...	90
పగులనికాయలు=Indehiscent fruits	...	90
పచ్చియెరువు=Green manure	...	240
పట్ట=Bark	...	61, 62
పట్టకృషి=Sericulture	...	6
పత్రహరితము=Chlorophyll	...	54, 66, 73, 75
పత్రదళము=Leaf blade	...	48
పత్రపీఠము=Leaf base	...	47, 47
పత్రమధ్యము=Leaf stalk	...	48
పదార్థము=Matter	...	8
పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రము=Physics	...	7, 10-20
పరమాణువు=Atom	...	28
పరపుష్పములు పరాన్నభుక్తులు } =Parasites	...	43
పరివర్తనము=Rotation (of crops)	...	272-287
పరిపత్రములు=Perianth	...	82
పరిమళద్రవ్యములు=Spices	...	270
పలాశాయినము=Olivine	...	161

పశుపాలనము=Pastoral farming	6
పశుగ్రాసములు=Fodder crops	270
పసిరికపోగులు=Sphorygyra	87
పామములు=Palmae	100
పాపిలియోనెసే=Papillionaceae	102
పారదము=Mercury	21
పారదర్శకము=Transparent	159
పాషాణము=Rocks	156
పిండి=Starch	74, 75
పిండము=Embryo	40, 85, 94, 95
పిలకలు=Suckers	99, 101
పీటి నేలలు=Peaty soils	169
పీడనము=Pressure	127
పుప్పడి=Pollen	84
పురుషపత్రములు=Stamens	82, 89
పురుష పుష్పములు=Male flowers	86
పురుషాంగము=Anther	84
పుష్పపత్రములు=Floral leaves	51
పుష్పగర్భము=Carpel	82, 89
పూవు=Flower	88, 81, 89
పృథక్కర్తరణము=Analysis	171, 178
పొగమంచు=Fog	146
పొటాసియము=Potassium	21, 85, 67, 77
పొటాసియనీత్రము=Potassium Nitrate	28
పొటాష్=Potash	85
పొటాసియహరిదము=Potassium Chloride	217

పొట్ట=Ovary	84
పొడినెలలు=Dry weather or season	131
పొడిసున్నము=Unslaked lime	34
పోగు=Filament	84
పోషకపదార్థములు=Plastic substances	75
పెదవులు=Guard cells	66
పేదాలినములు=Petalina	104
పై నేల=Surface soil	157
ప్రకృతిశాస్త్రములు=Natural sciences	7
ప్రకాశము=Light	19
ప్రథమమూలము=Radicla	95
ప్రథమశాఖాంకురము=Plumule	95
ప్రయోగశాలలు=Laboratories	172
ప్రాణవాయువు=Oxygen	21
ప్లాటినము=Platinum	23

ఫ

ఫలదత=Fertility	214
ఫలకచచము=Pericarp	85
ఫహరెన్ హీట్=Fahrenheit	45
ఫెరనులు=Ferns	37
ఫెరనుగృహములు=Fern houses	145

బి

బంకగరుములు=Clay loams	167
బంక నేలలు=Clay soils	166

బంకమన్ను=C'ay	167
బంధకపదార్థములు=Colloid substances	188
బంధకమృత్తిక=Colloid clay	,,
బరువు=Weight	11
బరువు నేలలు=Heavy soils	170
బహిష్కర్మము=Epidermis	...	58, 61, 62, 64, 66	
బహువిదారణఫలము=Multilocular fruit	90
బాటలు=Roads	265, 266
బాడువ నేలలు=Swampy soils	170
బాష్పీభవనము=Evaporation	198
బాహ్యనిర్మాణము=External morphology	40
బీజదళము=Cotyledon	39, 94, 95
బీజాంకురము=The embryonic plant	40, 94, 95
బీజపోషకము=Endosperm	95
బీజకవచములు=Testa	85, 94, 95
బూజు=Yeast	37
బూడిదకొరము=Potassium	35
బూడిదరంగు నేలలు=Grey soils	166
బొగ్గరవు నేలలు=Thirsty soils	170
బెండు=Cork	58, 61, 62
బేసాట్టుశిల=Basaltic Rock	162

భ

భస్మములు=Bases	25
భారమితి=Barometer	127

భూగర్భశాస్త్రము=Geology	7, 148
భూస్ఫటికము=Felspar	159
భౌతికఘటకౌనియవములు=Physical constituents	171
భౌతికధర్మములు=Physical properties	19
,, ,, నేలల= ,, ,, of soils	223
భౌతికవికారములు=Physical changes	9
భౌతికస్పృధకృతము=Mechanical analysis	171

మ

మంచు=Dew	121
మంటినకొల్చుట=Paring and burning	230
మగ్నము=Magnesium	21, 68
మగ్నమలనిదము=Magnesium oxide	35
మజ్జిగతగులు=Mildew	37
మత్తుద్రవ్యములు=Narcotics	270
మధుమక్షికౌపాలనము=Apiculture	6
మధ్యమోష్ఠగ్రత=Mean temperature	121
మన్ను=Soil	150
మసాలాదినుసులు=Condiments	270
మాంగనము=Manganese	22, 34, 68
మాంసకృత్తులు=Proteids	30, 54, 74
మాంసకృత్తుకణములు=Aleurone Grains	75
మాంసభక్షకములు=Carnivorous (plants)	52
మాత్స్యములు=Malvaceae	105
మిశ్రైలికామ్లము=Meta-silicic acid	33
మిశ్రద్రవ్యములు (రాసాయనిక)=Compounds (chemical)	20

మిశ్రమశైలితములు=Double silicates	34, 159
మిశ్రమపత్రములు=Compound leaves	47, 48
మిశ్రమఫలము=Composite fruit	91
మిశ్ర సేన్యము=Mixed cropping	287—289
మండలు=Thorns	47, 48, 52
మూలద్రవ్యములు=Elements	20, 67
మూలరోమములు=Root hairs	42, 64, 70
మూలపదార్థము=Protoplasm	54, 57, 74, 77
మూలరక్షణము=Root cap	64
మూలసీడనము=Root pressure	71
మృత్తిక=Clay	161
మృదుకణములు=Parenchymatous cells	57, 60, 61, 64
మృదుఫలములు=Berries	90
మోహాయితము=Apatite	160

య

యశదము=Zinc	22
యుఫోర్బియములు=Euphorbiaceae	103

ర

రంగులు (పుష్పముల)=Colours (of flowers)	75
రంగుపంటలు=Dye crops	270
రక్తాయితము=Haematite	160
రక్షకపత్రములు=Sepals	82
రజతము=Silver	2

రసయుతఫలములు=Succulent fruits	90
రసాయనశాస్త్రము=Chemistry	7, 10
రసాయనవికారములు=Chemical changes	9
రసాయనసంయోగము=Chemical combination	22
రసాయనానురాగము } రసాయనాకర్షణము }	Chemical affinity or attraction		22
రసాయనపృథక్కరణము=Chemical analysis	...	22, 57, 171	
రసాయనవియోగము=Chemical decomposition	...	23	
రసాయనఘటకావయవములు=Chemical constituents	...	171	
రసాయనస్థితి (నేలల)=Chemical condition of soils	...	215	
రోమములు=Hairs	52, 61, 64

ల

లఘుపత్రములు=Simple leaves	49
లతాదళము=Leaf tendril	52
లవణములు=Salts	25
లవణములు (నేలయందలి)=Salts in the soil	...	211	
లవణనిగరణశక్తి=Power of retaining salts	...	211	
లిట్మసు=Litmus	26, 27
లిమనైట్=Limonite	160
లిలియములు=Liliaceae	101
లేగుమినములు=Leguminosae	102, 214
లోతు(నేలల)=Depth of soils	222
లోహము=Iron	21, 34, 67, 73
లోహపు నేలలు=Ferruginous soils	169

లోహచుంబకత్వము=Magnetism	19
లోహికాష్టజనిదము = Ferric oxide	34

వ

వంగము=Lead	27
వండలి=Si't	167
వండలి నేలలు= Alluvial soils	105
వంధ్యత= Barrenness	214
వడగండ్లు= Hailstones	142
వర్ణము (నేలల)=Colour (of soils)	190
వర్గీకరణము= Classification (of plants)	98, 109
వజ్రము=Diamond	29
వర్షము=Rain	130-142
వర్షమాపకము=Rain-guage	131, 132
వర్ష పుడినములు=Rainy days	133
వసంతకాలము=Spring	117
వాతా పనీతములు=Drift soils	165
వాయురూపప దార్ధములు=Gaseous substances	10, 18
వాయుప దార్ధములు(నేల యందలి)=Soil gases	213
వాయుప్రవాహములు=Winds	125
వాయుషీడనము=Amospheric pressure	127
వాహికలు=Vessels	59
వాహికాపుంజములు=Vascular bundles	60, 64, 65, 67
వాలుకాశిల=Sand stone	163
విత్తు=Seed	38, 85, 93, 97

విచరణఫలములు=Dehiscent fruits	90
విద్యుత్=Electricity	19,20
విజాతీయగర్భత్వాదనము=Hybridisation	89, 97
విలోమగర్భత్వాదనము=Crossfertilisation	89, 97
వినాశజీవనవ్యాపారము=Katobolism	74
విభాజ్యత=Divisibility	12
విభాజ్యకరణములు=Meristematic cells	61
విసర్జములు=Excretions	76
విస్తార్యత=Malleability	12
విచ్ఛేదము=Disintegration	149,156
వృద్ధి=Growth	78
వృక్షశాస్త్రము=Botany	7,36
వెలుతురు=Light	72,78
వ్యవసాయము=Agriculture	5
వ్యవసాయి=Agriculturist	5
వ్యవసాయశాస్త్రము=Agricultural science	8
వ్యవసాయాన్వేషణశాల=Agricultural Research Institute	172
వ్యాపకశక్తి=Diffusibility	211,246,247
వ్యాకోచము=Expansion	17,190

శ

శక్తి=Energy, force	19,20,78
శతవిభాగి=Centigrade	14
శల్యాధిస్ఫుర్ణితము=Superphosphate of bones	217
శాఖ=Branch	45
శాఖాంకురము=Stem bud	45

శారీర నిర్మాణము=Anatomy	40
శిలాఫలము=Drupe	90
శిలీంధ్రములు=Fungi	37
శీతకాలము=Winter	117
శీతోష్ణస్థితి=Climate	110-147, 112
స్పృంగ తేజము=Horn blende	160
శుష్కఫలములు=Dry fruits	90
శైలము=Silicon	22, 33, 68, 77, 78
శైలద్యుష్ణజనిదము=Silicon dioxide	33
శైలికామ్లము=Silicic acid	33
శైవలములు=Algae	37
శ్రమవిభాగము=Division of labour	55

స

సంకోచము=Shrinkage, contraction	17, 189
సంఘటనము=Composition	156
సంయుక్త బీజము=Oospore	85
సంయోగస్థితి=Combined state	24
సంశ్లేషము=Cohesion	182
సజీవావరణము=Live fences	261, 262
సచ్చిద్రత=Porosity	12, 270
సమాంతరవ్యాపకము=Parallel venation	51
సగటుఉష్ణోగ్రతాసంచారము=Mean range of temperature	122
సస్యపరిపక్వతనము=Rotation of crops	271, 272
సాధ్యాహారము=Dormant plantfood	175
సామాన్యఫలము=Simple fruit	91

సామాన్యమిశ్రణము=Mechanical mixture	...	27
సామాన్యకృషి=Arable farming	...	6
సామాన్యోష్ణోగ్రతామాపకము=Ordinary thermometer		120
సారవా=1st crop (paddy)
సిద్ధబీజములు=Spores	...	27
సిటామినములు=Scitaminae	...	101
సిద్ధాహారము=Active or available plantfood	...	175
నీమసున్నము=Chalk...	...	35
నీసము=Lead	...	21
సున్నపు నేలలు=Calcreous soils	...	163
సున్నము వేయుట=Liming	...	227
సుకేకారము=Saltpetre	...	27, 54, 56, 60
సున్నపుచట్టు=Calcareous pan	...	244
సూక్ష్మదర్శని=Microscope	...	36
సూక్ష్మదండికలు=Bacteria	...	36, 27, 102
సూక్ష్మనిర్మాణము=Histology	...	65
సూక్ష్మబీజము=Microspore	...	84
సూక్ష్మజీవులు=Micro-organisms	...	28, 102, 156
సాల నేసములు=Solanaceae	...	105
సోడా=Soda	...	35
సోడియము=Sodium	...	21, 35, 68, 77
సోడియగంధకితము=Sodium sulphate	...	26, 245
సోడియహరిదము=Sodium chloride	...	31, 345
సోడియకర్బనితము=Sodium carbonate	...	245

సోడియం ఆక్సైడ్ = Sodium oxide	...	85
సోడియం నైట్రేట్ = Sodium nitrate	...	85
సోదర ఫలములు =	...	91
సెంటు = Cent	...	183
సెల్యూలూసు = Cellulose	...	54, 74, 76
సేంద్రియ పదార్థము = Organic matter	...	27, 28, 280, 281
సేంద్రియర సాయన శాస్త్రము = Organic chemistry		29
సేంద్రియ ఆమ్లములు = Organic acids	...	80
సేంద్రియ మండనములు = Organic ferments	...	75
స్కంధశిరములు = Nodes	...	45
స్కంధశిరాంతరములు = Internodes	...	45
స్క్వెంట్ యితము = Magnetite	...	160
స్నేగ్ధత = Tenacity	...	187
స్ఫటము = Aluminium	...	34
స్ఫురము = Phosphorus	...	23, 32, 63, 77
స్ఫురత్పంచాష్టజనిదము = Phosphorus Pentoxide		24, 32
స్ఫురికాష్టము = Phosphoric acid	...	32
స్ఫురపు నేలలు = Phosphatic soils	...	169
స్ఫురితములు = Phosphates	...	34, 177
స్ఫటికము = Crystal, quartz	...	158
స్థూల బీజము = Ovum	...	84
స్థూల బీజాశయము = Embryo	...	84
స్త్రీపత్రములు = Carpels	...	82
స్త్రీపుష్పములు = Female flowers	...	86
స్వర్ణము = Gold	...	21

హ

హరినము=Chlorine	22, 31, 68
హరితకములు=Plastids	54.
హెచ్చతరగతి యుద్భిజ్జములు=Higher plants	38
హ్యూమసు=Humus	31, 182.
హ్యూమిక్ ఆమ్లము=Humic acid	31

